

GULIELMI
COLE, M.D.

LONDINENSIS CELEBERR.
TRACTATUS

DE
SECRETIONE
ANIMALI.

EDITIO ULTIMA.



AMSTELODAMI,

Apud GEORGIUM GALLET, Bibliopolam.

M. DC. XCVIII.



GULIELMI

COLLEGE

LONDINENSIS CELEBRIS


TRAYCTATUS

DE

SECRETIONE

ANIMALI

EDITIO ULTIMA



AMSTELÆDAMI
APUD GEORGIUM GALLIUM, Bibliopolem

MDCCCLXX



HONORATISSIMO

V I R O,

Non generis splendore magis, quam eruditione
animique eximiis dotibus claro.

HENRICO TRACY, Arm.

NOBILISSIMI

VICE-COMITIS TRACY

FRATRI GERMANO.

PAtieris nullus dubito, Ho-
noratissime Vir, hac otii mei
libamina ad clientelam vestram se

★ 2

re-

recipere, qui tanto favore Au-
thorem prosequi dignatus es; nec
radios, quibus illustrentur, a
nominis tui splendore mutuari,
Solis amulus, denegabis; ma-
ximè cum eo ad te properant no-
mine, ut devoti animi affectum
testentur. Animavit sanè ut Ti-
bi nuncuparem, quod scirem tibi
volupe esse in amœnos Philosophia,
ipsiusque etiam Medicina, hor-
tos non rarò descendere; ubi
dum late spatiaris; atque solidio-
re, illic ubertim crescente, fru-
ctu te saturas, forte non displic-
ebit laborantem ingesta copia ap-
petitum acetario hoc (nec enim
meliori nomine dignas censueris in-
cultas nimium hasce pagellas) fal-
lere.

lere. Conjecturas nonnullas, nisi
multum mea me fallit observatio,
novas, alias satis paradoxas hic
invenies (is nempe seculi, in quo
degimus, genius est, ea felicitas,
ut liberum cuique sit suo sensu,
modo intra modestia limites se
contineat, abundare) nullius au-
tem famam, dum placitis ob-
viam eunt, impetentes. An vero
suam habeant verisimilitudinem,
penes alios judicium esto, Te
praesertim, cujus, inter plurima
quibus merito celebrari possis, en-
comia, non postrema laus est,
quod, tam illustri stemmate o-
riundus, humaniores literas ex-
colere non recusas. Maeste hac
virtute; dumque plurimos ubi-

que tibi concilias cultores, neminem
tamen habiturus es

*Ad obsequia cuncta paratior, quam
qui verè tuus est,*

GULIELMUS COLE.

P R Æ-



PRÆFATIO.

Secretionum theoriam vel pede sicco transiliunt authores, vel per transennam solummodo, & generaliore sermone leviter attingunt; saltem nemo palam ex professo de naturæ in iis peragendis methodo differuit: quanquam interea inter eximia, quæ in humano corpore præstat, opera nullum, me iudice occurrit cognitu dignum magis, immo necessarium. Nec enim sanitatem conservari, nec morbos, vel fatis intelligi, vel artis ope averruncari posse mihi videtur, nisi qua arte separentur succi aliquatenus exploratum fuerit; quandoquidem illa à debita, horum verò maxima pars à prohibita, vel indonea, istorum segregatione pendeant. Quin haud ullum aliud invenire datur,

* 4

quod

P R Æ F A T I O.

quod vel magis familiare est, vel naturæ mathesin plus prodit. Nisi enim perenni opera nervis suis suppeditaretur liquor, brevi de animalibus muniis actum foret: nisi assidue sanguinis recrementa demerentur, crasis ejus harum rerum redundantia usque adeo vitaretur, ut lampadi vitali sustinendæ haud par esse possit: nisi secretionis ope iis jugiter subveniatur, citò pessumdarentur coctiones præ fermentorum defectu, quæ nisi à sanguine, aliisve ex eo paratis succis, suppeditentur, idque hujus ministerio, haud facile explicari potest unde suam trahant originem. At ex materiæ secretæ contemplatione, quæ variis in partibus tam varia cernitur, at ad designatos usus exactè proportionata, quin & placidissimè, & facillimo negotio, ut nulla œconomiae animalis perturbatio sentiat, secedit, satis patet, cuncta huc spectantia ad matheseos regulas exquisitè concinnata esse; cum nisi vasorum structura ad has quadret, atque agentia eodem vires suas

P R Æ F A T I O .

suas exerant , tales nequaquam produci possint effectus.

Hinc apud me statui penitius , si quâliceret , istorum mysteriorum rationes scrutari ; quanquam vereor an satis fausto omine , cum abstertere merito possent tantorum quos , ut superiora fileam , hoc seculum protulit , virorum silentium , densæque , quibus involvuntur hujusmodi speculationes , tenebræ ; cum neminem lateat , & quam in profundo res ista transigatur , & in quantam minutiem redacta sint vasa , in quibus celebratur , ut omnem vel perspicacissimorum , & quantacunque arte adjutorum , oculorum aciem effugiant. Quò verò securius in tam præpedita via dirigantur gressus , hæc mihi , ut potui , servanda proposui.

Primò , Naturæ methodum simplicissimam esse , & simili prorsus ritu institui , ubi similia designat opera. Quod exinde elucet , quod nullam rerum , quæ sub sensum cadunt , speciem invenire datur , quin singula ejusdem individua

P R A E F A T I O.

dividua ; (nisi impedimentum aliquod interveniat) pari constituentium partium structura fruuntur. Quodque pleniorē fidem facere poterit , Animalium (perfectiorum saltem) : utcunque specie distinctorum pauca (fortasse nulla) occurrunt , quæ non quoad internam mechanicen cæteris omnibus (quantum distincta , ad quæ fabricantur munera patiuntur) quam maximam analogiam gerunt. Nec enim voluit summus ille Naturæ , & simplicissimus *Architectus* , alias , operibus suis moderandis , sancire leges , quam quæ originem suam referrent , Archetypumque indigitarent.

Secundò , Corpus humanum , non secus ac cunctorum animantium , mechanico planè more construi , singulasque , quæ in eodem peraguntur , actiones (exceptis iis quæ ad animam immediatius spectant) mechanicè omnino præstari. Id quod nemo non sibi facile persuadebit ; qui fabricam corporis (qualis tum ex veteribus , tum præ-

ser-

P R Æ F A T I O.

fertim nuperis inventis Anatomicis apparet) variamque succorum lustrationem pensitaverit; unde & de cæteris, quæ sub sensum non cadunt, conjecturam ferre pronum est, illi maxime, cujus mentem sanioris Philosophiæ quæ tam claro jubare hoc ævo renidet præcepta imbuerunt.

Tertiò, nil asserendum, quod indubitatis Naturæ Phænomenis adversatur, nec ullos, vel partibus, vel liquoribus, usus assignandos, qui non totius corporis æconomix respondeant; ne vel statas naturæ leges rescindere, vel novas ipsi indicere velle censeamur.

Dum ad hanc Cynosuram conceptus meos dirigere conor, si forte minus feliciter rem explicavero, capti veniam tamen ab æquis rerum æstimatoribus habiturum me non despero, quandoquidem hinc forsân altioribus ingeniis ad negotium hoc solidius excolendum ansa dabitur: quam quidem eò fidentius mihi spondeo, quoniam
niam

P R Æ F A T I O.

niam præfractè nihil , aut pertinaciter, hac in re assero, sed *Hypothesin* tantum, à longo sane tempore à me animo voluntatam , limatioribus aliorum judiciis trutinandam propono. Neque enim hanc , meam , sive hypothesin , sive opinionem , tam perditè depereo , quin eam mehercule repudiaturus sim , aliamque lubens meritò vel superinducturus , vel à quocunque allatam amplexurus , modò ejusmodi sit , quæ magis Naturæ legibus consentaneam , & ad Phænomena solvenda accommodatiorem sese exhibuerit.

Interea monendus Lector est , tractatum hunc , parum , omnino immutatum , ante biennium prelo destinatum fuisse , id quod complures non mediocris notæ & famæ , juxta ac doctrinæ , Viri testari possunt , qui sub illo tempore perlegerunt : Cujus rei ideo mentionem facio , ne , si forte aliqua ex iis quæ tanquam (mihi nova hic tradita sunt , ab aliis post illud tempus typis mandata fuerint , plagii,

P R Æ F A T I O.

gii , quod horreo , notam mihi quis inurat.

At redarguent, auguror, nonnulli, inter alia censuram forsitan motura, quod Philosophico hoc ævo, in quo tantopere experimentis statur, scribens, aliorum fere solummodo observatis Anatomiis insistam, conjecturis vero aliquanto liberius hic illic utar. Verum his reponere liceat, eo evectam esse stupendam Anatomem hoc seculo exercituum industriâ, corporis cognitionem, ut quamvis multa adhuc detegenda superesse haud inficias ivero, nec proinde prorsus dogmaticè agendum esse censeam; licere tamen putem tales ex iis quæ jamjam reperta sunt, deductiones elicere, quæ ad aliqualem operationum naturæ explicationem faciant. Quod cum à nemine, quod ad præsens subjectum, ex professo factitatum observaverim; haud prorsus ingratum, quibusdam saltem, opus præstiturum sensi, si meas hac basi licet nixas, super ista hac re proponerem conjecturas, aliasque affi-

P R Æ F A T I O.

affines (at cunctas rationibus ubique,
quales eæ sint, stipatas, nec prorsus,
confido, probabilitate omni destitutas)
quandoque attexerem, inque metho-
dum, quanquam minus fortè accuratam,
utpote meam, redigerem. Interea, si
hæc arrisisse comperero, forsitan impo-
sterum, ubi per negotia licuerit, datur-
us sum operam, ut cultiora & experi-
mentis auctiora prodeant, fortassis &
alia subsequantur. Sin errasse me quis
ostenderit, sicut me non ingratum mon-
stranti præbebo, sic saltem aliquid sola-
minis attulerit, Magnis Clausis exci-
disse.

E L E N-



E L E N C H U S C A P I T U M.

CAP. I.	<i>Quid per Secretionem intelligendum sit.</i>	Pag. 1.
CAP. II.	<i>Secretionum differentia.</i>	3
CAP. III.	<i>Secretionum scaturigo.</i>	6
CAP. IV.	<i>Succorum ad particulas dimittendas prævia dispositio expenditur.</i>	17
CAP. V.	<i>Secretoria partes, quæ sint.</i>	24
CAP. VI.	<i>Secretionum tam Simplicium, quam Mixtarum, generalis methodus.</i>	27
CAP. VII.	<i>Secretionum Simplicium, seu Perfectivarium, ratio.</i>	29
CAP. VIII.	<i>Secretionum Mixtarum ratio generalis.</i>	37
CAP. IX.	<i>De Fermentis.</i>	40
CAP. X.	<i>Fermenta ad Secretionem præcedanea, quæ.</i>	47
CAP. XI.	<i>Fermentum Secretiones Mixtas immediate concilians, quodnam sit.</i>	49
CAP. XII.	<i>Hypothesis pro secretionum mixtarum ratione reddenda, proponitur.</i>	61
CAP. XIII.	<i>Phænomenon quorundam, & dubiorum, solutiones ex allata Hypothesi.</i>	65
	CAP.	

ELENCHUS CAPITUM.

CAP. XIV. De vasorum biliariorum officio.	73
CAP. XV. Secretionum Privatarum ratio.	88
CAP. XVI. Secretionum præter naturam institutum evenerientium ratio.	91



GULIEL-



G U L I E L M I
C O L E M . D .
T R A C T A T U S
D E S E C R E T I O N E .
A N I M A L I .

C A P . I .

Quid per Secretionem intelligendum sit.

DE *Secretione* quatenus scilicet in humano potissimum corpore peragi solet, verba facturus, oportet ut in ipso limine quid per vocabulum hoc intelligi velim, exponam. Idcirco advertere licet corpus humanum, perinde ac cunctorum animantium, tum ex multiplici partium solidarum, particulis inter se plurimum discrepantibus conflatarum, suppellectile coagmentari, tum etiam variorum succorum comineatu irrigari; quos pariter non minus difformi particularum strue constare certum est, cum & nutritarum illis suppedirent, & ex iisdem resolutâ compage diffluentibus ex parte conflentur. Illæ siquidem, tum præ motu intestino tum sanguinis impingentis vi attritæ, inveterascentes particulas in hujus alveum assatim deponunt, (novarum interim ab appellentibus succis proventu vicissim auxæ:) Isti vero, variis acti motibus, tum varias partium suarum comminutiones pariuntur; secus enim nequaquam habiles evadere possunt,

ut vel in illarum, tantopere inter se difformium, substantiam facessant, vel alia viæ munia præstent; tum aptitudinem hinc nanciscuntur ad particulas cerras ex gremio suo deponendas: nec enim aliter fieri potest, quin in tam multiformi congerie (qualis tum ex deciduis solidarum particulis, tum chyli, ex pluribus diversæ profapiæ substantiis enati, supplemento provenit) multæ præsto sint, quæ, quoniam agitatione continuâ cientur, atque strictos intra vasorum cancellos coërcentur, vel sponte, quâ datâ viâ prorumpant, vel, si aliunde vis accedat, sese è reliquarum contubernio facili negotio exturbari patiantur.

Hinc duplex emergit in corpore *Separatio*, alia quæ intra massæ confinia celebratur, alia quæ determinatarum quarundam particularum ex eadem exclusionem perficitur.

Prior in hoc consistit, quod quædam massæ particulæ in motum concitæ, & locum, quem prius occupaverant confortiumque, quod cum aliis inierant, ipsæ deserunt, & in alias, dum hoc sagunt, impingentes, eas tum in minora frustula diffingunt, aliove aliquo modo dissolciant, atque è sedibus proturbant, tum in consimilem motum concitant, aliisque, qualem ipsæ subierunt, divulsionem hoc nomine inducere cogunt. In hujusmodi Separatione omnis fermentationis, cunctarumque, quas uspiam in corpore invenite est, digestionum ratio consistit: diminutâ enim hâc ratione mole, mutatâque figurâ, majorem ad motum promptitudinem, aliasque, quæ ab his pendent, doies necesse est ut acquirant corpora talem suarum particularum separationem passa.

Alterâ Separatio, quâ scilicet materia quædam determinata extra massæ, cujus ante pars fuit, terminos fertur, certum, ut cum delectu perficiatur, organorum apparatus requirit, quorum ministerio particulæ quædam, præcedenti digestionem ab aliis laxatæ, atque ad horum oscula proportionem quåndam quoad molem & figuram natæ, cum ad illa, sive intestino nixu, sive vi aliunde illatâ, appellant, foras convehuntur, reliquâ massa prorsum per solitos & patentiores canales latâ.

Quamvis utrumque genus commune *Separationis*, nomen sibi vindicer, posterius tamen, quandoquidem peculiare naturæ artificium prodit, atque à priori satis distinctum sit, distinctam insuper & magis limitatam appellationem meretur, atque *Secretionis* titulum sibi propriè arrogat. Vox enim ipsa separationem modi sonat, quâ sepatata materia ex alius, quâcum antea delinuerat, gremio fertur, atque seorsim consistit. Hujus explicationem nobis in sequenti Dissertatione proponimus, & ad eam sensa nostra accommodare conabimur. Interea

reâ tamen quoniam hæc alteram illam præsupponit, haud abs-
re forsan erit paucula ad illius naturam attinentia suo loco in
medium proferre, quo melius ad hujus notitiam perve-
niamus.

C A P. II.

Secretionum differentia.

Q Uoniam vero plures, eæque variaz materiaz, Secretiones
in corpore occurrunt, earum discrimina primum recen-
sere, scaturiginesque investigare oportet.

Secretiones igitur vel ad *privatum*, vel ad *publicum* usum in-
stituuntur.

Quæ publico inserviunt (missis aliis differentiis) respectu ma-
teriez ad duo potissimum genera referendas esse censeo, quod
scil. aliz *Simplices*, aliz *Mixtæ* sint. *Simplices* volo, non eâ
vocabuli proprietate, ac si singulæ secretæ materiaz particulæ
essent purè inter se homogeneæ, sed respectu massæ è qua se-
parantur; utpote cujus purior solum, & simplicior, compara-
tione ad eam habitâ ex quâ segregatur, aliqua delibatur pars;
crassiori interim (licet non ubique omni puriorum particula-
rum consortio prorsus orbatâ) alio per patentiores canales de-
portatâ *Mixtas* appello, in quibus varii generis, tam tenuio-
res quam crassiores, eliminantur particulæ, resistente massa
non minus tenuibus, imo plerunque pluribus, iisque alicubi
vel tenuioribus, quam quæ secernuntur, refertâ.

Iis quæ prioris generis sunt (quæ & *Perfectivarum* titulo for-
san insigniri merentur) hoc competit, quod materia ex qua
constant introrsum, atque in penitiores continuo corporis re-
cessus, ad nobiliores, quam quibus integra, è qua proliciun-
tur, massa par esse potest, usus fertur. Porro & nervis in-
sertis, vel in totum destituuntur partes iis peragendis destina-
tæ, vel minutoribus saltem gaudent, quam qui in eas, quæ
alteri Secretionis generi famulari natæ sunt, inferuntur (quem
vero in finem inferius suo loco dicetur.) Harum duæ solum-
modo (quantum auguror) in corpore occurrunt, quæ tamen
maximè insignes sunt omnium, quas ubivis cernere est; *Chyli*
scil. in vasa lactea, & *Succi nervosi* ex sanguine cerebrum per-
lente in nervorum canales percolatio. In quarum priori, la-
cteæ succo in vasa propria secretò, crassa, & inutilis, per in-
testinorum tractus saburra amandatur; in posteriori cruor,

depositâ in adstantes nervos puriori suâ parte, crassior jam & effictus quodammodo factus, per venas versûs cor, novis ex chyli & lymphæ accessu, novâ abortâ fermentatione, spiritibus imprægnandus redit.

Posterioris generis Secretionum, *Mixtarum* scil. extrorsum tendit materia, atque vel prorsus excernenda est, unde aut protinus è corpore excluditur, aut destinatas cavitates, ut commodius pro naturæ intentione eliminetur, deponitur; vel ambitu factò intra corpus iterum dirigente vasorum structurâ, ad ultetiores usus reducenda. Hatum omnium organa nervis, iisque mole amplis, donantur.

Ex his *Excretivæ*, vel ad *speciei conservationem*, vel ad *individui commodum* instituuntur: inter quarum materiam, licet simili instrumentorum apparatu, eâdemque methòdo, prout inferius propalare conabimur, utramque peragi verisimile nobis videtur, magnum tamen discrimen intercedit. Quæ ad illam comparantur (quò spectant quæ in testibus, & mammis, peraguntur) ex materiâ, sicut multum elaboratâ, sic pariter toto genere utili constantur, licet ab illa *Perfectivarum* satis distet. Quæ verò hujus gratiâ fiunt, ex emeritâ & inutili materiâ potissimum constant, atque metè deputativæ sunt; ideo nimirum à natura designantur, ut remanens massa purior, adque vitæ usus accommodatior persistat, id quod cuivis satis obvium esse poterit, qui perpenderit quanta corpori incommoda à suppressis solitis evacuationibus superveniunt. At vero, dum secretum humorem inutilem voco, non id sic intelligi velim, ac si singulæ ejusdem particulæ corpori infestæ sint; ut nec illas omnes, quas, speciei conservationi dicatas toto genere utiles dixi, sic habendas esse, quasi nullæ ex iis post usum præstitum ablegandæ forent: sed sicut secretionum, ad hanc institutarum, materia certam quandam, ad usus quibus accommodata est præstandos, crasin necessario requirit, quâ tam subtiles quam crassæ una maritandæ sunt, adeoque liquor hinc emergens, ex diversis licet genii particulis constans, quandoquidem rotâ sua mole in aliud corpus transferendus est, hoc nomine pro utili habendus est; sic in deputativis non paucæ (quod omnino concedendum) corpori satis utiles excluduntur particulæ, cum tamen inutilem & emeritarum longè major ad eas conficiendas concurrat numerus; atque utiles his vel eo fine adduntur, ut liberiores iis commeatum præbeant, vel præ subtilitate neutiquam impediri possunt, quo minus se in vasa secretoria una insinuent, interea ut noxiæ solummodo destinato secernantur; rota idcirco secreta massa collectivè sumpta pro inutili & excrementitia habenda est. Hujus farinae sunt utina, sudor, mucus narium, cerumen aurium, &c. quæ

tum

rum materia non unius generis est, sed plurimum inter se diverſi, prout cuivis ſingulas perpendenti palam erit.

Secretiones *Reductivæ*, licet maximam partem ex materia non uſque adeò ſubtili & activâ, atque plurimæ ex remanentibus maſſæ, è qua prorumpunt, particulis, conſentur, nequaquam tamen excrementitia & proſus inutili conſtant; ſed tali, qui ultiores in corpore uſus, eoſque ſatis inſignes, præſtare poterit: nempe ut variis in partibus, fermenti loco contentis ſubſtantiis ſubveniar. Etenim ex ſuccis, quibus ſcatet corpus, plures dantur, qui vel crudiores, vel craſſiores ſunt, quam ut propria & inteſtina fermentatione debitum maturationis vel tenuitatis gradum aſſequi poſſint, unde fermento, quo commodius digerantur, opus habent: proinde natura his proſpiciens, ex elaborationibus tales iis ſuppeditat liquores, qui activitate ſua majorem particularum, ex quibus conſtantur, comminutionem efficiant, ut ſic debitam ſubtilitatem adipiſcantur, atque ſingulis partibus, tali ſubſidio indigentibus, propria indulſit vaſa, quorum miniſterio congruum, & eliciatur, & affundatur fermentum. Partium huic muneri deſtinarum longè major occurrit numerus & varietas, quam tallium, quæ reliquis quibuſcunque Secretionibus dicantur, idque quoniam tanti ad corporis æconomiam rectè adminiſtrandam intereſt, ut debita ſuccorum elaboratio, & ſubtiliatio, habeatur.

Quemadmodum verò Publicæ, quas diximus, Secretiones variis uſibus impenduntur, hic ſcil. ſubtiliandis, illic depurandis circa quos verſantur liquoribus, alibi fermentis iſque variis generis, conciuandis, aliſque forſan muniis, ut hinc commodius æconomia adminiſtraretur animalis; ſic Privata unicum, prout mihi videtur, in ſinem inſtituitur, ut nempe particularum aliquarum ſucci nutritii, per varias elaborationes, & depurationes (*publicarum* adminiculo) debito modo exalrari, talis à reliquis ſecluſio, inque certa prope conſita conceptacula ſeceſſio fiat, unde in partium ſubſtantiâ appoſitione faceſſant: etenim ad hoc opus etiam Secretio requiritur. Cum enim ex appellentibus, qui nutrimentum ſuppeditant, ſuccis non quælibet indifferenter ſingulis partibus nutriendis conveniant particulæ, ſed aliæ has, aliæ illas, prout earum fert textura, exigant; cuique jugem particularum quarundam avolutionem partes ſolidæ patiantur, unde continua inſtauratione iis opus ſit, ut impenſas has reſarciant, ex præterlabente fluvio tales, quæ ad hoc munus idoneæ ſint, neceſſe eſt ut admittant. Et revera in hunc ſcopum reliquæ omnes quodammodo collimant Secretiones (licet haud diſſitear, & ad alios fines inſervire, nempe ut magis idonei evadant ſucci pro

sensus & motus obeundis muniis, necnon pro intellectus operationibus exequendis, quandoquidem in his proferendis corporis anima utitur instrumentis) quatenus scil. earum ministerio materia partibus nutriendis debita vel exaltetur, vel à crassioris fœcis inquinante commercio liberetur.

Præter solemnia hæc Secretionum genera, observare licet quod aliæ quandoque *præter naturæ instituta* sunt, prout tum in hydropicis affectibus, tum in fonticulis ulceribusque aliis, siue artis ope, siue sponte excitatis, cernere est. Quarum singulæ quamvis à morbosa diathesi pendent, non tamen absque naturæ moderamine procedunt, maximamque illius solertiam ostendunt, eò quod licet partes huic muneri plurimum ineptas offendat, tam commodas tamen præstituerit vias possit, quibus (nec quandoque sine maximo emolumento) laboranti corpori succurrat, atque morborum alioqui emerfurorum segetem præscindat.

C A P. III.

Secretionum Scaturigo.

Cum verò plures in corpore substantiæ dantur particulis à se dimittendi aptæ natæ, proximè inquirendum est, ex quo fonte deveniat quod secludi cernimus.

Et primò, quod ad Secretiones *Perfectivas*, satis patet, unde earum materia derivetur. Cum enim quod secernitur sit tantum purior, prout adstruximus, appellentis massæ parte, si attendamus qualis ea sit, quæ ad Secretorias partes apellit, massa, res in vado est. Unde cum duæ solummodo inveniuntur, quæ sub hoc censu cadunt; *Chyli*, scil. per intestina in vasa lactea, & *Succi Nervosi* per cerebri corticem in nervos, nemo ambigere potest ex chylosa solummodo massa separari quod in lacteas penetret, ut nec ex sanguinea prolici quod in nervos instillatur; quandoquidem nulli alii, ad partes secretionibus his dicatas, pertingunt succi, ex quibus quicquam secerni supponamus: quod enim chylo in intestinis ex hepate & pancreate naturaliter affunditur, fermenti tantum (nisi forsan & vehiculi censueris) loco huic inservire potest, ut ulterius illic elaboretur, expeditusque in adstantes intestinorum poros coleretur. Verum de aliis Secretionum speciebus res paulo intricatior est, quam propterea enodare conabimur.

Supra notavimus duo solummodo esse ex quibus corpus nostrum constituitur; *partes* nempe *solidas* & *liquores* (etenim sub posteriori hoc titulo Hippocratis *æquæra* concludenda videntur, quoniam nusquam in corpore spiritus ab humorum mixturâ liberos dari adhuc compertum est): nunc par est, an ab utroque horum, an ab altero tantum, dimanet Secretionum materia, breviter primum inquiramus.

Et *Solidas* quidem *partes* ex liquoribus certâ diatâxi eorum tibus inque exurgere eisdem, ubi statim illum deferunt, res solvi (saltem fluidorum formam induere) nemini dubium esse potest: Cum vero indefinens sit tam harum, quam liquorum, & absumptio, & instauratio; nec magis insolidarum & consistentium absumptarum locum, quamdiu partibus integer persistat vigor, constanti tenore quædam ex liquorum penu deponantur particule, quam ab his emeritæ aliæ abscedant, inque liquorum familiam, quibus natales debent, relabuntur, (quod nisi fieret, in immensum, & ultra statum à natura tetminus exeresceret corpus) ideo Secretionibus materiam quodammodo à partibus solidis suppeditari certum est: quod & inde argui potest, quod à concitatiori qualieunque evacuatione collabascere has comperimus. Verum enimvero, quandoquidem nullus hic delectus supponi potest, sed quæcunque ab iis, jugi perluentis; ipsæque deprædantis, humoris irrigatione perfusis, decedunt particule, illorum integrales partes fuere, atque ferocientis solummodo hujus impetu abraduntur: cum porto, quæ sic divulsæ sunt, à prædatorio torrente absorbentur; in ejus sinum delatæ unam cum eo constituunt massam, donec ulteriori operâ ad secessum deponantur; idcirco Secretio ad liquida magis propriè limitanda mihi videtur, nec ad partes solidas attinere, nisi horum interventu suscitetur.

Liquores autem, quibus perlinitur corpus, licet varias indoles, non secus quam nomina forntiantur, ex uno tamen fonte omnes emergunt. Scilicet ex Chylo fit sanguis, ex quo deinceps succus nervosus, ceterique omnes, quotquot in toto corpore invenire datur, vel immediate, vel mediate saltem prolucuntur. Ex *Chylosa massa* in intestina depulsa Secretionem institui, eamque omnium maximam, modo notavimus; sed secreta illic materia tota introrsum fertur, atque ex puriori solummodo massæ parte constar. Ex eodem autem chylo (niliſve assumtis) dum vel in ventriculo, intestiniſve stabulatur, vel lacteas, aut receptaculum, glandulasve mesentericas pertransit, nil fecerni, vel in ejusdem depurationem, vel ad alios quoscumque usus, inde constar, quia nulla his partibus secretoria vasa, quæ ex ejus penu aliquid delibent, & asportent,

addita esse hæcenus compertum est; imò contra, nervosi succi in glandulis mesenterii, & lymphæ, à remotioribus partibus refluæ, in receptaculo copiis augeri mihi videtur.

Scio equidem doctissimis quibusdam viris etiamnum arridere veterem chylo, per venas mesaraicas, in sanguinem tramitem non prorsus denegandum; imò & venas glandulis mesentericis incertas ejusdem partem aliquam, dum per lacteas delatus huc appellir, delibare; non enim æquum esse ducunt, ut universa ejus massa uno torrente, unoque in loco, sanguini affundatur, ne, crudior cum sit, hujus obruat calorem, spiritusque nimis deprimat, cordique ipsi, nullis factis ambagibus, ingestus molestias ereet: quin insuper (præter id quod Cel.¹ *Glissonius* de chyli parte à nervis in glandulas mesenterii terminatis admittendâ supponit) tenuiorem assumptorum partem (maximè si admodum spirituosa sint) partim à nervis ventriculo implantatis, partim à venis illie desinentibus absorberi contendunt, unde citissimæ illius, quæ labore, inedia, aliisve de causis exhaustis, talibus exhibitis, supervenit, refectionis causam deducunt. Verum (præfatâ Cl. huic sententiæ astipulantium virorum veniâ) quamvis sat esset his insigne illud Cl. *Lorveri* de ductus chyli ferri rupturâ experimentum objicere; nulla tamen, dato quod uno in loco sanguini chylus suggeritur, qualia comminiscuntur incommoda hinc invehi posse mihi videntur. Satis enim in proparulo est, exilibus tantum aperturis ductum thoracicum in venam subclaviam hiare atque liquorem quem portat lentissimo insuper, si cum sanguinis, qui largo & rapido flumine decurrit, confertur, motu ferti, quo fit, ut huic exigua proportione affundatur, idque licet non admodum longo, tantotamen ante cordis ostium spatio, ut illi satis intimè prius commisceri possit quam hoc ingrediat; adeoque omnis, quæ à nimio refrigerio timeri potest, noxa præcaveatur. Imo sanguini non procul à corde sociari debere videtur, ne prius elastica particularum ætherearum (quibus abundè refertur chylus) nitrosarumque aliarum exantleretur vis, quam ad cor pervenit; hinc enim potissimam & diastoles & systoles causam pendere fas sit suspicari. Etenim & harum nativâ expansione, & fermentatione, quæ sanguineis partienlis istarum miscellâ inducitur, fit, ut latius quam secus eveniter, distendi necesse habeat cordis sinus: cor verò & ab hac distensione necessitiam (si ita loqui licet) sentiens, & nitrosarum particularum aculeis lacessitum se ad contractionis pensum fortius accingit, adeoque major sanguini agitatio efficaciorque comminutio (sine quâ haud viralis esse persisteret) imprimitur. Si ergo, chylus his

re-

refertus, vel procul nimis à corde sanguini ingeratur, vel portarum multitudine nimium distrahatur, facile particulae ejus elasticæ, ubi primum hujus senserint calorem, in eum vim hanc suam impendunt, unde contingat, cor ipsum iis fraudatum iri. Porro constat totum chylum, qui à venis sanguiferis ubivis per mesenterium sparsis absorberi ex hoc supposito concipi potest, ad hepar ex circulationis lege tendere debere, cumque sanguine à liene refluente commisceri: at quoniam retorrida sanguinis pars omnium consensu in hepate deponenda est ex naturæ designatione, ad quam insuper laxandam, & ad Secretionem disponendam, lienem suas præstare vices probabile est, rationi satis incongruum videtur crudorem & viscosum (cæteris paribus) hunc chylum sanguini, ad hoc munus huc properanti, affundendum iri, qui & confusione ei inducendo, & inviscando quasi, Secretionem hanc non potest non plurimum inturbare.

Quod vero nervos, sive in ventriculo, sive mesenterii glandulis, terminatos, chyli partem asportare supponant, magnâ premi difficultate mihi videtur: Cum enim nervi continuo tensi sint, (secus enim nec motus, nec sensatio, peragi possunt) atque ista tensio à contenta aliqua in illorum cavitatibus substantia, quæ propter continuas expensas jugiter suppeditari debet, proveniat; cumque cerebrum (quod, præ indefinenci sanguinis per largas arterias appulsu, nequit non omnibus momentis ex hujus sinu particulas aliquas admittere) continuo deorsum aliquid (sive spiritus animales, sive succum nervosum appellaveris) in nervorum canales derrudat, quomodo concipi potest sursum quidpiam contra adversum flumen in iisdem valis ascendere posse? Nec ex cita illa ab assumptis refectione quicquam, nisi pertenuem aliquam substantiam (non enim omnem omnino ventriculi contentis transire per tunicas negavero, cum ex divini Hippocratis sententia corpus ubivis permeabile & perspirabile sit) sed quæ chyli nomen haud sibi vindicare posse videtur, vel ad cerebrum immediate ex ventriculo deportari, vel à venis, aliâ quam solitâ per lacteas viâ, absorberi ex ullis sive experimentis, sive ratiociniis satis liquere sensuerim: Sed quandoquidem spirituosæ, & quodammodo acres sunt, à quibus hic affectus induci solet, substantiæ, earum particulae quædam, subtiliores [exiguo licet numero] per tunicæ ventriculi interioris porulos in venas admixtæ, sanguinem exagitare, inque vegetiores morus, fermenti instar concitare (spiritusque fatiscientes exsuscitare, facile concipiantur. Porro & (quod non levis esse momenti hac in re arbitror) crediderim quod, dum in ventriculo stabulantur istæ substantiæ, nervis, confertissimè ei iuferis,

ten-

tensionem, præ irritatione quâdam ab aculeatis earum particulis proveniente, imprimant, cuius ope si non ad cerebrum usque quodammodo regeatur contentus in iis succus, saltem in eo qui secus efflueret hinc detineatur, ipsumque actuet, unde omnis lassitudinis sensus [quæ nervis distendente humore suo tandem orbatis supervenit] statim tollitur; hic vero effectus tamdiu durare facile concipiatur, usque dum, assumtis per solitas vias sanguini adeoque ipsi cerebro (quod brevi fit) suppeditatis, novæ & idoneæ spirituum copię ex horum penu in posterum suppetant. Sed hæc *πυρίγνυς* dicta quis forsitan autumet. Cum vero non ex chylo dimanent istiusmodi Secretiones, aliunde querenda scaturigo.

Duo autem solummodo supersunt liquores, qui huic muneri quiequam conferre possunt, *Sanguis* scilicet & *Succus nervosus*. Et ex *Sanguine* quidem satis obvium est maghain [saltem] secretæ materiæ partem promanare. Præterquam enim quod particulis ad quosvis ferme œconomiz animalis, ad quos secretiones instituuntur, usus requisitis abundet, plurimæque recrementa progignere necesse habeat; id insuper evincit; quod nullas partes secretionibus, de quibus sermo est, dicatas invenire datur, quin vel numerosiores; vel mole saltem grandiores; aditas habeant arterias, quam quæ eis ad alios usus requiri videntur.

Cum veto & hæ partes nervis pariter gaudeant, iisque satis amplis, dubitari potest annon ex *succo* etiam *nervoso* ex parte seceruatur, quod secretionum harum materiam constituit.

Digressio de Succo nervosi existentia.

Succum quidem *nervosum* dari perquam strenuè evicerunt *Celeber*. *Glissonius*, *Willisius* alique, quorum argumenta [à nemine, quod sciam, hætenus solidè refutata] non opus erit hic repetere. At nihilominus non desunt etiamnum magni nominis viri, qui eundem in dubium vocare perstant, tanquam nimis arbitrariam hanc opinionem causari, eo quod haud certo satis aliquo indicio constare autument, à quopiam unquam conspectum fuisse, nec nervi cavitatibus conspicuis pertundantur: quin, ne à veterum placitis recedant, magis iis *Spirituum* notio arridet, eorumque ope cuncta, quæ *succo nervoso* adscribuntur, phænomena solvi posse arbitrantur.

His quamvis satis responsum esse à *Clar.* supradictis viris opinamur, quoniam tamen *Hypothesis* nostra [inferius tradenda] magnâ ex parte ab hoc supposito pendet; liceat pauca

cula in pleniorē hujus rei confirmationem ex abundantia addere.

Et primò etiam si concederetur [cujus tamen contrarium ex iis, quæ à prædictis viris Clar. afferuntur, abundè, me judice, evincitur, à quibus etiam rationes, quare non comparet in defunctis, satis firmæ assignantur] succum nervosum sub aspectum non cadere, anne ideirco pro nullo statim habendus est, cum ex adverso tot rationum momenta dari eum suadeant? Quis nescit quam multa ubique occurrunt, quæ visui se nullatenus exhibent, cum satis crassa ut sint objecta oportet, quæ ab oculis percipiuntur? Quis lucis radios [quibus tamen acceptum referimus quod cetera conspiciantur] contueri potest, quamvis ipsi sint corporum [minutulorum licet] systasis? Quis aërem quem spirat, & sine quo ne momento quidem superesse possumus, obrueri valet? Ne verò extra animalium corpora instantias quæramus, quis canaliculos in intestina hiantes, chyli [satis licet crassi liquoris] admisioni dicatos, unquam vidit, licet tales adesse nemo negaverit? Cui tantus oculorum contigit vigor, ut vel vasorum sanguiferorum ultimos capillares tubulos, ipsumque sanguinem, utcumque rubore suo clarum, ipsos tranantem, unquam conspiciat fuerit? quanquam nemo non concesserit hunc illo, & multo crassiorē, & magis conspicuum esse, quem nervis ejusdem patroni ascribunt, & vascula ista nervis multò patentiora. Quod si tam lynceo cuiquam esse contigerit, merito tamen pro oculatorum miraculo habendus erit, qui nedum sanguinem, sed vel ipsas arterias venasque, per *atancatum*, aliorumque hujusmodi animalculorum, tibias decurrentes, visu assequutus fuerit; cum tamen his talia vasa, sanguinemque [vel saltem succum aliquem analogum] dari, inque extremas earum partes, ut nutrantur & auferant, derivari nemo, opinor, negaverit; [imo nec nervos, multo quam vasa sanguifera exiliores, quandoquidem tam exquisito sensu pollent] eoque minus quoniam nullis animalibus [quæ saltem cultum Anatomicum subire possunt] hætenus compertum sit [distantē accuratissimo *Lewero*] cor, ad sanguinem pellendum natum, desiderari. Si verò ab oculorum testimoniis nulla harum rerum desumere liceat indicia, quorsum illorum suffragia tantopere in præsentī negotio expetimus, ubi actionis ab hoc succo præstandæ ratio, ut perquam subtilis sit, inque perexilibus canalibus hospitetur, cum in exigua solummodo quantitate suppeditandus est, postulat? Non enim tantā copiam, quantā sanguis, adesse debet, cum & hunc activitate multum superet, & agentis ferme tantum partes, cum in nutritione (ubi ad hanc concurrat) tum in aliis, quibus impenditur,

ditur, operationibus, præstat. Cumque nullus huic, extra cordis sphæram delapso, notabilis impulsus à tenerrimo cerebro imprimi potest, propterea opus habet ut in perennes rivulos distrahatur, quibus prorsum pellendis lenissima illa cerebri constrictio, atque admissarum à tergo novorum copiarum protrusio, sat esse poterunt. Porro ex nervorum, corpore exemptorum, notabili teneritudine [quoad medullarem substantiam volo] satis constat, frequentia in iis adesse spatiosa, per quæ nil obstat videtur, quominus tantæ subtilitatis, quantæ huic supponimus, serpat humor.

At verò quæ de spiritibus animalibus pro functionis animalis muniis peragendis afferuntur, non multum forsân negotiî facestant, modo de eorum naturâ satis constet. Vix enim [ut mihi videtur] ullum de *Spiritibus* quibuscunque in corpore nostro hospitantibus sibi met fingere possunt eorundem patroni conceptum, qui non eos in *succorum* numero sistat. Quamvis enim ætheræ substantiæ titulo indignant, non tamen isto sensu hoc eos voluisse credendum est, ac si pari cum veri ætheris particulis subtilitate certarent; sic enim intra nullos, quæ corpora nostra habent, vasorum cancellos derineri possent: his enim ea inest tum exilitas, tum figuræ ad motus celerrimos concinnitas, ut cunctos [ferme] terrenorum corporum meatus liberè permeare valeant, tantum abest, ut intra nervorum [quorum teneritudo satis pervios his meatus undique patere arguit] canales incarcerationi sese pariantur. Idcirco per *Spiritus Animales* [quos omnium quotquot habet corpus subtilissimos esse cuncti consentiunt] ea solummodo puriorum & subtiliorum sanguinis particularum *συσπνε* intelligi potest, quâ idoneæ evadant, ut nervos, ad animalia munia sustinenda, liberè subeant; quam quidem ut obtineant, oportet ut eas, tum moles, tum figuras fortiantur, unde ad nexus aliquatenus sint dispositæ, ut sic, se invicem mutuo prehendentes, à nimis citâ avolatione detineantur: etenim constans actionum animalium, motuum præsertim, necessitas exigit, ut ab agente perficiantur, quod in opere suo non nimis citò fatiscat. Huic fidem facit, quod sanguis [& reliqui propterea, quotquot inde proliciuntur, liquores] ex crassis, maximam partem, & compactis cibis parantur, qui sicut istam, nisi ex aliquatenus ramosis constarent particulis, nequaquam induere possent consistentiam, sic vix credibile est eousque in corpore nostro attenuari & comminui posse [ubi nullus tam fortis supponi potest motus, qui ad omnimodam comminutionem necessarius sit] ut nativæ indolis prorsus obliviscantur. Adde quod vix tam pura in corpore separatio fieri potest, ut subtilissimæ ab omni crassiorum consortio in ulla

recondi queant vasa : si enim hinc innumeros tenuitatis gradus, qui inter particulas sanguinis supponi debent, pensitaveris; inde vero meatuum in partibus secretoriis, (habito ad subtiliores ex illis particulis respectu) speciatim in cerebro, amplitudinem (id quod exinde patet, tum quod laxam iis esse compagem primo intuitu quisque deprehendat, tum quod nullæ earum admodum sint ponderosæ; atqui in confesso est, corpora, quò plus habent ponderis, eò angustioribus poris donari) vix concipi potest, quin ex dictis particulis plures, diversæ magnitudinis & figuræ in eodem meatus sese insinuate possint, dumque intra arctiora inde porrectorum vasorum claustra coercentur, nec proinde satis pro voto sese singulæ explicare valent, quidni complicationes ineant, adeoque liquoris specie emergant? At vero siue detur tenuissimas solummodo particulas in nervorum conceptacula deponi, siue una cum his tales idem capebant iter, quæ crassiusculæ sunt, hoc tamen pro rato habendum, omnem suam volatilitatem & activitatem cunctas, quæ, *Spirituum* titulo ubicunque in corpore conclusæ, superbierunt, substantias concitatiore sanguinis motui & calori debere: Subtiliores etenim, grandioribus hoc nomine mobiliiores, majorem hinc agitationis gradum, notabilemque agilitatem nactæ, hanc expropter appellationem sortitæ sunt: Ubi verò motus iste remiserit, calorem evanuerit, spontè hæc ad quietem aliqualem se componunt, inque gratiam, tum inter se, tum cum aliis, quorum adeptæ sunt consortium, redeunt. Cum ergo subtiliores sanguinis particule, divortia præ concitatiore hujus agitatione affectantes, frigidiorum cerebri regionem ingressæ fuerint, reliquarum, agitationem suam adhuc retinentium, commercio præclusæ, sponte subsidunt, atque se invicem mutuoprehendentes in liquorem nequeunt non coalescere. Interea tamen ista particularum harum coalitio non impedit, quominus se solita impete, ubi fortiozem senserint calorem, expandant: cum enim arctos adeò hinc nexus haud inire possunt, quin se faciliè divelli pariantur; si rursus sanguini affundi contigerit, præ hujus calore non minus efficaciter [imo fortasse majore vi] sese explicare concipiantur, quam si sub halituosâ mansissent formâ, pyritique pulveris ritu, fomite hocignitatio a motu fortius, hoc nomine quod compressæ, explodantur. Hinc patere videtur, non tantum inter veterum *spiritus animales*, *nervosumque nuperorum succum*, discriminis interesse, ut magna inde lis oriatur. Quin non novum est *Spiritus* nomen ad liquores aptati: etenim inter Chymicos à longo tempore obtinuit hæc appellatio, idque non ad unius generis liquorem exprimendum sed plurimum discrepantes,

&

& ex iis quosdam consistentiâ satis crassos, modo notabili *consistency* polleant: Sic non solum subtilior vini pars hoc nomine insignitur, sed & liquores salini, tum qui ex urînâ, cornu cervino, &c. Magis volatiles, tum etiam qui magnâ ignis vi ex Vitriolo; aliisque multis concretionibus, acidi, satisque ponderosi proliciuntur.

Sed unde sumus digressi redeamus; atque paululum, an ex succo nervoso fecerni aliquid soleat, expendamus; quamquam paradoxon forsan videatur hac de re, modò hujus succi existentia concedatur, quæstionem movere. Cum enim ex nervosi generis affectibus hunc recrementis non raro scaterere constet, iis amoliendis naturam destinato consulisse credendum est, & proinde secretionis famulatu ad hoc prospexisse supponatur. Et sane huic faver quod ex secretoriis partibus, glandulis scilicet; nullæ [exceptis quas ad perfectivam attingere diximus] sint, quin non solum nervis, sed & iis vel magis numerosis, vel mole majoribus donentur, quam qui vel nutrimenti ad illas deferendi, vel sensationis impertiendæ ut de motu sileam, ad quem minimè parat esse structura testatur] proportionem solummodo æquent; imò quandoque tam magnos sortiuntur, ut hi vasa ipsa sanguifera pariter inserta excedant. Porro constat simplicia vasa, aliosque secretorios ductus, prope nervorum extremitates in his partibus sita esse, cum hinc originem trahant: & quamvis hæc vasa, Anatomicorum consensu, sanguiferis etiam ancillentur, atque succi, quem deferunt, maximam partem sanguini deberi verisimile sit, quidni & succo nervoso ministerium hoc præstent, cum nusquam alibi defæcari potest?

Excerni quidem aliquid ex hisce nervis in glandulas omnino concedendum videtur; interea tamen an ex succo nervoso *seccernatur* quod *excernitur*, ambigi fortasse potest. Dubitandi ansam præbet, primò, quod quamvis plerisque, si non singulis, vasa assistent, quæ vel extrorsum deportant, vel in sanguineum chylosumve rivum deferunt quod seccernitur, nulla tamen adfuit quæ nervosum, hic, ut volunt, depuratum, succum ad cerebrum immediatè revehant; & cui, quæso, bono deprandus hio loci foret, si nullus illi ad cerebrum regressus datur, sique interea eo, cui affunditur, multo purior & defæcator? Deinde, si dicatur, (quod quibusdam vitis doctissimis placuit) per eosdem canales redire per quos depluerat, inde etiam incumbit difficultas haud spernenda. Si enim in glandularum substantiam è propriis conceptaculis, ut illic à noxia liberetur facere, effundatur; quæri potest quâ arte post illam depurationem in nervos resumatur; Cum enim laxioris multo nervis sint texturæ, amplioribusque donatæ meatibus secreto-

riæ

riæ istæ partes (id quod exinde patet, quia crassior ipse eas trajici sanguis) credibile videtur subtiliores potius quam crassiores (proinde rejectaneas) allari succi particulas per patentiores hæc vias (vixote satis crassæ materiæ recipiendæ gratiâ amplioribus, quam nervi, tubulis fabricatis) elapsuras, certè vix in angustiores nervorum porulos se retrorsum recepturas, eoque minus, quoniam nec patet quæ vis in eos retro impellat, nec, si admittæ fuerint, quomodo (prout modo notavimus) contra adversum flumen à cerebro continuo decurrens, ipsæ, cerebrum versus, in iisdem vasis ferantur. Si autem supponatur, non totum, qui nervorum extremitas appellat, effundi succum, sed quasdam solummodo illius particulas per ea, redeuntibus reliquis, percolari, replicari poterit rationi consonum videri, vel tenuissimas solummodo (ubi metâ percolatione res transigitur) per incerniculi poros exituras; vel si crassiores modo meatuum figuris & diametro respondentes, ab iis admittantur, subtiliores tamen una cum his se etiam insinaturas, vixote quæ (& minuiiores & agiliores cum sint) haud impediri possunt quo minus in patentiores, & illarum (quæ tamen molis ratione magis ad hoc ineptæ sunt) admitteendarum capaces coli meatus una servant; adeoque non tam depuratio quam depauperatio hujus succi necessariò invehetur. Quinimo si quis comminisci voluerit, naturam, electivâ quâdam facultate, crassiores succi hujus particulas in eos præcipuè nervos, qui ad partes secretorias tendunt, demandare foras extrudendas, priori parte per alios latâ, par est ut monstret quonam [mechanico] artificio hoc peragatur, & quomodo ita rem habere constet, cum utrobique nervi inter se similes conspiciantur; quod vix eveniret, si tam diversi genii liquoribus deferendis nasci essent; nec, si hoc daretur, secretio hæc in partibus, ubi terminantur nervi, sed in eâ à quâ incipiunt, cerebro scilicet supponi debet peragi. Idcirco haud prorsus improbabile videtur, hoc quicquid succi nervosi in glandulis deponitur, noncrementum aliquod esse, quod ab aliis constitutivis ejusdem partibus dissociatur, perinde ac in sanguine usu venit, sed ipsius partem [integrale] quasi esse, quæ ex vasis suis absque ullâ particularum constitutivarum divulsione in appellentem sanguinem effunditur, cujus, ubi munere suo functa fuerit, pars sanguini per venas refluxo commissa, idem cum eo capessit iter, pars altera (ejusdem tamen genii) in secretoria vasa cum deciduis sanguinis particulis (cui ad hoc muneris hic loci affundi arbitramur) divertit.

Quod autem in prioris sententiæ favorem impurioris saburæ mixturâ quandoque laborare succum hunc asseritur (id quod in convulsivis, & scorbuticis aliisque hujusmodi affectibus cer-

nitur)

nitur) cui idcirco extricandæ naturam istarum partium appositione prospexisse supponatur; huic forsan reponere licet, impuritates istas ex naturæ designatione nequaquam evenire, quæ ultimam quasi manum ei imposuisse videtur (quod assensum fortassis ab illo merebitur, qui longam mineræ, ex quâ prolicitur, elaborationem, accuratam separationem, eximiosque, quos præstat, usus pensitaverit.) Unde cum in statu naturali nil impuri in eo congeratur, supererogasse naturam videatur, si secretorias assignaret partes, ubi nil secernendum, nisi ejusdem errore, generatur: Multos enim cernere licet qui, si non toto vitæ curriculo, saltem per plures annos ab omni affectu, qui succum nervosum vitiatum testetur, immunes degunt. Si vero quærat quomodo hujusmodi affectus, ubi invaserint, tolli possint (quod tamen non rarò usu venit) nervosusque succus ab hac saburra, si nulla habeatur ex eodem secreto, liberari queat? responderi forsan poterit, vix ullam hujusmodi morbis adhibitam medicandi rationem ex voto succedere solere, nisi ipsi fonti prospiciatur, atque vel depravata sanguinis crasis, quæ hosce affectus & præcedere & comitari solet, in tantum restituarur, ut nil cerebro, quod alienis qualitatibus dotatur, in posterum suggerat vel cerebrum ira roboretur, ut nil intra suos admittat, inque nervos demandet, nisi quod purum & defæcatum sit: quibus sic constitutis, satis obvium est concipere; puriorem noviter admissum succum, cum intra tam angustos canales sese multum explicare nequeat, nec proinde prius inibi concluso confundi, hunc à tergo propellere, & ipsum, tum retro admissi pressurâ, tum peristaltici nervorum motus vi (quem omnibus vasibus membranz vestientis beneficio adesse existimo) ulterius continuò protrudi, usque dum tota illa, quæ incongruâ referta erat saburrâ, massa, vera cum hospite suo, extra nervorum porceria eliminetur; (quod haud longo spatio peragî posse agnitu haud admodum difficile erit, si quantas, ratione molis, impensas ordinariò patiatur succus iste supputemus) quo facto, absque ullâ secretionis ope cessant, contumaces alioquin, hi affectus.

Nec multum hanc sententiam infirmate videtur, quod nervi in aliquas inferri glandulas earundem arterias & venas mole superant. Non enim hic effundi satis notabilem, quem deferunt, succi quantirarem negat, sed secerni tantum; Etenim effatu dignam (imo forsan proportionem majorem quam muscularibus ipsis ad motus peragendos) his suppeditari debere, prout ex dicendis constabit, arbitramur. Interea tamen (ut obiter moneam) ex hac valorum istotum disproportione haud sequi videtur, majorem liquoris, qui in vasa secretoria hic deponitur,

tur; partem ex succo nervoso, nedum secerni, sed ne suggeri quidem posse. Si enim celerem sanguinis motum cum leni illo sacci hujus conferamus, facile conficiemus, multo majorem illius, quam hujus, quantitatem, utcumque per exiliora vasa, glandulis hisce advehi posse; cumque continuus hic sanguinis appulsus; quantumvis singulis pulsibus quod affertur parum sit, atque exiguum tantum proinde secernendæ materiæ proportionem singulis vicibus suppeditet, sat magna tamen ejus quantitas pulsuum constantiâ vasis secretoriis non longo temporis intervallo susti poterit.

Verum utcumque sit, siue scilicet unus sanguis secretionum materiam suggerat, siue nervosus etiam succus calculum insuper suum addat, hoc interim retinendum viderur, hujus separata recrementa [si omnino ulla] tam exigua esse, atque electivâ quâdam facultate [mihi, fateor, hand perspectâ] intra ipsos nervorum tubulos, à puriori substantiâ, antequam ad glandulas ipse pertingit succus sejuncta, quæ idcirco eorum susceptoriora potius, quam secreta, vi organa dicendæ mererentur; ut non injuriâ Secretiones quarum mentionem fecimus, ad sanguinem limitandas arbitremur.

Etenim quod ad reliquos liquores, quos in corpore invenire datur, attinet, satis obvium est nihil hos ad istam rem conferre posse. Cum enim nulli alii supersint nisi Lympha, humoresque intra certa detenti conceptacula, palam est hosce omnes nil aliud esse nisi jamjam secretam materiam; atque vel introrsum labi, Lympham scilicet. quæ aut chylo in Receptaculo affunditur, aut aliis viis in sanguinem deducitur, vel in loculis dictis eo fine coacervari, ut aut fermenti loco aliis illuc appellentibus talique subsidio indigentibus, substantiis esse possit, aut commodius unicâ vice, & confertim, extra corpus exturbetur.

C A P IV.

Succorum ad particulas dimittendas prævia dispositio expenditur.

Postquam unde secretiones ortum ducant hætenus investigavimus, atque omnes vel ex chylosâ massâ, vel sanguinâ, profluere, tanquam verisimile conati sumus ostendere, proximum est, ut quoniam non omnia corpora particulis dimittendis (saltem non æque efficaciter) apta non sunt, isto-

rum liquorum ad hanc rem dispositionem paululum expendamus, quam in intestinâ illâ, cujus sub initio mentionem fecimus, particularum separatione, seu majori fermentatione, sitam esse innuimus.

Universam hic fermentationis doctrinam longâ verborum serie proponere (quamvis hæc, in genere, non rite perspectâ, haud satis illa, quæ in sanguine aliisve succis peragitur, intelligi valet, utpote cui omnes suas alterationes debent) perquam ineptum foret, postquam Clar. *Willisus* in hac palæstra tanta sua cum laude insudavit, atque hanc rem *nobis* præstiterit. Paucula tamen interea delibare, non prorsus ad rem præsentem, uti mihi videtur, incongruum erit, ut sic tota negotii, quod explicandum suscepimus, series uno quasi intuitu in conspectum veniat: quæ & minus fortasse displicitura erunt, quoniam *mechanico more*, succinctè licet, explicare satagimus.

Imprimis autem quoniam, quod de *fermentatione* dicturi sumus, ad secretionis methodum duntaxat patefaciendam asserimus, considerare oportet, multum discriminis quoad modum, quo particulæ ex massâ aliquâ secedere electivè solent, inter corpora quiescentia, atque ea quæ in motu posita sunt, intercedere, licet utraque pari fermentationis gradu polleant. [Quiesis vocabulo, non eam volo, quæ ad constituentes particulas, inter se atinet, utpote in quarum mutuo motu, ipsa fermentationis constituit ratio, sed quæ totum compositum respicit, quatenus scil. intra certum locum quiescere supponitur.] In illis etenim quæ peragitur, quoniam nulla particularum confusio ab extraneis agentibus inducitur (qua scil. cunctis promiscue agitis, illæ quæ ad secedendum accinctæ erant in reliquarum amplexus retorquentur) perquam regulari modo procedit, atque minus congruæ, postquam ab aliarum amplexibus liberatæ fuerint, pellentium energix non invitæ obsecundant, &, quâ data porta, è massæ gremio nullo negotio elabuntur. In his verò quæ instituitur, elegantius, & magis operosum, requirit artificium, satisque concinnum instrumentorum apparatus, unde alix determinationem ad egrediendum acquirant, aliis, non minus ad *secedendum* pronis, intus detentis. At verò quandoquidem utroque consimilis est fermentationis consideratio, quæ omnem (saltem quæ in humano corpore instituitur) ubi delectus habetur, secretionem præcedit, idcirco huic in genere paulisper immorari liceat.

Ad *Fermentationem* igitur (præsertim quatenus in liquidis observatur) quatuor hæc potissimum requiri videntur, nempe

Primo, ut [supposito quod particulas ab invicem divisas
huic

huic expōita habeat materia, id quod omnis concedit *Philosophia* in motu hæ constitutæ sint particulæ, quod nisi fieret, perinde esset utrum divisæ forent, necne. Non enim, absque constituentium particularum motu, in quodcumque subiectum introduci potest alteratio, quæcumque tandem forinsecus accedat vis; hujus verò medio in novas *formas* assiduo disponuntur, novosque situs, necnon & figuras indidem adipiscuntur, unde novis plaue ac diversis, quam quibus ante pollebat, viribus dotatur massa.

Secundò, ut particulæ istæ tum *variis figuris* præditæ sint, tum *magnitudine* inter se discrepent, secus enim, gradu motus quocumque polleant, illum tamen citò amittent, atque immobiles brevi evadent. Etenim dum plura, magnitudine & figurâ paria, invicem commoventur corpuscula, præ laterum æqualitate facillime se ad invicem applicant; unde pro laterum numero & proportionem vel tota, quæ motus initio eorum singula interjacebant, replentur spatia, vel saltem multo angustiora redduntur, quam ut satis, pro perennando motu, corpora ista ab invicem recedere queant: imò tantum abest ut huic idonea sint, ut in maximè solidorum proficiam [quæ ad fermentationem neutiquam nata esse nemo non concesserit] hoc nomine concreta ex iis conflata facessant; utpote quæ idèò talia, ex immortalis *Cartesii* sententia, evadunt, quoniam particulæ constituentes juxta se mutuo quiescunt; at quæ, quæso, efficacior excogitari potest quietis causa, quam hæc istarum incunatio? Porro nec particulæ *Æthereæ* subtilissimam volo illam, à sole dimanantem, cunctorum corporum meatus interfluentem, materiam, nec non globulos cœlestes [liceat modò de his philosophari] his alterationem imprimere possunt; quarum tamen actioni intestinas corporum mutationes non parum deberi rationi plurimum consentaneum videtur. Cum enim hujusmodi corporum particulæ latera ad invicem proportionata habent, necesse est, ut relicta parem proportionem observent spatiola, atque vel recta ad invicem respondeant, vel parum solummodo à rectâ positione deflectant; interea tamen ut unus ad alteram proportionatus situs satis directum trananti cuicumque materiæ transitum præbeat. Hinc, quoniam particulæ dictæ satis rectos, per quos libere spatia possunt, offendunt meatus, nullisque detinentur remoris, quæ eas à recto per hæc spatiola motu inhibeant, seque illis medio in itinere objiciant, patet nullam vim ad ipsius corporis particulas [supotè in quas non impingunt] in motum vindicandas exterere posse. Verum, ubi corpora difformibus inter se particulis constant, istæ satis ampla ad motum continuandum interstitia necessariò efficiunt, cum præ laterum impropor-

natâ invicem mensurâ, angulorumque inæqualitate, tam propè accedere nequeunt, quin satis spatii aliis consimili motu gaudentibus concedatur, unde & ipsæ liberum satis motum pariter sortiantur, & in priores impingendo, locum variare faciant, angulosque earum atterant. Quinimo particulæ æthereæ haud satis libere talium corporum meatus, propter inæqualitatem, variosque flexus, tranare possunt, verum plura ubique offendunt obstacula, quo fit, ut, dum in eorum exstantes remorantesque impingunt partes, non possint non, præ eximiâ, quâ p. llent, petuicite, eatum renitentiam superare, inque varios inter se hoc ingenio motus concitare: quin ipsis novum continuò hinc negotium exoritur, eò quòd obversa affatim inæqualium istorum corpusculorum latera pari modo nova iis obstacula faciunt, unde inceptus semel motus atque perennatur.

Tertiò requiritur, ut ex hisce particulis quædam ejusmodi sint indolis, ut multo, quam reliquæ, majorem ad motum promptitudinem habeant. Hæ sub duplici sensu concludi videntur; ut nempe aliæ tales sint ex constitutivis ipsius massæ particulis, quæ & molis exiguitate, & figurâ ad motum aptitudine, reliquas superent, aliæ verò æræ particulæ, quæ, præterquam quod in cunctorum laxioris texturæ corporum nequeant non se insinuare meatus, utpote incumbētis molis æræ pressurâ adactæ, quibusdam insuper tam arte maritanti, eamque indispiscuntur congruitatem, ut etiam inter ipsas eorum constituentes particulas locum sibi vindicare videantur. *Mobilium* hujusmodi particularum in fermentatione non levis est usus; quamvis enim ab æthereâ substantia in motum concitari & posse, & solere, corporum particulas verisimile est, vix tamen tam vegetus quam in multis experimur, introduci potest, nisi quædam intus hospitentur, quæ & impressam ab illis vim commodius reliquis suscipiant, & in crassiores efficacius transmittant. Etenim singularum subtilis hujusce materiæ particularum exilitas, si ad crassiores terrenorum, quibuscum versamur, corporum partes confetatur, non eam ad has proportionem servat, utcunque pernici admodum illæ agitatione polleant, ut satis efficaciter eas in motum vindicare possint: adde quod dispersæ, ubique vagantur, nec satis multas uspiam, (dum sui juris sunt, nec artis famulatu colliguntur) ad eundem scopum collimantes invenire est, quæ motum, qui alienijus momenti sit, in crassiusculis hujusmodi corporibus producant. At verò, dum, in itinere suo per corporum istorum spatia, quasdam offendunt ceteris minutiores, inque eas impingunt, in motum, utpote minus resistentes, facile concitant; hæ verò, quandoquidem æthereis gran-

diore sunt, minori negotio reliquis, quibus magis proportionantur, conceptum motum imprimunt, atque *crassiores* (ut Clar. Willisii verbis utar) *subigendo*, *subiliando*, & *variè explicando*, res ad *maturitatem* disponunt. Hæ quamvis omni fermentescibili materiz inesse supponendæ sunt, copias tamen suas novo proventu ex crassiorum spoliis jugiter adaugent, dum impetuosius motz, earum extantes atterunt partes, quarum deciduæ minutiz in harum profapiam isthoc ritu fa-
cessunt.

Aërem vero (cui suum quoque munus in fermentatione detulimus) quod atinet; notum est, vi plurimum elastica præditas esse ipsius particulas (id quod *Nobiliss. Boyleus*, magnus ille Naturæ Mystra, & Philosophiæ columen, satis firmavit) quæ tamen, quamdiu tum ambientis pressuram sentiunt, tum aliorum non raro, quibus involvuntur, corporum tepagulis coërcentur, satis placidè se inter ea componunt; ubi vero talis aliquis inductus fuerit motus, qui ad eas pariter agitandas vim habet; nulla mora sese explicare, sibi que libertatem vindicare satagunt: utque sibi majus nanciscuntur spatium, proximas quasque amoliuntur; atque hoc nomine & earum compagem laxant, iisque motum imprimunt, & majora undique aperiunt spatia, in quæ confestim irruentes tum subtiliores ipsæ, quas dixi, corporis particulæ, tum æthereæ, aucta cum numero energia, magis usque exagitant molem majoremque aëris expansionem conciliant,

Quattò requiritur ut fermentescens massa vel proprios quibus coerceatur, *seyminos* habeat, vel adventitios nanciscatur, ne subtiliores ante volent, quam destinatum opus peregerint. Hinc naturalibus hujusmodi productis solemne est involucris donari: quin in ipsis artis operibus ex voto non succedit fermentatio, nisi, fortinsecus adhibitis claustris, spirituum (sic enim servato usitato vocabulo appellari libet) avolationi prospiciatur.

His sic constitutis, bina hæc emergunt, particularum scilicet magis *homogenearum* confociatio, eademque opera *heterogenearum*, quæ tum tranapribus æthereis, tum spirituum motui, officiant, exterminatio. Dum enim hi in motum conciti sese quaquaversum explicant, ac reliquarum trajiciunt spatiosa, quandoquidem motu, quantum licet rectissimo, ferri avent, tum in crassiores, quæ taliter sitæ sunt, ut recto eorum motui obstant, tum in aëreas constanter impingunt particulas; nec ab hoc nixu desistunt, tantisper dum commoda ad motus suos secundum lineas rectas, vel à rectis, quam minimum licet, desistentes, obscundos spatia nanci-

ſcantur. Nec dum hoc ſatagunt, parum operæ præſtant incluſæ æris particulæ, quæ in motum ſemel concitæ maſſam elæſtici ſui nixus vi laxant & attollunt, adeoque viam ſpiritus faciliorem parant. Hi vero dum extantes craſſiorum angulos inter ſpatiaudum deterunt, magis inter ſe conformes reddunt, quæ hoc nomine, & mutuis, illorum, motibus non invicem obſecundant: cæ vero quæ (ut ut ſatis inter ſe conformes, ſitus tamen ratione ſpiritus motui obſiſtunt, iſthâc arte in debitos ordines rediguntur. Interea quæ nec commodè atteri poſſunt, nec præ difformitate in ordines reduci habiles ſunt, eodem negotio horum impete è reliquarum contrubernio excluduntur, atque vel foras, quâ patet viâ, labuntur, vel in confiniis ſaltem maſſæ hærent.

Fermentationis methodo ſic in genere breviter traditâ, ſatis pronum eſt colligere ad eandem pronos eſſe tum chylum, tum ſanguinem. Et *chylum* quidem; quamvis particulas ſuas non tantopere ac ſanguis exaltatas habeat; utpote qui ſanguineæ purpuræ per varios ulteriorum elaborationum gradus tandem induendæ, *candidatus* ſolummodo ſit, ad fermentationem tamen, vel hoc nomine, quod ſanguis ei natales debet, proclivem eſſe nemo negaverit. *Sanguinem* vero plurimum fermentativæ eſſe indolis vix eſt qui ambigat, idcirco multa de re adeo clarâ addere ſupervacaneum foret. Liceat modo pauca, quæ huic ſuffragantur, ſummatim ad dictorum normam recensere,

Et primò in *motu* (præter eum quem cordi acceptum reſert) particulas ejus conſtitutas eſſe exinde liquet, quod & fluidus eſt, & calore, eoque ſatis eximio (quem ſaltem humanum corpus habet) gaudet; quemadmodum perquam eleganter Cl. *Thruſtonus* nuperrime diſſeruit.

Deinde, ex particulis plurimum *heterogeneis* conſtare, (ut celebratum argumentum, quod ſc. alimenta, quibus veſcimur, inter ſe admodum heterogenea ſunt, præteream) id evincit, quod cum partes ex ejus penu nutriendæ variz, multumque invicem difformi indole, ſint; ſanguis pariter particulis inter ſe difformibus conſtare debet, ut ſingulis congruum pabulum ſuppeditet. Adhæc, magna quam malo noſtro toties experimur, ad organiſmum propenſio luc etiam facit, cum ab homogeneorum genio hæc multum (prout modo adſtruximus) abhorret. Quinimo varia, & tantopere inter ſe diſcrepantia, quæ ex corpore indices expelluntur, recrementorum genera, ut & variis partium & vaſorum ſecretiorum apparatus, ſatis ſuperque huic rei fidem faciunt.

3. Porro, sanguinem particulas quasdam ceteris *minutiores* & *agiliores* sortiri non Chymica solum analysis ratum facit, verum insuper ex ejusdem genesi & lustratione satis constat. Quisquis enim perpenderit esculenta, quibus urimur (ipsa & varii generis, & non parum activis partibus confata) salivari primum, deinde stomachali fermento, accedente insuper caloris fori, imbui; dehinc hepatici, pancreaticique succorum miscellam in intestinis obtinere; postea puriorem & magis subtiliatam eorum partem à lacteis delibatam, succi nervosi, aliufve ex sanguine hujus ope derubari fermenti, in glandulis mesentericis accessu (uti probabile videtur) irrigari; hinc lymphæ reducis, liquoris valde activi, copiis in receptaculo admisceri; demum sanguini ipsi affundi, eique satis intime maritari (cum quo dum gyratur, partim particularum, & præexistens sanguinis, & suarum, intestinâ actione, partim lationis vi, partim angustiarum, quibus inter circulandum ubivis in pulmonibus habituque corporis urgetur, molestiâ, insignem comminutionem pati necesse habet) nec ille haud invitus fatebitur, tantam hinc crassiorum cum tenuioribus particularum attritione necessario oriri, ut non exiguum eousque attenuatarum numerum sanguis ex ista emergens elaboratione sortiatur, quæ *spiritum* titulum merito ambiant. Porro maxima, quam in cunctis actionibus animalibus exerendis experimur, promptitudo satis huic rei suffragatur: sicut enim ad hanc valde activæ substantiæ requiruntur; sic cuilibet notum est, quod, si debita pueumatosi & elaboratione sanguis destituatur, confestim hæ cessant vel imminuuntur.

Nec quidem *aëris* mixtura caret sanguis; siue enim ulla ejus portio inspiratione in hujus flumen transmittatur, necne, alimenta tamen, quibus vescimur, in sua ipsorum compositione eo refertiuntur: porro, & inter masticandum & deglutendum, satis magna illius quantitas non potest non in ventriculum descendere, inque sanguinis massam una cum chylo transportari, ut minimè dubitandum sit non parum operæ ad ejus fermentationem & micationem conferre. Atque hinc forsitan potissimum sit, quod tam efficax sit ad devoratos cibos fermentandos panis una cum eis usus: Hic enim plurimas ubique, si rite paratus & excoctus fuerit, cavernulas præ ceteris quibuscunque cibariis obtinens, largam in his aëris quantitatem necesse habet continere, qui in ventriculum detrusus, postquam egregiam illic chylicationi operam impendit, tandem in venas una rapitur, ut partes sanguini vires præstet. Imò huic non minima ex parte debere videtur, quod rubore suo tingitur.

Ne autem evanescant spiritus, reliquaque pectus eat massæ compages, natura firmissimis munivit vallis, *arteriis* scil. & *venis*, quæ inter alia beneficia hoc, non exigui momenti, sanguini præstant, quod usque fluidus in iisdem (quod etiam post mortem observari potest) multo diutius quam alibi perster; quod nulli alii magis causæ assignandum videtur, quam spirituum incolarum concentrationi, qui sic coerceri, inque massæ penetralia, dum avolare nituntur, regeſti, fibrosas particulas à mutua implicatione motibus suis arcepi.

At verò quoniam præter *intestinum*, quem cum omnibus aliis fermentativis corporibus communem sanguis habet, alio insuper intra dictos canales cietur motu; quo usque adeo homogeneæ cum heterogeneis confunduntur particulæ, ut talis, quam diximus, segregatio regularis nequaquam institui possit, cumque pro variis œconomiz animalis indigentis plures, & inter se multum diversæ, imò aliæ prorsus, quam quæ, si quiesceret, secludi possunt, ex ejus penu secerni debent substantiæ; idcirco aliis artibus, iisque conspectioribus, ad hæc munera prospexit natura, quas in disquisitionis hujus decursu elucidare conabimur. Interea ratum esto nullas, quales ubique cernimus, absque præcedenti fermentatione, concitari secretiones, imò nec cetera vitæ munia præstari posse,

C A P. V.

Secretoria partes, quæ sint.

Sanguinis & chyli ad particulas dimittendas perpenſâ dispositione, sequitur ut cujus genii partes sunt, in quibus secretiones peraguntur, videamus.

Missis ergo ambagibus, Secretionem omnem (privatâ solâ exceptâ) quæ regulari modo, & ex primordiali naturæ instituto peragitur, sive sit succi proficui, sive excrementitii, in *glandulosis partibus* fieri existimo.

Glandulis quidem omnibus id commune officium esse, ut secretionem aliquam instituant, à *Celeb. Glissonio* prodirum est: At verò secretionem omnes (quæ nimirum ex sanguineâ massâ sunt) in *solis glandulis* haberi soletissimo *Malpighio* (quantum mihi rescire contigit) primò placuit, qui postquam penitiori inspectione partes illas, ubi ex iis maxime con-

conspiciuntur instituantur, cerebrum puta, hepar, & renes (contra quam antea creditum fuerat) glandulosas compererat, ex methodi, quâ natura uti solet, simplicitate & uniformitate reliquas omnes (publicas scil. nec enim de privata intelligendum esse hoc Doctiss. Viri essatum satis testatur eorum, quæ super hac re profert, continuatus tenor) siquæ restant, de quibus non satis constat qualis sint prosapiæ, ejusdem esse naturæ, idque meritò, pronunciavit. Huic sententiæ non parum favet, quod magnam secretionum partem in glandulis celebrari nemo Anatomicorum inficias unquam ivit. Mammæ, testiculos, glandulam pituitariam, maxillares, tonsillas, pancreas, sicut glandulas esse nemo dubitat (sic pariter secretioni inservire norum est. Adde quod vix uspiam in toto corpore secretionem ex sanguine haberi adhuc compertum est, quin, licet secretoria haud detecta sint vasa, glandulæ tamen, vel saltem glandulosa aliqua substantia, juxta locum ubi prorumpunt, sitæ sint. Sic ad basin cordis glandulas sitas esse Cl. *Lowerus* docuit, atque ex iis liquoris in pericardio contenti fontem deducit: sic eutem substantiam glandulosam esse, tanquam valde probabile Cl. *Steno* censet; quam & *Malpighius* miliaribus glandulis refertam innuit: sic glandulosam, quæ in plexu choroide occurrit, substantiam humorem cerebri ventriculis suppeditare idem *Steno* arbitratur; imò pluribus instantiis, nisi longum esset, res hæc evinci posset. Ex quibus quantâ probabilitate *Malpighii* nititur sententia satis liquet.

Quam verò Cl. hic vit de illâ solummodo quæ ex sanguine fit sententiam pronuntiavit, liceat mihi ulterius extendere, chylosamque secretionem sub eodem censu complecti. Cum enim non tota assatim massa ex intestinis in lætras elurietur, sed purior tantum pars ab inutili crassamento secernatur, cujus etiam non tam quantitas (quâ tamen satis largâ suppeditatur) quam perfectio, & noxiæ fæcis carentia ad futuros usus requiritur, utpote ex qua progignuntur cuncti, etiam nobilissimæ sortis liquores; haud proinde verò consentaneum videtur naturam, dum tanti momenti, & quæ reliquis analogiam habet, secretionem molitur, ab usitata norma deflectere velle, nec dissimilia, ut hanc patret, organa designare. At iniquis, nemo Anatomicorum ullarum glandularum intestinis adstarum meminit, nec quicquam iis cum glandulis commune esse propalavit; omnes enim ex duplici tunica (præter eam quam peritonæo debent) constare asserunt, quarum unam carnosam volunt, alteram nervosam: nec quidem inter se consentiunt; alii enim interiorem carnosam, exteriorcm nervosam, alii contra statuunt; nullam verò glau-

glandulosæ substantiæ mentionem faciunt. At verò pace tantorum virorum res aliter se habere mihi videtur; Dum enim, operum naturæ uniformitatem revolvens, intestina, reuina præsertim, attentius lustraturus aperio, statim mihi se sistit interior eorum tunica facie glandulis omnino simili, duodeni maximè in quo, quia major inde lactearum exoritur numerus, magis conspicua glandulosa natura. Nempe si inspiciatur quanto à bilis tinctura immunis fuerit, alba, molli, & porosa apparet; tantumque abest ut ad chylum propellendum (cui tamen usui ab Anatomicis destinatur) nata videatur, ut si incisione in longum ducta intestinum aperiat, statim sese explicat hæc tunica, atque superficiem convexam, vice concavæ qua integris intestinis potitur, sponte affectat; quæ quidem in hac *phæm* convexitas non tam à fortiori fibrarum tunicæ exterioris contractione (licet hæc ex parte ad phænomonon hoc exhibendum concurrat) quam interioris hujus libera, tibi sui juris sit, expansione pendere videtur; quoniam nullam sic explicata renitentiam prodit, quam tamen necesse haberet subire, si, quemadmodum comminiscuntur, fibris transversis (quales ad chylum pellendum necessariæ sunt) constaret; unde & in statu solito vi compingi & coarctari verisimile est, haud secus ac spongia manu compressa, cui & quoad usum omnino similis videtur. Idcirco probabile videtur, universam hanc tunicam (non secus ac cunctæ glandulæ) nil aliud esse nisi valorum congeriem, osculis in intestina hiantibus præditorum, à quibus continui ad venas usque lacteas proteaduntur ductus, in quas post varios forsam interandros, & mutuas implicationes, tandem colliguntur; pari ratione ac capillares venulæ in unum coeunt truncum: ex quo liquet, nil hanc tunicam peristaltico intestinorum motui conferre posse, verum iis tenixu suo dilatandis potius conferre. Agnosco sane hosce sub aspectum non cadere tubulos, sed hic naturæ mos est, ut separationes in minimis vasis molliatur, quorum cavitates ne adjuti quidem attingere potest vel perspicacissimi oculi acies; verum tales dari ipsa chyli in lacteas transmissio palam facit. Plane omni ex parte glandulis similis videtur hæc tunica, ut hinc ad sententiam, vel *Malpighianam*, firmandam nonnihil forsitan lucis accedat.

Constat quidem ex accuratiori nuperorum Anatomicorum observatione inter partes, communi isthac glandularum appellatione gaudentes, satis magnum discrimen intercedere: aptissimè enim, ex substantiæ modo in *Conglomeratas* & *Conglob.* Cl. Sylv. distinxit, quæ sane interiori fabrica non parum ab invicem distare videntur. Verum quandoquidem

utra-

utraq; species secretoria vasa obtinet (licet ab illis vel extrorsum tendant, vel saltem in certa conceptacula terminentur; ab his, ad venas vel immediatè, vel mediavitibus aliis ejusdem familiz glandulis propereant, prout Cl. Steno observavit) probabile adeo mihi videtur, eidem utramque muneri in genere inservire, nempe Secretioni, licet aliquatenus, ob variam istarum partium inter se structuram, diversè.

CAP. VI.

Secretionum tam Simplicium, quam Mixtarum generalis methodus.

Secretionum differentiis, fontibus, & organis hucusque illustratis, tempus est ut ad modum, quo peraguntur, describamus. Et quoniam multum discriminis intercedere mihi videtur inter simplicium & mixtarum, non minus secretandi methodum, quam materiam, de iis oportet ut seorsim agamus, præmissâ tamen communi; quâ utrumque genus convenit ratione.

Idcirco ad omnem, quæcunque in corpore peragitur, Secretionem Percolatio immediatè requiritur. Dum scil. (ut ad mentem ferè Cl. Charleoni rem hanc explicemus) liquor aliquis variz magnitudinis & figuræ, iisque satis laxis, scædens particulis, secretorio operi destinatas partes tranat, ex, quæ figura & magnitudine adstantium secretoriorum vasorum osculis proportionem geruat (sive massæ à tergo insequentis protrusione, partiumque ambientium pressura impulsæ, sive ab iufusa quacunque substantia ad secedendum determinationem nactæ) in conceptacula ista, modo idonea positione adveniet, faciliè divertunt; in quæ postquam admixtæ fuerint, non invitæ ab aliis post se admixtis (juvante peristaltico istorum vasorum motu) ulterius propelluntur; reliqua inierea massa, cujus particulæ, vel hac aptitudine, vel tali determinatione carent, vel nimia quantitate ad tam angustos canales congeruntur, vel etiam rapidiori cursu urgentur, per patentiores vias transfretata.

Ab hac percolationis methodo (quæ satis cuivis obvia est, utpote ad *mechanicæ* normam accommodata) sequitur varii generis liquores ex uno eodemque fonte, modo satis heterogenea

genera constet materia, variis in partibus emergere posse, prout nempe variorum valorum colatoriorum poruli diversa ab invicem figura & diametro pollent, quorum propterea hæc unius, alia alterius generis particulas (ubi determinatio forissecus accesserit) suscipere nata sunt. Sic in majori mundo, dum plures aquæ dulcis (sæc licet inter se discrepantes) fontes hic illic exurgere cernimus, omnes tamen ex mari impensè falso, aliisque, prout fas credere, qualitatibus, ab admittis pluribus variis generis substantiis prædito, oriundos, eosque viribus, ab hoc plurimum diversis, non secus ac ab invicem, donatos; palam est talis colaturæ, qualem diximus, medio hoc præstari: secus enim (si nempe satis parulos inveniant meatus) nil vetat, quominus omni suo, cujuscunque tandem generis particularum, satellitio stipatæ prodeant: prout ex salinis alicubi emergentibus fontibus, ipsumque maris genium redolentibus, dignoscere licet.

Interea non prætereundum est me, dum Secretionem omnem percolatione immediatè peragi assero, *Percolationis* vocem ipsam solummodo actionem, qua congruæ particulæ ex cæterarum gremio in organa earum suscepcioni disposita secedunt, intelligendam velle, absque respectu ad causas hanc recessionem efficientes. Quamvis enim quando ad secretionem explicandam affertur, pro eâ vulgo sumi solet quæ solâ partium constrictione, aut ipsius massæ impulsu, particularumque secedentium spontaneo nixu sit, nulla extraneâ superaddita, substantia, quæ determinationem ad subintrandum det; non minus tamen & illa hanc appellationem meretur, quæ immediata activæ alicujus materiæ in ipsa parte secretoria in præterfluentem massam affusione peragitur, cujus ope cum determinatæ quædam particulæ in congruos adstantium vasorum porulos propellantur, retentis aliis, quæ hac aptitudine carent, adeoque secessio electiva, ad istorum scilicet porulorum certam figuram & diametrum proportionata, concitetur, quid hoc aliud est quam percolatio; Ne verò nimis longè à recepto loquendi usu recedamus, priorem modum *Mere percolationis* appellatione indigere liceat, ut sic magis distinctè procedamus.

C A P. VII.

Secretionum Simplicium, seu Perfectivarum ratio.

U T ergo ad Secretionum memoratas species descendamus, videtur Secretiones *Simplices*, quas & *Perfectivas* appellavimus) *mera percolatione* perfici. Præcedanea quippe, sive intestina fermentatione, sive fermentorum undecunque desumptorum miscella (de quibus postea) usque adeo laxatam laticis compagem, atque ejus particulas sic comminutas & disjunctas supponimus, ut facili negotio aliæ ex aliarum consortio sese, ubi vis aliqua propellens accesserit, exturbari patiantur, unde nil amplius requiri viderur, quam ut, modo vasa convenienter disposita adstant, massæ protrusio, & continentium partium pressura accedat, quo fieri non potest, quin tenuiores particule, & quæ vasorum hiantium proportionem non excedunt, in ea divertantur, & hac quidem arte, nec prorsus alia, tum *chyl*i ex intestinis in lacteas, tum *succi nervosi* ex arteriis cerebri in nervos, trajectionem (servatis circumstantiis debitis) perfici arbitror.

Ut verò hoc magis pateat, alterutram paulisper expendamus. Ex primò quod ad *Secretionem intestinalem* attinet, quandoquidemunicam intestinorum interiorum *spongia* assimilavimus, ejusdem exemplo rem hanc exponamus. Hæc ex innumeris juxta sris tubulis, extrorsum aperturas habentibus, constata est, qui (sive distincti permaneant, sive invicem communicent, haud ad rem præsentem refert) introrsum adque oppositum latus, per totam molem continuas sortiuntur cavitates, per quas admissus aliquis, si propellens præsto sit causa, promptissimè se diffundit liquor. Isti verò tubuli, quandoquidem determinatæ sunt figuræ & diametri, non quasvis indiscriminatim admittere possunt substantias, sed tales solummodo, quæ vel quoad molem, & figuram, aperturis proportionem habent, vel ipsis exiliores sunt; eas verò, quæ vel majusculæ sunt vel minus idoneæ figuræ, hoc nomine ab introitu prohibent: adeò ut, si diversi generis particulis massa hæc liquoris abundet, quorum aliæ meatibus dictis majores, aliæ minores sunt, liquet tenuiorum solummodo, ceteris paribus, secretionem è crassiorum medio fieri. Cum verò hujusmodi in istos canales admissus fuerit liquor, atque alium huic, à quacunque causa, superinduci contigerit, vel compressio in parte

parte primò admittente facta fuerit, ulterius statim serpit prius inclusus, usque dum ad oppositum latus tandem pervenerit.

Eadem prorsus methòdo in præsentì negotio res transigitur: Cum enim spongiosa sit intestinorum, quæ proximè chylum amplectitur, tunica, plurimisque aperturis, (quod nemo negaverit) in intestini cavitatem hiet, atque undique affluentem chyli massam particulis ad istos porulos proportionatis abundè refertam, habeat, ex hisce subtiliores, & magis congruas facillè intra hiatus suos, dum adhuc laxiores & patentiores (intermissa compressione sunt, admittit: Postquam verò motus peristaltici vi (quem totum exteriori tunicæ suæ debent) propius adiguntur intestina, atque connivere coguntur isti poruli, necessariò alius compellitur admissus succus, donec remittente hoc motu laxatisque tubulis, novus istius succi suscipitur proventus, atque repetita coarctatione tum ipse protruditur, tum prius contentum ulterius protrudit, tantisper dum tandem, iterato sæpius hoc labore, in lactearum majores rivos (qui ex dictorum tubulorum confluxu emergunt) adigatur, plenumque, auctis sic copiis, torrentem exhibeat. Compressio isthæc intestinorum, ejusque per tam frequentes vices iteratio, quamvis chylosæ massæ per eorum cavitates tractationi, quo singulis vasculorum chyloferorum siltatur officiiis, inservit; ideo tamen etiam requiritur, quoniam secernendus hoc modo succus nondum tantam adeptus est tenuitatem, ut liberè à retro admissio absque hujusmodi machinatione, protrudi sese patiat. Sed hæc res adeò manifesta est, ut ulteriori explanatione non indigeat.

De succi nervosi separatione res paulo intricatior videtur, licet non minus hæc, quam illam, mera percolatione absolvi conjicio. Et in hoc quidem cum chylosa convenit, quod singulis cerebralibus glandulis adstent vasa, quæ secedentem ex sanguine admittant succum: porro & motu progressivo allabens urgetur sanguis, adque istorum vasorum oscula deducitur. Interea tamen hoc discriminis intercedit, quod chylosa massa & satis crassa est, & perquam lento serpit motu, quo fit ut leniter sese stringentibus intestinis, non usque adeò sit disposita ad eorum compressionem eludendam, sed tenuiores sui partes in hiantes glandulosæ tunicæ tubulos hanc ob causam facillè dimittit, sanguis autem ad cerebrum appellens, & multò mobilioribus constat partibus, & citatori motu fertur, qui & cordis impulsu usque perennatur; quo fit, ut cum arteriæ venas patentioribus, quam quæ nervulis adsunt, cavitatibus donatas, sibi respondentes habeant, magis promptus sanguini in has trames sterni videtur quam ut quicquam ex ejus

perv

pensu in nervos deponi possit. Ut ergo qua arte nodus hic solvatur exogitemus, videtur mihi totum negotium faciliè expectari posse, si hæc duo supponamus.

1. Scil. Arterias, ad glandulas cerebrales sanguinem afferentes, auctam, præ ipsatum trunco, ramisque inde prognatis, proportionem obtinere.

2. Venas capillares arteriis adscitas, sanguinique revehendo dicatas his paulò angustiores formari, nec proinde tam liberè versus cor allatum per arterias sanguinem, quam istæ suggerunt, transmittere posse. Quibus concessis, percolatio isthic ad hunc modum fieri concepiatur. Dum scil. sanguis, cordis impellentis vi, in has arterias dedueitur, præ auctâ earum capacitate minus celeriter quam prope cor, fertur, unde subtiliores & spirituosæ particule, confundente agitatione minus sollicitatæ, ad nixus expansivos, ipsis genuinos, sponte se dedunt. Cum verò, præter hanc motus retardationem, ultior, propter venarum in ipsâ parte secretoriâ constrictionem, obex ei ponitur, ut longiorem moram illic trahere cogatur pronum est conjicere particulas subtiliores, tum propriâ tendentiâ (utpote quarum magna pars in ipso eruptionis articulo constitutæ sunt) tum parietum arteriæ, sanguine plenum distentæ, pressura nullo negotio in adstantes nervulorum ductus iter capessint. Interea tamen nulla hic stagnatio timenda est, quoniam, licet venas hoc in loco arteriis contractiores supponimus, non tamen usque adeò angustatas volumus, ut non vel crassissimarum appellationis sanguinis partium (quantum non tanto singulis vicibus numero, quanto alibi ubi patentiores sunt) transmittendarum capaces sint: unde nil, quod plus incommodi secum afferat, sequi potest, quam (quandoquidem perenni cursu à corde propellitur) quod tanto celerius per angustata hæc vasa transfreratur sanguis, quanto minor quam arteriis, diameter iis adest; adeoque & pari mensurâ, quâ hunc recipit, exonerat se pars, & non minus pleno torrente eundem ad cor venæ reddunt (excepto quod pars ejus à vasis secretoriis delibatur) quam arteriæ ab hoc accipiunt.

Suppositionem hanc de improporionatâ vasorum invicem magnitudine nimis arbitrariam fortasse aliquis causabitur, eo quod nulla ad eam firmandam testimonia ab *anatomia*, propter inconspicuum vasorum, ubi in ultima dirimuntur capillaria, exilitatem, speranda sunt. Verùm enim verò vix concipi posse mihi videtur ullam habendam fore percolationem, si tam rapido, tamque libero, atque ex corde fertur, motu per cerebrum labatur sanguis, nec illi mora hic neccatur; nisi supponere quis voluerit fermentum hic latere, quod determinationem subiugressuris sanguinis particulis det: At cui tale aliquid commi-

nisci

nisci animo fuerit sat difficile, ni fallor, pensum incumbere monstrare uude suam trahat originem, quâ (mechanicâ) arte in præterlabentem gurgitem agat, ut præcipitationem hanc efficiat. Si enim per vasa aliqua propria affundi concipiatur, oggeri poterit, nulla hic repetiri (quantum saltem hætenus liquet) quæ fermentum tale apportant, & si darentur, quæstio recurreret, & unde iis suppetere & quâ arte conficeretur: si verò in ipsius cerebri adstantibus cellulis stabulari supponatur indeque continenter evomi, quid hinc sanguis hoc imbutus reportare potest, nisi ut copiosius ebulliens, neglectis deviis & angustis nervulorum tractibus per propria, satis patentia & recta, vasa (modo solitam ad invicem proportionem gerant) vegetius discurrant? Verum facillimè, & mechanico prorsus ritu rotum ex allatâ suppositione compleri posse negotium mihi videtur. Quinimo Cl. Steno ut salivaris secretionis modum explicaret, talem venarum coarctationem committitur, glandulisque, ad hanc provinciam destinatis, nervos idèò potissimum datos supponit, ut venas arctiores reddant, sicque alluentem sanguinem aliquandiu in glandulis istis quodammodo sistant, ut in salivares ductus hæc morâ serosior transcoletur pars: Quod si verò huiusmodi Secretiones, ut perficiantur, tali venarum coarctatione (ut summè probabile videtur) indigeant, & quoniam *interpolata* sunt, *mentisque imperio subiectæ*, nervorum (quemadmodum Clariss. vir ingeniosissimè commentus est) ministerium exigere videtur; quidni, ubi constantem, nullisque non momentis necessariam, & quæ à mentis nutu nequaquam pendet, secretionem comperimus, constantem quoque causæ præsentiam supponere licet? quæ sanè non alibi, quam in ipsâ partium huic famulantium quærenda est fabricâ. Verùm non parum fulcimenti huic sententiæ accedit à celebri illo doctiss. Loweri experimento, in quo, ligata majori aliqua vena, ne sanguis ad cor redeat, maximas ultra ligaturam, in partibus ad quas talis attinet vena, serosi humoris profusiones observavit solertissimus vir, quod planè, quantum ad secretiones moliendas venarum coarctatio faciat, satis evincit.

Quoniam verò ampliaras respectu trunci arterias modo supponimus; ne gratis hoc dictum sit, liceat paulisper digredi, arque pauca afferre, quæ suadere mihi videntur, non tantum hic loci, sed & ubivis fere in toto corpore, taliter fabricatas esse.

Digressio de Vasorum sanguiferorum proportionem.

Vulgata sententia eam vas sanguiferis desert proportionem, ut ramuli eorundem omnes, in partium habitu desinentes, tantundem sanguinis, nec amplius quicquam continere valeant, quantum rami majores juxta cor. Mihi verò (salvo huic astipulantium honore) aliud videtur, nempe vasorum istorum singulas distributiones trunci, à quo proveniunt, proportionem excedere, quantoque longius à corde excurrunt, tanto magis, in proportionem dicta, eorum amplitudinem augeri; adeo ut extrema capillaria, collectivè sumta, effatu dignam sanguinis quantitatem, præ majoribus ramis sub eadem longitudine contiendi capaces sint.

Quod mihi opinionis hujus ansam primum præbuit, hoc fuit; nempe quod difficile mihi videbatur, quâ nutritionis, quâ secretionis, obeundarum rationem, satis ad mechanices leges quadrantem, ex priori supposito comminisci. Neminem enim later (cui saltem *Lowerianæ* innotuerunt observationes) quanta celeritate sanguis ex cordis sinubus erumpit: Si verò pari passu per renellum corporis habitum prorueret, vix concipi potest quin pessum eant omnia, atque nutritionis vice partium absumptio & deprædatio, si prius extitisse supponerentur, invehatur. Cum enim nutritio nil aliud sit, nisi congruæ cujusdam substantiæ partibus in deperditæ locum, appositio; utque aliquid apponatur, necesse sit, ut tali motu sanguis (ex cujus penu nutriticatum suum immediatè, maximam saltem partem, delibant partes solidæ) feratur, quo ipsius particulæ, & satis facillè cedere possint, & ex his in exhaustarum partium, pro earum indigentia, caver-nulas congruæ demandari, videtur quod si tam rapido cursu, quam ex corde prorumpit, in has deferretur (quod necesse foret, si in vas æquali per totos suos tractus proportionem gaudentibus agatur) & ipsius particulæ nimium confunderentur, & violenta atietatione quæ partes ipsas constituunt abriperentur, tantum abest ut in futurum augmentum ullæ ex ejus sinu deponi possint. Et revera si quis attendat quantum vitium vel lenissimi liquoris motus rapidior ad solidiora corpora conterenda habeat (cujus rei exempla in fluminum decursu, necnon stillantis aquæ in saxola loca defluvio cuius occurrunt) laudè difficulter sibi persuaderi forsitan patietur, sanguinem (in cujus insuper sinu non paucæ prædatoriz & valde activæ, delitescunt particulæ)

si tam præcipiti torrente per tenellarum parvum angustias rueret, eas secum abrepturum. Pari ratione nullam (nedum in cerebro, sed nec in cæteris partibus) peragi posse videtur secretionem, quandoquidem in tanta agitatione, nec sese à mutuis amplexibus varias, ex quibus conflatur, particulas liberare, nec proinde earum ullas vasorum secretoriorum ora subire posse verisimile est. Isthæc verò virari possunt incommoda, supposito quod vasorum istorum capillaria proportionem ad truncum auctâ fabricavit natura; satis enim placide sic movebitur sanguis, ut & debita singulis partibus esca suppedietur, & particulae degentes, aut aliàs ad secretionem destinatae, vel exprimantur, vel alia aliqua arte ex massæ gremio præcipitentur.

Nec dubitari posse reor æqualem vasorum proportionem æqualem in decurrente liquore, ubique in toto ejus tractu, celeritatem efficere debere, ut nec inæqualem, quam vasis sanguiferis assignamus, sedatorem in ampliata parte motum efficere. In fluviorum enim decursu cuivis observare pronum est, quod si æqualem ubique distantiam servant ripæ (pari insuper servata profunditate) eodem ubique tenore delabatur unda, sin alicubi longius recedant, pacatius illic serpat, nec has in tantum atterat. At hoc in machinis hydraulicis evidentius conspici potest, si enim æquali ubique diametro formantur tubuli, pari, qua impellitur, extruditur aqua vi: sin patentior fuerit emittens extremitas admittente, tanto remissior egredientis, quam immixtæ, deprehendetur impetus, quanto cavitatis proportio major fuerit.

At objiciat forte aliquis instantias datas (posteriorem præsertim) omnimodam alvei transmittentis plenitudinem supponere, quæ in vasis sanguiferis minimè admitti debet; extensibilis enim sunt textura, cujus causa motus sanguini in iis contento à corde impressi vis remitti credatur, antequam ad extrema capillaria pertingat, nec usque adeo plena unquam conspiciuntur, quin pluris capacia sint. Cui repono, quod præterquam quod cor singulis pulsibus per magnam sanguinis quantitatem (quantam scil. universa ventriculorum diductorum continere potest cavitæ, qui prout Cl. & exercitatissim. Loweri observatione constat, tam arcte in systole contrahuntur, ut totum, quem in diastole admisserunt, in hac expellant) in arterias prius immisso adhuc refertas magno impetu expellit) qui eas fortân in tantum implere supponatur, quantum ipsarum tunicae, magis quam venarum rigidae, ferre possunt, prout ex duritie & tenuitate, quem in earum diastole percipimus, suspicari licet) hoc insuper accedit, quod plerisque in locis à musculosis carnibus, aliisque partibus, maxime
quanto

quanto magis ad terminationem appropinquant, circumsepian-
tur, quarum *syftaltico* hoc motu & ægrius se irruenti laxant
fanguini, & per impulsus intervalla eundem majori vi pro-
sum urgent; adde quod nec ipsæ arteriæ, densis & fibrosis
(quas contractiles esse nemo ignorat) tunicis confatæ, motu
restitutivo destituuntur, unde cum impressa à corde sanguini
vis (qua ultra naturalem statum distenduntur) cessaverit, in-
teriorum confectum propria fibrarum contractione se prori-
piunt, atque hoc ipso alias subterlabenti addunt sanguini.
Unde constare videtur, nisi arteriarum aucta, quam diximus,
proportio suppetias tulerit, parum opis ab earum quali quali
laxitate, ad sanguinis motum circa extremitates minuendum,
sperandum esse, imò porius præ nixu tum suo, tum partium
circumpositarum, compressivo majorem sanguinis acceleratio-
nem invec tam iri.

Verum insuper ambigi poterit, annon arteriarum in capil-
lares ramulos diremtio proruentis sanguinis impetum immi-
nuat, cum exile fluentulum non usque adeo objecta corpora
atterere posse notum sit, atque plenior torrens. Verum enim
verò, sit, concedatur motum sanguinis in hisce arteriis æ-
què celerem esse, atque in majoribus ramis, res ad idem re-
cidit. Cum enim sanguinei hi rivuli non agant nisi in per-
exiguas partium, in quas impingunt, particulas, quæ quamvis
collectim sumtæ satis solidas constituunt substantias, singulæ
tamen seorsim spectatæ suoapte admodum genio teneræ sunt,
facileque divulsionem patiuntur, perinde videtur ut tum ple-
no torrente decurrant an in tenuissima fluenta dispescantur, mo-
do pari celeritate fluant.

Si verò dubitetur, quomodo tam citato gurgite sanguis ad
cor redeat, cum tam lento gressu per partium habitum ser-
pet; respondemus sententiam nostram eandem in venis,
quam in arteriis, proportionem supponere [ut scil. quanto
propius ad cor accedunt, tanto magis in dicta proportionem
angustentur] atque notum est non magnum discretum, quoad
cavitatem, inter aortam & cavam intercedere, ubi cordi in-
feruntur; quin & hanc isto loco musculosam esse, ut adven-
tantem fortius in cor urgeat sanguinem; idcirco dum indefi-
nenter ex arteriis in venas cordis vi propellitur, atque par-
tium, quas pertransit compressivo nixu, prout modo dixi-
mus, urgetur, utrunque lentius, ubi amplum magis spatium
offendit, moveatur; postquam tamen in arctius hoc protru-
sus fuerit, necesse habet loci angustias motus acceleratione
pensare. Atque hinc fit, quod Portæ truncus arteriarum in
morem pulsare deprehenditur, quod tamen in ejusdem radi-
cibus per mesenterium sparsis non contingit; quia nimirum

arteriis celiacæ & mesentericæ cavitatis amplitudine responderet, ideoque eadem illi sanguinis quantitas; quæ his implendis debetur, unde & motus pulsatilis sanguini has subeunti à corde impressus isti pariter restituitur; quidni enim hæc, tametsi in sanguinis per ampliatis meseraicarum ramositinerere dispergatur, in istis angustiis recolligi possit, adeoque interpolatum illum cordis referre; Idcirco quod venæ nunquam pulsant (Porta enim intra hepar, non earum, sed arteriarum censui adnumeranda est) nil aliud in causa est, præter earum amplitudinem: cunctis enim in propatulo est eas multo arteriis ampliori cavitare donari (nisi ubi eandem arctari aliquatenus debere inuimus) quod ideo solum fieri videtur, ut pacatiori flumine sanguis in cor, lentè sinus suos laxans, itcepat, ne, si impetuosius influeret, nimis distenderet.

Sed ne solis conjecturis hac in re nitamur, adnotari metetur, quod Cl. *Needhamius* observavit, *arterias* nimirum *uterinas* tempore gestationis multum *grandescere*, ut tandem in ejus progressu fere decuplo majores appareant, quam ante gestationem fuerant. Cujus rei causa mihi videtur, non solum ut satis magna alimenti copia foetui suggeratur [quam solam affert *Celeb. Vir*] sed & ut sanguinis motus retardetur, ut sic & magis idoneæ alimentares partes ex sinu suo exturbari patiat, & præcaveatur, ne nimio impetu tenellum pessundet foetum.

Sicut verò hanc in arteriis omnibus conformationem locum habere arbitror, sic in cerebro potissimum requiri; quod cum animæ delubrum sit, cunctarumque actionum animalium fons & scaturigo, cumque tenerâ adeo & laxâ compage constet, ut injuriis, plus aliâ quacunque parte, obnoxium sit [unde robustissimâ galeâ munitum voluit sapientissimus conditor] cum porro succi nervosi ni mavis, spirituum animalium è sanguine secernendi tanti iuserit, ut hujus motus lenis placidusque sit; oportere proinde videtur, ut satis ampliatis obtineat arteriarum canales, sanguinei impetus moderandi causa; quæ nisi adsit conditio, vix concipi potest satis hisce muniis prospectum iti, Sed de hac re satis (superque fortasse] dictum.

C A P. VIII.

Secretionum mixtarum ratio generalis.

Secretionum Simplicium methodo sic traditâ, quam in merâ percolatione consistere arbitramur, proximum est ut ad *Mixtas* pergamus.

Idcirco videtur has omnes, tam Excretivas, quam Reductivas, *Fermento*, ut peragantur indigere, cujus ope talis determinatio certis quibusdam sanguinis particulis imprimitur, ut relictis cæteris (forsan mobilioribus, adque secessionem suapte genio magis prouis) in secretoria vasa promptè facessant.

Alias præterquam subtilissimæ sanguinis secretionès dari, nemo negaverit, qui quantum discriminis inter singularum, fermè, intersit materiam, perpenderit; nec dubium esse potest, quin subtilior, omni quæ foras excernitur, intus (saltem majori copia) restitet materia, cujus ministerio vitæ, & sensus, munia obcunda sunt. At vero si solâ percolatione res omnis transigeretur, nil impedire posse videtur, quominus sola subtilior exeat, crassiori interim intus detentâ. Cum enim ad mensuram porulorum vasorum transmittentium in percolatione, omnis se accommodet materia, hæc illa, quæ mole minima, & agillima est, promptissime se insinuabit, utpote quæ & promptius se è crassiorum amplexibus extricare valer, & minus impedimenti inter ingrediendum offendit. Porro cum plurimum expansivæ sint tales particule, atque spontaneo nixu secessionem affectent, vix concipi potest quin, dum sic avolare nituntur, in adstantia secretoria vasa satis facilè viam capessant; eoque magis si, quemadmodum supposuimus, & moram aliquam massa in parte secretoria trahat, & partium circumpositarum pressura urgeatur.

Ne quis verò suscipientium porulorum figuram hic causeatur, quasi neutiquam subintrare possit appellens materia, nisi pari cum tubulorum aperturis figurâ polleat; sciendum est, rem ita quidem se habere, ubi ingressurarum particularum moles non ita multum distat à pori magnitudine; ubi verò multo minores sunt, ut nullus inter illas & vasorum latera contractus detur, nulla omnino habenda figuræ ratio, quoniam quocumque modo figuratæ sint tales particule, si ad oppo-

sita vasculorum qualitercunque figuratorum latera extremis suis non pertingant, nequaquam ab iisdem arctari poterunt, sed perinde iis erit, atque si in utrumque libero spatio moveantur. Er talis quidem indolis sanguinis spiritus esse, conjicere licet ex longa & accurata elaboratione, unde plurimum comminui necesse habent, qua sicut molem cæteris ejus partibus multo minorem obtrinent, sic porro infra vasorum plurimorum secretoriorum diametrum [quacunque tandem ex dimensione spectaveris] consistere verisimile est, quæ si ex crassioribus tales admittere possint, quæ satis grandi mole constant, multo potius earum vice subtilissimas recipient, nisi aliis artibus harum retentioni, illarum verum exterminationi, cautum foret.

Ad hanc rem porro advertere possumus, quod ubi tam crassiorum, quam tenuiorum, in unam massam confluentium corporum congeriem in motum suscitari contingit, illa, utpote æquali cæteris morus gradu agitata, majorem inde nanciscuntur vim ad motus suos secundum lineas rectas retinendos, quo sit ut tenuiora [non minori morus gradu agitata] minus illorum motibus præ improporcionata mole resistentia, haud difficilli negotio locum cedere faciant, quantumque loci, in quo motus hujusmodi instituuntur, ratio paritur, ex sui contubernio exterminare gestiunt; id quod ex morus legibus ab *Immortali Cartesio* recensitis constat. Hinc patet sanguinis particulas crassiores, æquali cum subtilioribus vi à corde pullas, necessario has, quantum vasorum angustia permittit, è sui exturbare gremio conari: & quamvis hoc ubivis loci obtinere non possunt, eo quod vasa præ sua soliditate eas ab avolatione cohibeant, ubi tamen transitus patet [qualem secretoria vasa præbent] credibile videtur, tenuiores has foras propullas iri, nisi vel introsum retorquerentur, vel alia aliqua accederet causa, à qua intus detineri supponantur. Utenique sit, videtur has potius quam illas foras clapsuras, nisi ab affusa agili aliqua materia crassiores vi exturbatz fuerint. Quod vero obijci poterit vina, aliosque liquores, in dolis fermentescentia crassiores undequaque rejicere particulas, subtilioribus & spirituosius intus stabulantibus, in promptu est referre, quod nulles hic lationis motus adest, sed præcipuam quam habent istiusmodi liquores agitationem spirituosius particulis debent, quarum idcirco fortior morus eandem vim ad crassiores exturbandas habet, quam crassioribus in sanguine ad has eliminandas adscripsimus: adde quod majores in proposita instantia vires acquirunt spiritus, quod in ocluso vase separatio hæc instituitur, cum satis notum sit, quod, si spiraculum detur, avolare soleant, totaque liquoris massa eorum defectu brevi vapida evadat.

Non

Non equidem diffiteor, in quibusvis secretionibus non contemnendam particularum spirituosarum quantitatem una cum crassioribus prodire: nec enim fieri potest, quàm simul in vasa secretoria se insinuent, tum præ molis exiguitate, tum etiam quia non tantam in massa sanguineâ laxitatem supponere debemus, ut disjunctæ prorsus ab omni cum crassioribus cohesione in illa libere fluerent, tum insuper ob aliam rationem inferius tradendam. Interea tamen, sicut non ex naturæ designatione excernuntur [nisi forte ut subtilitate sua liberiores crassioribus commeatum præbeant] sic exiguum ad restantes proportionem gerunt. Si enim vel cum urina ipsa prorumpentes pari numero cum reliquis, quæ cum sanguine repes alluente atque hunc suppeditante, redeunt, excreta forent, quandoquidem hæc magna copia quotidie excernitur, vix concipi potest, quin, emolumenti vice, satis notabilis sequeretur virium jactura: At si potro, quantus aliarum præterea secretionum numerus sit, contemplemur [quibus tamen omnibus sensibilibus simul unitis perspiratio insensibilis sola, si *Sauvages* credendum, longe plenior esse solet] sique harum singulæ proportionalem spirituum quantitatem ad reliquas sanguinis appellentis partes profunderent, haud omnino fieri possit, ut qualem ceruimus animalis persisteret œconomia.

Quandoquidem igitur tam inepta videtur *mera percolatio* ad crassiorum particularum secessionem moliendam quam aliâ ratione id præstandum, nisi *Fermento* in scenam vocato, quod has in vasa secretoria præcipiet?

Haud sane novum nec inauditum est apud percelebres Authores *Fermenta* in corpore nostro dari. Ex quo credi desinit Chylosteos munus solo calore fieri, Fermentum (undecunque tandem devenerit) in subsidium vocatum fuit. Pariet de Fermento Cordis quàm speciosa à non paucis summæ eruditionis & notæ viris allata fuere? nec defuere, qui & aliis partibus adscripserunt. Qui tamen iis patrocinati sunt, partibus succorum coctioni & elaborationi inservientibus præcipue dicantur, de Fermentis verò ad Secretionem (tali præsertim quod ad ipsum hujus actum requiratur) rara mentio. Celeb. tamen *Needhamius* in hanc sententiam propendere videtur, quoniam tamen nec qualia sint, nec qua arte vires suas exerant exponit doctiss. Vir, utpote à cujus instituto remotior fuisset hujusmodi disquisitio, liceat mihi de his, pro modulo meo, explicatius aliquanto agere, sensaque mea in te dubiâ proponere aliorum exquisitioribus judiciis erutiunda.

CAP. IX.

De Fermentis.

IN hac autem disquisitione quædam in genere de Fermentorum natura & proprietatibus adnotanda sunt, quo facilius ad scaturiginem in corpore investigandam deducamur, & eorum actio, quatenus in secretionis exercetur negotio, intelligatur.

Pro *Fermentis* vulgo habentur talia corpora, quæ aliis, exigua respectu massæ cui admiscuntur quantitate, addita, vel particulas eorum multum exaltant, vel alias in iis mutationes impendio magnas producunt. Nec acceptio hæc à vocabuli proprietate multum abludit, quoniam, quas ab his oriri cernimus, vix produci possunt alterationes sine aliquali effervescentia (quæ in particularum mutuo motu & in se invicem actione consistit,) quam fermenti particulæ in massam, cui admiscuntur, invehunt. Unde quamvis eorum actiones aliter atque aliter determinantur, ut alia ebullitionem, & intumescuntiam efficiant, alia præcipationem, & particularum quarundam exterminationem, alia forsan diversum ab his operandi modum prodant, omnia tamen communi sub hac appellatione merito comprehensa videntur, quia particularum agitatione, in quamcunque tandem partem determinata, torum completur negotium.

Ut verò eorum natura & indoles (quatenus saltem ad rem præsentem facit istud examen) aliquanto penitius intelligatur, oportet ut ad eorum phænomena attendamus, è quorum numero hæc inter alia, si non præcipua sint, notata saltem digna occurrunt. Observari etenim potest

Primò, Cujuscunque generis corpora, humida præsertim, particulis activis referta, in fermentorum profapiam facessere posse. Huic rei Cel. *Willisius* suffragatur, sic enim ille, *Humor quipiam in quo salis, sulphuris & spiritus particula plurimum exaltata continentur, fermenti naturam induit*: additis insuper instantiis nonnullis, quæ huic rei fidem faciant. Nec (in ulteriorem hujusce effari confirmationem, quamvis forsan hac non indigeat) ipsa hæc separata (quæ vocant Chymici) *Principia* ista vi destituuntur, quamvis, quoniam simpliciora sunt corpora, magis limitatam obtinent. Sic spiritus vini [decan-
tatz spirituosii principii instantiæ] efficacia, qua in exaltan-
di

dis variorum concretorum viribus, quâ horum partibus segregandis, nemini, in artis Chymicæ operibus vel tantillum verlatato, non est nota. Sic salia (quemcunque eorum statum contemplatus fueris) nunc pro latentibus quorundam corporum facultatibus extricandis utiliter adhiberi, nunc præcipitatoriam vim (quod & fermentorum munus est) exercere pariter comperitum est. Nec Sulphuræ substantiæ (quæ sub oleorum specie præcipuè veniunt) hæc eneiigia carent; ad quod ex eorum aptitudine ad balsama ex variis concretis, puta Sulphure, Antimonio, &c. paranda constat, in quibus corporum istorum vires referari & exaltari nemo, opinor, negaverit. Et quamvis dubitari potest (quemadmodum plurimis, tum experimentorum, tum rationum momentis evicit Nobiliss. D. *Boyllus*) utrum in omnibus corporibus, ex quibus sub hac forma eliciuntur, talia actu semper existant principia, an ignis actione larvas hæc induant; quoniam tamen cunctis hisce concretis (saltem quæ fermenta audire merentur) tum ex Chymicâ analysi, tum ex effectibus tales adesse particulas, quæ in motum faciliè concitati aptæ sunt, constat, res ad idem recidit: nec enim ipsæ hæc (quocunque nomine appellaveris) substantiæ ulla alia ratione fermentorum titulum sibi vindicare possunt, nisi quatenus ex particulis valdè activis constantur.

Secundò, nulla fermenta in omnigena subjecta indiscriminatim agere, verum aliqua in hæc, alia in illa, prout dispositam, cui adhibentur, invenerint materiam, idque diverso plerumque modo. Sic (ut vulgarem instantiam demus) coagulum vitulinum, quo ad caseum conficiendum rusticæ utuntur, lacti additum caseosas partes, intactis ferè butyrosis, saltem minori numero deturbatis, præcipitat (quæ enim ex his unâ secedunt, id eo tantum nomine facere videntur, quod ab illarum amplexibus sese promptè extricare nequeunt:) id quod exinde patet, quoniam si, illis exturbatis, iterum (quemadmodum istæ feminæ testantur) aliquandiu quieverit, cremor in summo emerget, qui solito more conqussatus satis largam butyri proportionem præbebit. Porro cerevisiæ flos zytho novello additus, vel cum fariæ massa ad panem conficiendum, ut mos est, subactus (servatis circumstantiis debitis) in illo magnam effervescentiam, & particularum separationem, efficit, in hac eximiam intumesceniam conceitat, idem tamen lacti inditus nullam, vel saltem quæ alicujus momenti sit, alterationem inducit.

Tertiò, ea Fermenta universalius, & magis conspicuè, vim suam exercere, quæ magis composita sunt, hoc est, quæ ex pluribus
di-

diversæ indolis particulis, in unam massam confluentibus, & simul exaltatis, emergunt, quam quæ vel talibus quæ unius generis sunt, vel saltem minus inter se difformibus constant. Prout in fermento quod ex farinæ massâ subactâ & asservatâ constat, flore cerevisiæ, ovis, aliisque hujus generis cernere est; quæ in plura corporum genera agendi vim habere notum est, quam quæ [utcumque particulis activis constantia] destillatione patantur, & pro corporum, ex quibus proliciuntur, principiis veniunt, aliave cujuscunque generis, quæ simplicioris sunt fabricæ.

Quartò, compositiora ista digestionem debere, quod ad fermentativam indolem assurgant; imò ex iis quædam [si non maximam partem] ab hac non vires solum, sed & existentiam mutuari; sic, ova, florem cerevisiæ, aliaque hujusmodi, digestionem & ortum & incrementa accepta referre notum est.

Quintò, omnia fermenta in exigua ad corpora, quibus eorum impendenda est vis, proportionem agere. Sic omnibus perspectum est, quantula fiorum cerevisiæ vel fermenti farinacei [ut allatas instantias retineamus] proportio ad farinæ fatis largam massam fermentandam sufficit, ut in panem faecescat; quam exigua quantitate coagulum lacti affundi solet ad caseolas partes precipitandas. Si porro pertenuis illius substantiæ, mucorem liquoribus in doliâ hâc infectâ repositis imprimendis, inconspicuam molem perpendamus, si miasmata pestifera, nullis plerumque ante sensibus percepta, quam universos succos ferali labe inquinant; si miraculosam vim fermentativam, quam lapidi suo [nec enim fidem sancte affirmantibus temere cohibendam quis duxerit, qui serio sibi aliquid compertum afferenti adhiberi sperat] adscribunt Alchymistæ, merito tantos stupeamus effectus.

Sextò, Fermenta tanto vegetius agere, quanto majorem corpora, quibus impenduntur, particularum suarum sive laxitatem, sive agitationem, nacta sunt. Hinc solemus corpora, quibus admiscuntur, calori plerumque exponere, ut hoc fortius promptius sese fermentorum explicent particulæ. Unde & minor eorum sufficit quantitas, ubi corporibus talem dispositionem nactis admovenda sunt.

Ab istorum phenomenorum consideratione aliquatenus ad fermentorum naturam intelligendam promovere forsitan licebit, si præsertim sequentia perpendamus.

1. Primò, enim constat, corpora quo minutiora, tanto ut in motum concitentur, cæteris paribus, aptiora esse; utpote quæ hoc nomine impellenti cuicunque vi minus, quam grandiora, resistere valent.

2. Dein-

2. Deinde, quamvis & figuræ, ut hanc ad motum aptitudinem nanciscantur, ratio habenda sit; atque notum sit ea, quibus figura adest orbicularis, absolute considerata aliis, ejusdem molis, sed diversæ [cujuscunque tandem] ab hac figuræ, ad eum aptiora esse; ad effectum tamen in aliis corporibus, in quæ moventur, producendum ea, quæ angulis prædita sunt, majori vi pollent, eo quod istorum beneficio magis aptantur ad illa, in quæ impingunt, prehendenda; unde si agitationis, qua feruntur, tanta sit, ut illorum resistantiam superet, vis, in consimilem suo motum nullo negotio vindicant: cum è contra quæ glabra sunt, nullisque angulis prædita, facile à corporibus, in quæ feruntur, distorquentur, unde sit, ut nullum iis motum imprimere possint. Adde quod corpora angulis dotata [acutioribus maxime] magis apta nata sunt ad ea divellenda; quæ strictius cohærent; quoniam admissio [quod neutiquam vitari potest, si ulla omnino interjaceant spatiola] acutiori angulo, densior reliqua pars cunei ad modum [si qualem diximus motus gradum ista corpora habeant] necessario, dum sibi ingressum parat, majorem hiarum aperire debet, adeoque prius arcte cohærenti & dissociat, & in motum insuper concitat. Interea tamen

3. Corpora quæcunque suo apte genio ad agendum aptitudinem, quâ molis, quâ figuræ ratione, adepta fuerint, nisi tamen proportionem ad ea quibus admoventur obtineant, nullum in ea effectum producere possunt. Si enim vel in corpora poris laxioribus scatentia, quæ proinde nimis liberum iis transitum præbent, vel in talia quæ nimis facile è locis suis pelli nata sunt, vel etiam in compactiora, & quorum cohæsiō illorum ad impellendum vim superat, incidunt [quoniam hinc nimis magnam, illinc nullam, offendant resistantiam] irritō successu admisceri contingit.

4. Hinc potro deduci potest, quod quanto major particularum inter se difformitas adest, tanto vegetius conceptus procedit motus. Cum enim omnis actio, quæ alterationem inducit, requirit, ut partium movendi corporis ad movendum impulsus resistantia sit, sequitur quod ubi major harum adest varietas, sicut major hic resistantia est, sic, modo satis spatii istis concedatur, major proportionaliter actio, magisque varia, emergere debet, eo quod & dispositionem hinc obtinent particulæ istæ, ut in plura corporum genera agant, quam si simpliciores forent, & præ difformitate, ubi in motum concitæ fuerint, non partes solum corporis cui adhibentur commovent, sed & se mutuo pellunt, adeoque majorem agendi vim nanciscuntur.

His positis, verisimile videtur *Fermenta* esse corpora, quorum particulae & valde exiles sunt, & figuris insuper plurimum angulosis, plerumque & inter se multum difformibus, dotatae (licet intetea alia unius, alia alterius generis figuris, non minus quam diversâ invicem mole, constant) quo fit, ut cum corporibus, apte actionem suam suspiciendam dispositis, adhibita fuerint, promptè se quaquaversum diffundant, energiamque suam in resistentem massam agitationis, quâ pollent, & quam inde auctam obtinent, vi exerant, eoque magis quo inter se magis difformibus constant particulis.

Quod *Fermenta* minutè adeo, perque particularum, ex quibus constant, figuras & molem exponam, veniam facillè dabunt (quicquid aliis visum fuerit) qui perpendunt cunctas actionum, quæ à quibusvis profluunt corporibus, sive ut ex Petipatereticis elementis, sive Chymicis principiis conflata spectentur, explicationes huc ultimò reducibiles esse, quandoquidem quâcunque appellatione talia fruuntur, cum tamen corporea iis competit natura, & actû dividi debent, & determinatam aliquam figuram pariter sortiri necesse habent divisæ sic particulae, quo in alia corpora agendi aptitudinem nanciscantur. Sicut enim omnibus essentiale est corporibus, ut dimensiones & partes habeant, sic pariter figuram aliquam istæ partes ut sortiantur nemo inficias iverit, quæ sicut eas nunquam, nisi ipsâ cum essentiâ, deserit, sic ad cunctas earum actiones (relativas saltem) immediatè concurret. Et sanè si ad corpora sensui nostro obvia attendamus (quæ cum minoribus analogiam habere quilibet, opinor, concedet) cuius in propatulo est figuram iis dispositionem ad varias in corpora, quibus occurrunt, actiones extendas largiti, proque hujus diversitate diverso pariter modo ista affici: Sic globus, ex ferro, v. g. vel alia matetiâ fabricatus, aliter, & ad motum ineundum, & ad actionem in disposito corpore producendam, se habet, quam si vel cubi, vel pyramidis, vel quæcunque aliam figuram obtineret. Quæ quidem actiones cum à dictis modificationibus magis ad captum intellectus, utpote mechanice, explicabiles sint, quam aliis mediis, rationi consonum videtur & magis genuinam, & veritati magis congruam esse hujusmodi explicationem.

Quod verò hujus, quem descripsimus, genii sint *Fermenta*, ex allatis phænomenis forsan deduci potest.

1. Enim quandoquidem corporum activitas ab eorum exigitate, figuræque aptitudine, ut in hæc vel illa corpora agant, proficiscitur; cumque cuncta, activis particulis referta,

cor-

corpora in fermentorum censum cedere comperimus, concludi debet hæc & perquam minuta esse, & talibus, quas diximus, figuris donata.

2. Quoniam non indiscriminatim, sed electivè (ut ita dicam) agere Fermenta notum est, quid aliud causa esse potest, quam quod particularum ex quibus constant moles, & figuræ, proportionem ad hæc magis quam illa gerant, adeoque alia in motum concitandi vim possideant, aliis intactis?

3. Ex hoc alia aliis Fermenta vegetius & universalius agere deprehenduntur quid aliud comminisci possumus, præter molis & figuræ constituentium particularum difformitatem, quandoquidem hæc, ubi motus accesserit, abundè sufficit ad taliter dispositis corporibus vim agendi largiendam, ultra quam subire possunt minus dissimilata? Ista verò particularum difformitas vix sine angulositate concipi potest.

Cùm verò hujusmodi fermenta digestionem, ut plurimum, energiam suam debere comperimus, eximiam huic difformitati junctam particularum exiguitatem necesse est supponere: nil enim nisi comminutionem talia hinc reportant corpora, à quâ maxima ad motum propensio emergit.

4. Nec mirum proinde tantas, quantas censimus, in perpessilla quantitate vires exorere, cum tantopere præ iis quibus admiscuntur ad actionem concinnata sint, nec in eorum interstitiis præ exilitate arctari possint, ut à motu prohibeantur.

6. At verò satis obvium est, necessariò intensam fore istam activitatem, ubi præter intestinam, forinsecus insuper accesserit agitatio, quæ hoc nomine fermenti particulis, suo sane Marte ad agendum accinctis, alas ministrat.

Magnus sanè Cartesius (prout à Cel. Willisio de Anim. Brut. C. 1. citatur) Brutalem Animam ex rotundis & summè mobilibus particulis constari supponit; quod (cum anima hæc corpori fermentum sit, imò tale cui vix aliud in rerum naturâ efficaciam par quisquam facile excogitaverit, utpote quæ ram concinnam, ac cernimus, materiæ, ex quâ conficiendum est corpus, fabricam inducere, variasque præterea fermentativas in corpore actiones exercere nata est) meritò, si talis illi competat indoles & textura, allatam fermentorum descriptionem in dubium vocare poterit. At quamvis mihi penè religio sit à præclari hujus viri effatis recedere, conceptum tamen difficile videtur, quomodo intra corpus detineri possit, si talibus constaret particulis. Quodnam enim
glu-

gluten has summe mobiles, imò actu non leviter agitatae, & ab invicem disjunctas (nisi quod punctis solummodo, iisque identidem variantibus se mutuo contingere debent) intra corpus, tantopere iis ubivis pervium, detinere concipiatur, quandoquidem & figuræ ratione ad avolandum maximè concinnatae sunt, minusque proinde obstaculi offendant, & præ exiguitate facilè poros corporis pervadere possunt? imò quid vetat quo minus vel objectorum forinsecus appellationum ictus, invigorationis vice, extra domicilii sui claustra, eam proturbent? Quinimo, si (quemadmodum Cel. *Willisio* placuit) anima hæc solummodo *flamma* sit, ex sanguine, more culinaris, suscitata, necesse est ut ex pluribus, iisque varii generis & figuræ particulis constetur: cum enim hæc motu, eoque peritudo, exciteretur (in quo pariter forma ejus, dum esse flamma perstat, consistit) haud concipi potest unius solummodo generis particulas ad eam exhibendam abreptum iri, reliquis intactis: quin, ex materiis accensu pronis non exiguum numerum sat difformi particularum apparatu constare palam est, quas tamen fere universas in flammam converti cernimus. Et quamvis motus hic angulos istarum particularum necessariò, dum in alias aliæ impingunt, deterit, adque orbicularem figuram hoc nomine reducit, hinc tamen & iis majorem ad avolationem promptitudinem ministrat, citioremque proinde flammæ, ni novus altunde pabuli suppetat proventus, extinctionem invehit.

Ex dictis colligere licet fermentorum actiones ad duplicem censum revocari posse. Videretur enim alia *expansivo* nixu vires suas exerere, alia *præcipitatoriâ* potissimum vi pollere. Prioris generis sunt, quæ ex particulis inter se difformibus consilari diximus, cum, præ tali discordantiâ, postquam in motum vindicatae fuerint, non tantum in massæ fermentandæ particulas agant, sed & in se invicem: etenim in tam difformi particularum activarum conventu, & aliæ alias recedere cogunt, ut sic singulæ satis nanciscantur ad libere movendum spatii, & nullæ non varias in massâ offendere possunt, in quas agant, particulas; quo fit, ut continuus in massâ usque perster orgasmus, donec vel subactæ, vel extrusæ quæ his obfistunt, adque aliqualem uniformitatis gradum singulæ tandem redactæ fuerint. Quæ *præcipitatoriâ* vi pollere diximus, particulis & inter se quodammodo homogeneis, & figuris simplicioribus, ac interea angulis acutioribus, & magis pulgigitivis, consilari censeo. Hæc cum massæ alicui admiscetur, quicquid in eâ, quod motibus obstat, offendant, statim, quâ pollent activitate, aggrediuntur, atque, si laxius finitet, facile exturbant, sin tenacius hæreat, majorem quidem præ-

resistentiâ orgasmum concitant, qui tamen extrusâ isthâc materiâ brevi sedatur: etenim, quoniam congeneres inter se sunt fermenti particulæ, nullam, vel exiguam, heterogeneâ illâ, quæ eas in motum agebat, profligata materia, luctam subire aptæ sunt, sed relicta occupantes spatia, placide in iis se componunt.

Ex istis priorum ad secretionem concitandam ministerio naturam uti, exinde arguere licet, quod vix ex tam difformi materiâ confatis, quibus refectitur corpus, succis talia uspiam parari possunt fermenta, quæ tantam homogeneitatem sapiant, quanta ad vere præcipitatoria requiritur. Quamvis enim, quæ in ipso secretionis actu adhiberi supponimus, succedentem materiam ex reliquâ massâ quodammodo præcipitare auguramur, istiusmodi tamen præcipitationem satis apte fermentis expansivis competere posse, ex hypothesi circa hanc rem inferius profetendâ, arbitror, constabit. Sed jam tempus est, ut quid ad secretionem conferant fermenta, & unde deriventur, expendamus.

C A P. X.

Fermenta ad Secretionem præcedanea quæ.

AD Secretionem autem duo fermentorum genera requiri videntur, alia quæ ei præcedanea sunt, atque massæ, ex quâ aliquid secernendum est, antequam ad secretoria organa pervenerit, affundenda; alia quæ in ipso secretionis actu lugeruntur.

Quæ prioris generis sunt, ex æquo simplicibus ac mixtis secretionibus ex usu sunt, & eo fine addenda ut sufficientem massæ laxitatem inducant, quo in partes promptius secedat, atque alterius (ubi requiritur) actioni libentius obsecundet. Vix enim ad hanc rem nudam intestinam sufficere posse fermentationem supponere possumus, si perpendamus quam cita, quamque copiosa, tum scerementorum, tum utilium substantiarum, ubivis fere in corpore, instituitur secessio. Neminem latet, esculenta, quæ quotidie ingerimus, paucarum horarum in ventriculo morâ tantam acquirere laxitatem, ut de facili in perangusta ductuum chyliiferorum, in intestina confestim inferiorum, orificia magnam sui partem lacteâ specie colari permittant. Huic liquori in sanguinem transfuso, non longo tempore aptitudo imprimitur ad multas sui partes per alia,

alia, eaque & angustiora, & variae invicem figurae, eribra dimittendas; unde alias in nervos transmitti, alias (& magno quidem numero) renum glandulas, alias maxillares, hepatis, pancreatis, &c. cis non multas horas, tranare compertum est; quod nudâ digestionis absque fermentorum additamento tam brevi tempore obtineri posse vix est, opinor, qui asseruerit: secus enim cur non eadem substantiae extra corpus, pari digestionis & caloris gradu adhibito, parem laxitatem (aliasque insuper, quibus hæ gaudent qualitates) eodem temporis spatio acquirunt? Unde patet non exiguum fermentorum, ad laxitatem hanc inducendam, esse necessitatem.

Objici quidem hic forsân poterit (præsertim quod ad ea attingit; quæ sanguini immediatè in hunc usum inservire censemus, eique nullis factis ambagibus remiscenda esse testatur partium vasorumque structura) quoniam ex ipso sanguine ortum suum trahunt, naturam operam ludere videri, dum eo sine substantias has secernit ut remisceantur; unde æquè feliciter solâ digestionis laxitatem hanc sanguini induci posse, ac affuso, quod ex ipsius penu delibatur, fermento forsân concipiatur. Cui repono, secretas hæc substantias ipso secretionis actu altiores, quam quâ pollebant; dum in gremio massæ, ex quâ emerferant, latebant, energiam induere: etenim præter comminutionem, quam vasorum angustias tranando subeunt, hoc insuper accedit, quod plures, in unam congeriem eximie subtilitatis coeuntes particulae, majores necesse habent possidere vires, quam cum singulae, & ab invicem determinatae, & crassioribus obvolutæ fuerant: porro, & inquilinis portionis illius sanguinis cui affunduntur, subtilium particularum copiis junctæ, hoc nomine majorem in illo comminutionem & laxitatem efficiunt. Quin satis obvium est substantias Chymicâ digestionis productas, & majores, & alias possidere facultates, quam ex quibus proficiuntur concreta; atque notum est cohobiorum medio magis exaltari, saltem alias nancisci dotes, quam si simplici digestionis res transigeretur.

Hujusmodi fermenta non pauca in corpore reperire est. Sic salivæ humor, & si quis alius per nondum detecta vaia in ventriculum effundatur, assumptum cibum comminuit, adque secretionem intestinalem disponit. Huic massæ in intestina dilapsæ, & in lacteas traducendæ, suggeritur aliud ex biliaribus pancreaticoque ductibus fermentum. Chylo deinceps, in venas ex propriis vasis elutriando, in itinere suo primum nervosum liquorem in glandulis mesentericis affundi verisimile est, deinde in receptaculo lymphæ additur, ut sic in san-

sanguinem promptius facessat, adque subsequentes secretionēs aptior sit. Sanguini hepar appulsuto ex liene suggeri videtur fermentum, ut sic facilius destinatam sarcinam in hepate deponat. Breviter, singularum reductivatum secretionum materiæ totidem fermenta mihi videntur, quibus comminuantur, atque ad altiorē laxitatis & subrilatitatis gradum evēhantur succi, hoc proventu aucti. Et sanè videtur mihi cuncta, ubicunque in corpore reperiuntur, fermenta *glandularum* esse productiones (exceptâ forsan chyli portiunculâ ventriculi parietibus præ sua viscositate adhærente, inque fermentativam indolem mora hac exaltatâ) quarum cum hoc munus sit, ut peculiari sanguinis particulas, easque reliqua allucens sanguinis massa magis suo genere activas, segregent: quid verat quominus istæ substantiæ hoc munere fungantur, & quidem solæ, quandoquidem nusquam alibi in corpore aliæ tantæ activitatis præparantur.

Verum præter indigena hæc Fermenta, adventitia alia non rarè forinsecus suppeditantur, quorum in censu numeranda sunt, sive medicamenta cathartica, diuretica, diaphoretica, &c. sive aliæ cujuscunque denominationis substantiæ, quæ cum in corpus admissa à succis quibus admiscuntur subigi & domari nequeunt, ut sic in æquabilem cum iis massam coëant, orgasmum inter eos aliqualem concitant, & præ difformitate, quam ad has vel illas eorum particulas habent, occurribus à cæteris sociis suis laxant, adque recessionem disponunt.

C A P. XI.

Fermentum Secretiones Mixtas immediatè concitans quodnam sit.

Fermentum autem quod ad ipsum Secretionis actum immediatè requiri supposuimus, missis ambagibus *Succum* ipsum *Nervosum* esse cenſeo, sine cujus directione vix, ac ne vix quidem, satis pro Naturæ indigentia atque intentione tam diversæ, quam cernimus, indolis substantiarum, constanti adeo tenore hic illic prorumpentium, seclusionem obtrineti posse arbitramur.

Paradoxam, nullus dubito, plurimi hanc criminabuntur sententiam, utpote à nemine, quod sciam, hætenus traditam.

D

Quam-

Quamvis enim Celeb. *Willisus* succum hunc in Fermentorum numerum jamdudum retulit, atque in *nutritionis* opere, sicut præcipuum usum, sic fermentativam vim illi assignavit, nil tamen in *secretione* peragendâ muneris, quantum mihi contigit observasse, ei detulit. Conjiiciens doctiss. hic Vir sanguinem, utcumque nutritionis materiam suppeditantem, crassiorum tamen & hebetiorem esse, utpote spiritu animali destitutum, quam ut idoneas, quâ augendis, quâ absumptis partibus reparandis, particulas sufficiat, perquam ingeniosè, succum nervosum, masculini seminis instar, nutritio humori copiosè ab arteriis suggesto in singulis partibus affundi supponit; quo velut fermento imbutus iste, atque mutua subitione dissolutus, dum in partes recedit, idoneum quibus appellit partibus pabulum suppetat.

Qui quidem effectus (si nutritio, vii perquam probabile videtur, saltem quoad longè maximum partium nutriendarum numerum, ad modum à Cl. viro assignatum, peragatur) licet non obscurum testimonium perhibeat fermenti naturam huic assignandam esse, ut tamen facilius ad hypothesein nostram, de modo quo succum hunc in operè secretorio agere supponimus, sternatur via, liceat paululum ulterius, an illi hujusmodi competat indoles, expendere.

Ex quidem tum ex *visceribus* & elaborationis ratione, tum ab effectibus, satis clara desumi possunt indicia, quæ cum non modò in fermentorum, sed & maximè expansivorum, censu locandum esse suadeant. Quoad prius, neminem latet ex sanguine, liquore admodum elaborato, parari; cujus subtilissimæ particule, dum per angustos glandularum cerebralium meatus colantur, crassiorum, quibus irritatæ prius hæserunt, contubernio hæc arte liberantur, dumque insuper sui juris sic factæ intra nervorum tubulos commorantur, ab iisque coërcentur & ab evolatione detinentur, nequeunt non intestinâ agitatione sese invicem ulterius comminuere, adeoque majorem ad morum propensionem adipisci; quam agitationem porro promovet & continuata usque recentium à tergo admissio, & calor, quo singulæ partes corporis gaudent, foras. Præterea cum sanguis, prout supra notavimus, valde heterogeneis particulis refertus sit, cumque vix ulla tam exquisita in corpore supponi potest colatura, ut pure homogeneæ & subtilissimæ ex liquore tantopere elaborato & subactò, omni crassiorum consortio liberæ, in ulla vasa recondantur; colligere licet succum nervosum, non modo subtilitatis, sed & particularum diffinitivitatis, ratione, in fermentorum familiam cooptari debere.

At ex effectis insuper, quos in musculorum motibus concitandis profert, satis hoc evinci potest, siue eundem in statu sano, siue morboſo, conſtitutum contemblemur. Si enim quantam vim brachium ex non multis, nec conſpicuâ mole, muſculis conſtat, quâ percutiendo, quâ elevandis impellendiſve magni ponderis molisque corporibus, exerit perpendamus; ſi celerriſſimas, ac ordinatas, atque dictatis animæ ad amuſſim obſequentes, quas in periti Cithariſtæ digiris obſervare eſt, reciprocationes; ſi porro ſtupendas contractiones, motuumque, inordinatorum licet, nunc in hac, nunc illâ parte, quos in convuſis & epilepticis, vitiato ſucco nervoſo, cernere eſt, vigorem penſitaverimus; non niſi ſumme agilem, & proinde fermentativum, hunc eſſe ſuccum concludere poſſumus. Quamvis enim muſculis mechanica neceſſariò adeſſe debet ad motum eorum exhibendum ſtructura, atque ſanguinem caleſcens quoque ſuum addere concedendum ſit, præcipuam tamen euergiam à nervis influere nemo, opinor, negaverit, ſibiſcil. ab horum actuatis ſucco: atque notum eſt quod ſi nervi vel obturentur, vel præcidantur, ſtatim conceidit omnis in partibus illorum commercio fraudatis motus.

Si verò, adhæc, iſtorum effectuum magnitudinem cum perexiguâ, quâ ſuppeditatur, ſucci iſtius quantitate conferamus, res extra omnem controverſiæ aleam protinus conſiſtet. Notum enim eſt, & in perexilibus vaſis deportari, & lentiffimo per eorum canales motu ſerpere. Etenim in præſecto aliquo nervo, quamvis porulis donari certum eſt, nulla tamen, quemadmodum in vaſis ſanguifetis conſpieua ſeſe oculis ſiſtit cavitas; unde à multis ſæculo ſeculis (imò etiamnum apud multos eadem obtiner ſententia) imaginariis, neſcio quibus, ſpiritibus deporrandis ſolummodo inſervire creditum fuit. Porro nec adhibitâ ligaturâ hinc vel inde tumere deprehenduntur, nec vel compreſſi, niſi parum admodum liquoris effundunt. Motum verò, quo proſum ſuccus iſte pellitur, quod artinet, certum eſt nullam in propinquo partem eſſe, quæ motum illi, niſi perquam lenem, imprimat: cerebrum enim & præ tenerriſſimâ compage, & fabricæ, à muſculari multum diſtantis, ratione ineptum proſus eſt, ad effaſu dignam ſucci ſui quantitatem propellendam; ſed totum hoc munus ſanguini traſſicienti deberi videtur, qui cum continuo quodam ex gurgite ſuo in cerebralium glandularum porulos, parcè licet, dimittit particulas, harum miniſterio prius depoſitas ſolummodo protrahit: cumque hic motus admodum lentus ſit, conſtat perexiguam iſtius ſucci proportionem in tam anguſtâ ravi-

tate donatis vasculis deferri posse, qui proinde maximam energiam possidere debet.

Sicut vetò fermentativa huic succo competit indoles, sic, quandoquidem natales suos sanguini debet, primum est concipere aptitudinem retinere ut in eundem agat; eoque potius, quoniam, præ maxima sanguinis heterogeneitate, nequit non inter discordes illius particulas plurimum resistentiæ ostendere, adeoque in motum facilius concitari.

Succo hoc in fermentorum numerum sic celato, oportet ut, quandoquidem secretiones, quas memoravimus, fermentorum adminiculo peragi supponimus, ostendamus ipsum hunc fermenti munere fungi posse.

1. *Arg.* Idcirco primò, quandoquidem natura singulas partes iusto ad designata munia dimenso fabricat, nec quæ ejusdem generis sunt, imperitorum artificum mote, hic ampliores, illic contractiores, eadem utrobique usus necessitate urgente, construit; utque in necessariis nunquam deficit, sic nec luxuriare solet; concludere licet, ubi vasa occurrunt quæ majorem ad partes, in quas inseruntur, proportionem gerunt, quam ejusdem generis alia in aliis partibus obtinent, istorum usus vel plures vel magis conspicuos, hic reputandos esse partesque in quas inseruntur majori, quem deportant, liquoris copiâ indigere, quam aliis, quæ minora inserta habent, ex usu est. Hinc quoniam obvium est, quasdam partes majoribus nervis, quam qui aliis inseruntur, donari; sequitur liquorem quem deferunt, utpote majori copiâ distributum, vel in plures usus, vel magis notabiles, quam ubi minori provenit, inservire.

Usus quidem binos *nervoso contento* adscripserunt veteres, nempe ut tum *motui*, tum *sensationi* ancilleretur; quibus tertium *Celeb.* quidam ex recentioribus assignarunt, ut scil. *nutritioni* (postquam in *liquorum* familiam cooparant) insuper inserviat; licet alii aliter hanc rem explicant: adeo ut supposito, nullos alios usus succo nervoso competere, ubicunque largiori dimenso suppeditari comperimus, talem esse, partis indolem necesse sit, ut vel ad motum magis aptetur, vel exquisitiori sensu donetur vel saltem majori hujus quantitate ad nutritionem indigeat, quam ubi pariori manu dispensatur. Jam verò glandulæ in quibus tum excretivæ, tum reductivæ secretiones (saltem in quibus major secernitur humoris copia) peraguntur, largioribus, computo ad ipsatum molem facto, nervis donantur (id quod ex *Cl. Whartono* satis obvium est colligere) quam qui aliis ferme ullis partibus competunt: imò constat in quibusdam nervorum numerum illum vasorum sanguiferorum superare.

rare. At cui; quæso, ex memoratis usibus tantam succi, quem istis partibus inserti nervi deferunt, quantitatem datam supponere possumus?

1. Etenim, si ad *motum* dari supposuerimus, videntur ad hunc structuræ ratione prorsus ineptæ huiusmodi partes, quandoquidem in confesso est, peculiarem fabricam, qualis est musculorum, ad hoc munus requiri; & nemo non, opinor, concedet, nullam in corpore partem, quæ vel non est musculus, vel saltem fibris musculorum ritu dispositis quodammodo non fabricatur, ad motum, qui alicujus momenti sit, præstandum natum esse. Haud sanè inficias ivero aliquo glandulas motu gaudere, quo nempe sese quodammodo constringendo sanguinis forsan rranantis velocitatem accelerent: sed ad hunc tam lenem (quem & potissimum vestienti membranæ debere videntur) excitandum tantos nervos dari nemo facile crediderit; præsertim si attenderit, ipsis musculis, motus organis adæquatis, minores in proportionem nervos adesse, quam qui glandulis conceduntur, licet interea præ diuturna & violenta, qua non raro concitantur, actione satis largas succi hujus expensas subire necesse habeant. Et quamvis objiciat forte aliquis, fibras, ex quibus confatur musculus, totidem esse vasa succum huic suggerentia, quæ idcirco glandularum nervos multum superare videntur; huic tamen reponere licet, quod quoniam singulæ fibræ ab inserto solummodo nervo liquorem suum accipiunt (nec enim mihi constat quomodo iis aliunde suppeditetur) iste autem, cum intra nervos ipsos lentè admodum commoveri solet, lentius tamen serpere necesse habeat, ubi numerosos hosce & capaciores ingressus fuerit canales, sequitur quod, si tantilli nervi ad motum, in musculo tot fibris stipato concitandum satis sint, vix probabile videtur majores ad hoc munus requiri, ubi nulla, structuræ ratione, ad hanc rem aptitudo reperitur.

2. Quod ad *sensum* attrinet (tactus volo; lubens enim concessero reliquorum sensuum organa satis amplis ad id muneris gaudere nervis, licet ex iis quædam forsan minoribus quam qui aliquibus glandulis conceduntur) tamen haud negandum sit glandulas hoc pollere, quoniam tamen naturæ solemne est partes ad destinatos usus commensuratas facere; vix quicquam, qui eum ratione philosophari volet, sibi persuadere poterit, tantos nervos tantillis partibus, quales pleræque sunt glandulæ, ad hunc usum dari, cum aliis, exquisitiori sensu donatis, multo minores sufficiunt. Membranæ (quas adæquata esse sensationis organa plerique consentiunt medici, nec quicquam aliud sunt, nisi nervorum expansiones,

tate donatis vasculis deferri posse, qui proinde maximam energiam possidere debet.

Sicut verò fermentativa huic succo competit indoles, sic, quandoquidem natales suos sanguini debet, primum est concipere aptitudinem retinere ut in eundem agat; eoque potius, quoniam, præ maxima sanguinis heterogeneitate, nequit non inter discordes illius particulas plurimum resistentiæ offendere, adeoque in motum facilius concitati.

Succo hoc in fermentorum numerum sic celato, oportet ut, quandoquidem secretiones, quas memoravimus, fermentorum adminiculo peragi supponimus, ostendamus ipsum hunc fermenti munere fungi posse.

1. *Arg.* Idcirco primò, quandoquidem natura singulas partes iusto ad designata munia dimenso fabricat, nec quæ ejusdem generis sunt, imperitorum artificum more, hic ampliores, illic contractiores, eadem utrobique usus necessitate urgente, construit, utque in necessariis nunquam deficit, sic nec luxuriare solet, concludere licet, ubi vasa occurrunt quæ majorem ad partes, in quas inferuntur, proportionem gerunt, quam ejusdem generis alia in aliis partibus obtinent, istorum usus vel plures vel magis conspicuos, hic reputandos esse partesque in quas inferuntur majori, quem deportant, liquoris copiâ indigere, quam aliis, quæ minora inserta habent, ex usu est. Hinc quoniam obvium est, quasdam partes majoribus nervis, quam qui aliis inferuntur, donari; sequitur liquorem quem deferunt, utpote majori copiâ distributum, vel in plures usus, vel magis notabiles, quam ubi minori provenit, inservire.

Usus quidem binos *nervoso contento* adscripserunt veteres, nempe ut tum *motui*, tum *sensationi* ancilleretur; quibus tertium *Celeb.* quidam ex recentioribus assignarunt, ut scil. *nutritioni* (postquam in *liquorum* familiam cooptarant) insuper inserviat; licet alii aliter hanc rem explicant: adeo ut supposito, nullos alios usus succo nervoso competere, ubicunque largiori dimenso suppeditari comperimus, talem esse, partis indolem necesse sit, ut vel ad motum magis aptetur, vel exquisitiori sensu donetur vel saltem majori hujus quantitate ad nutritionem indigeat, quam ubi parcioti manu dispensatur. Jam verò glandulæ in quibus tum excretivæ, tum reductivæ secretiones (saltem in quibus major secernitur humoris copia) peraguntur, largioribus, computo ad ipsarum molem factò, nervis donantur (id quod ex *Cl. Whartono* satis obvium est colligere) quam qui aliis ferme ullis partibus comperunt: imò constat in quibusdam nervorum numerum illum vasorum sanguiferorum superare.

rare. At cui, quæso, ex memoratis usibus tantam succi, quem istis partibus inserti nervi deferunt, quantitatem datam supponere possumus?

1. Etenim, si ad *motum* dari supposuerimus, videntur ad hunc structuræ ratione prorsus ineptæ hujusmodi partes, quandoquidem in confesso est, peculiarem fabricam, qualis est musculorum, ad hoc munus requiri; & nemo non, opinor, concedet, nullam in corpore partem, quæ vel non est musculus, vel saltem fibris musculorum ritu dispositis quodammodo non fabricatur, ad motum, qui alicujus momenti sit, præstandum natum esse. Haud sanè inficias ivero aliquo glandulas motu gaudere, quo nempe sese quodammodo constringendo sanguinis forsan tranantis velocitatem accelerent: sed ad hunc tam lenem (quem & potissimum vestienti membranæ debere videntur) excitandum tantos nervos dari nemo facile crediderit; præsertim si attendentur, ipsis musculis, motus organis adæquatis, minores in proportionem nervos adesse, quam qui glandulis conceduntur, licet interea præ diuturna & violenta, qua non raro concitantur, actione satis largas succi hujus expensas subire necesse habeant. Er quamvis objiciat forte aliquis, fibras, ex quibus constat musculus, totidem esse vasa succum huic suggerentia, quæ idcirco glandularum nervos multum superare videntur; huic tamen reponere licet, quod quoniam singulæ fibræ ab inserto solummodo nervo liquorem suum accipiunt (nec enim mihi constat quomodo iis aliunde suppeditetur) iste autem, cum intra nervos ipsos lentè admodum commoveri solet, lentius tamen serpere necesse habeat, ubi duerosos hosce & capaciores ingressus fuerit canales, sequitur quod, si tantilli nervi ad motum in musculo tot fibris stipato concitandum satis sint, vix probabile videretur majores ad hoc munus requiri, ubi nulla, structuræ ratione, ad hanc rem aptitudo reperitur.

2. Quod ad *sensum* attinet (tractus volo; lubens enim concessero reliquorum sensuum organa satis amplis ad id muneris gaudere nervis, licet ex iis quædam forsan minoribus quam qui aliquibus glandulis conceduntur) tamen si haud negandum sit glandulas hoc pollere, quoniam tamen naturæ solemne est partes ad destinatos usus commensuratas facere, vix quisquam, qui cum ratione philosophari volet, sibi persuadere poterit, tantos nervos tantillis partibus, quales pleræque sunt glandulæ, ad hunc usum dari, cum aliis, exquisitiori sensu donatis, multo minores sufficiunt. Membranæ (quas adæquata esse sensationis organa plerique consentiunt medici, nec quicquam aliud sunt, nisi nervorum expansiones,

saltem ab his sensum suum mutuatur) quamvis latè in alias partes protensa, imò unicè fermè aliquas constituent, haud tamen originem suam à nervis usque ad eò amplis, atque in plurimas inferantur glandulas, deducunt? at contra glandulæ, quantumvis grandi uervorum satellitio stipatæ, satis obtuso sensu donantur, prout in earum inflammationibus cernere est, quæ raro tantam inferunt molestiam, quanta in aliis plerisque partibus, pari modo affectis obvenit; nec struma, scrophulæve vernacula iis mala, impendio magnum dolorem creant. Et sane minores omnino ad sensationem, quam ad motum, sufficiunt nervi, quoniam major ad hunc quam ad illam requiritur actio, atque copiosior succi nervosi profusio & impensa ad grandiores illas musculorum machinas actundas necessaria est.

At verò tertio, de *nutritione* res paulò magis intricata videtur. Si enim ad mentem Celeber, *Glissonii*, *Whartoni*, aliorumque partes, quas *spermatikas* appellant, (quales sunt *Glissonio* fibrosæ, membranosæ & nervosæ, cerebrum, medulla spinalis, humores oculorum, ossa, dentes, cunctaque glandulæ) non sanguine, sed humore nervoso nutriantur, congruum est amplioribus illas nervis donandas iri. Verum (tantorum virorum præfata venia) quemcunque tandem usum succus hic nutritionis operi (in partibus saltem ab ejus fonte remotioribus) præbeat, videtur mihi nullis hoc ei munus unicè deferendum, sed ex sanguine (maximam saltem partem) delibari posse, quod in quarumcumque ex iis, utut inter se discrepantium, alimoniam cedat: præterquam enim quod sanguis in suo penu plurimas diversi generis particulas contineat, atque inter illas non paucas (prout *Cl. Willisus* satis evicit) aptas vias quæ partibus in alibilem succum facessant, vero consentaneum insuper videtur ex eodem purpurascens liquore candicantes satis facili negotio elaborari posse. Cum enim omnis *χρῆμα ποικίλον* à certâ particularum corporis figuratione vel positione pendeat, unde radii lucis determinato modo reflexi, prout sensorium hoc vel illo modo afficiunt, varias colorum *φάσεις* producant; quid vetat quominus sanguineæ particulæ, si figurarum, adque invicem respectus, à quibus rubedo pendebat mutationem patiantur (quod commixtione; quam sanguis cum inter circulandum, tum intestina fermentatione subit, haud difficulter obtineri potest) colorem simul muteat, adque albidiores quæ constituendas, quæ nutriendas, facessant? At verò hoc palmarium videtur ad evincendum, nutrimentum, etiam spermaticarum partium, ex sanguinea massa immediate suggeri, quod cerebrum, utcumque inter has numeratum, & quod minus

nus quàm pleraque ex iis, ex colore aliisve, quibus partes spermaticæ à sanguineis discriminari solent, iudiciis, sanguini originem referte videtur, unicum tamen inde nutricatum desumir, non secus ac eidem natales debet: quomodo enim à nervoso succo nutriri potest quod prius existere, omniique suâ suppellectile instrui debet, quam iste parari queat, & cujus id munus est, ut succum hunc in reliquarum partium usum seu elaboraret seu separaret, & dispenser, totum autem quod admittit, è sanguinis lacunâ accipiat? (Nisi comminisci quis voluerit, quod sicut coronariæ arteriæ caloris & vitalitatis fomitem, ex proprio penu depromptum, tanquam ex postliminio, cordi reddunt, ut hinc reliquo corpori prospiciat, sic consimilis, reduncum aliquorum nervulorum ope, ad singulas cerebri glandulas succi hujus proveniunt, lepidò commento, reducat.) Si verò cerebrum, tantæ nobilitatis, tamque exquisitæ structuræ, pars, utpote in quâ regia animæ stat sedes, purissimusque in toto corpore præparatur humor, ex solo sanguine dirigentis & subigentis fermenti ministerio & compaginari & refarciri queat, cur aliis inferioris ordinis partibus tam elaboratum paululum tantopere necessarium concipiendum est, nec sufficere potest, ut ex sanguineâ massâ (materia saltem ejus) immediate suppeditetur? Nec enim nervosi succi usum iis prorsus denegamus, quemadmodum inferius dicimus: sed quoniam hunc fermenti tantum vices (ex mente Cl. Willisi peragere conjicimus, nulla mihi videtur subesse ratio, cur apporantes nervi tantum in variis partibus glandulis scil. præ reliquis) discrimen quoddam molem fortiantur, si nutritionis peragendæ gratia solum advehant. Et sanè quantumvis detur, succum nervosum copiosius ad spermaticas partes, nutritionis ergo (ex citatorum Cl. vitorum sententia) suggeri debere; cur tamen glandulis, quam cæteris hujus prolapæ partibus majores donantur nervi, cum omnes pariter nutritione indigeant, eandemque augmenti proportionem observent? Porto cum istæ partes texturæ ratione non multum dissimiles sint, & proinde minorem pabuli proventum exposcant; quorsum tantæ molis iis inseruntur nervi, cum minores multo in hunc usum sufficere possint?

Celeb. Steno alium nervis in glandulas stomachicas insertis usum assignat (qui si hic concedatur, in aliis pari munere fungentibus locum habere debet) nempe ut *venas constringant, quo sanguis aliquatenus in motus suo rapidiori impeditus, vasorum secretoriorum orificiis sistatur, ut hæc morâ salivaris materia promptius in ea coletur*: (Qualem & nervis, per pulmones decurrentibus, aliasque in partes insertis, usum, pro sanguine juxta

pathematum imperus moderando, assignat Cl. *Willisus*.) Agnosco sanè ingeniosissimum inventum, & usum huic iis ex parte competere omnino concedo: At, pace doctiss. Viri, censuerim multo exiliores nervos huic, non minus quam motui, sensationi, & nutritioni satisfacere posse; eoque magis, quoniam vasorum sanguiferorum ad plerasque glandulas attinentium tanta est exiliras, ut nervorum proportionem haud æquate videantur. Et quidem observari poterit partes, in quibus peristaltica contractio admodum conspicua est, non impendio magnos præ alijs sortiri nervos, verùm propriarum fibrarum, quas per exiles nervos deportatas actuare potest succus, ministerio opus hoc absolvere; id quod in intestinis, patet, quibus sicut multò fortior est quam venis ullis contractio, sic nullus Anatomicus propalavit, glandiores iis adesse nervos, quam qui in glandulas mixtis secretionibus dicatas inseruntur. Porro nervi ipsa glandularum penetralia subite videntur; cum potius ad hoc muneris earum exteriora perreptare deberent, ut sic venas in egressu circumambientes constringerent. At insuper quandoquidem doctiss. Vir hunc iis usum hic loci ideo potissimum assignat, ut *pro animæ imperio vel motu* majori copiâ subinde profundatur saliva; quorsum pares in proportionem his nervi in alias glandulas inseruntur (nec enim observatum est exiliores esse, qui in cæteris plerisque saltem, terminantur) quæ constanter succum suum, & æquali circiter, cæteris partibus, mensurâ separant, nec ab animæ nutu, quantum liquet, secretorii sui muneris variationem patiuntur.

Hiscæ usibus ad totum, quem tam ampli ad glandulas apportant nervi, succum exhaustiendum haud adæquatis, quis alius restat, nisi ut, qui superest, ad *secretionis* opus impendatur? Ad quam porro sententiam amplius stabiliendam, attendi poterit.

2. *Argum.* Secundò, Vix aliunde (supposito quod fermentum ad secretionem, quas diximus, necessarium sit) deduci posse fermentum huiusmodi, quam ab hoc succo.

Ad hanc rem, duplex solummodo excogitari potest ratio, quomodo glandulis suppetat fermentum. Vel enim in ipsa glandulæ substantiâ propriâ digestionem generari debet, vel aliunde per vasa aliqua ei inserta constanter suppeditari. Quoad primum, non prius improbabile videtur ipsum partis alicujus succum, modo motam aliquam illic trahat, in fermenti genium exaltatum iri; referatis scilicet hanc intercapedine magis activis, ex quibus constat, particulis, inque alias de novo appellentes agendi vim hinc nactis, non secus ac subactæ farinæ massam ali-

aliquandiu asservatam in fermentum redigi, vulgari experimento, cernimus: atque hoc pacto Chyli, in ventriculi fundo & plicis detenti, portionem in fermentum facessere, adque ciborum postmodum ingerendorum coctionem operam conferre, qui hinc deducunt fermenti stomachalis rationem, supponunt. Verum enimverò tale aliquid in glandulis locum habere posse haud facile constat: non enim liquet ulla is, nisi ipsorum vasorum, præsto esse cavitates, in quas talis aliquis, sanguini trajicienti pro re natâ suggerendus, recondi possit succus; atque probabile est ex vasis variè complicatis unicè constari istas partes: imo videtur, quod citatior, tam hic loci quam alibi sit sanguinis motus, quam ut adeo longam succo cuius appellenti moram permittat, ut hanc exaltationem subeat, quin facillimè, secum in venas statim devolvendum, non potest non absorbere: cum interea, in propositâ de ventriculi fermento instantiâ, haud possibile videtur, ut totus unâ vice excludatur chylus, quoniam & laxior illi tonus est, quam ut omnimodam contractionem subire possit, & tam profundè in sinistro hypochondrio propendet ipsius succus, ut difficillimè ad pylorum ascendere queat ponderosior chyli pars in illo latens, idcirco satis longam illic ad exaltationem moram facile trahere potest. Quinimo secretionis methodus (mox tradenda) non indigendum, sed quod forinsecus cum impetu injiciatur, requirere videtur fermentum.

Quoad alterum, Vasa, quæ in glandulas fermentum istud deducere possunt, vel arteriæ sunt, vel nervi: certum enim est & venas, & lymphaticas, ab iis, quod ab istis affertur revahere. Per arterias quod adducitur nil aliud esse, quam ipsum sanguinem (quo nomine totam massam utcumque chylo & lymphâ scatentem intelligo) cuius in præparato est; atque ipsi sanguini, quâ tali, fermenti quod volumus titulum non competere nemo non concedat, cum secretionum materiam supeditet: nos vero supponimus fermentum, ad hoc opus, aliud requiri à massa ex cuius gremio aliquid immediatè separandum est, quanquam negandum non sit ex eadem elaboratum antea fuisse; quam tamen elaborationem ejus, & separationem, ut fermentum evadat, ante peragendam esse, quam ad partem in qua fermentativum hoc munus exequi debet, ex dictis, opinor, constituit. Restat ergo quod, quoniam nullum aliud superest vas quod ad glandulas quicquam, quod fermenti vices præstet, afferat, nervi hoc suggerant.

3. *Argum.* Porro tertio hoc isti succo in secretionem munus deberi, inde forsitan arguere licet, quod ex hujus dyscrasiâ quâvis,

quâvis, vel deficientia, pervertitur secretionis opus; adeo ut si quoad crasin debilitetur, aut nervi obturentur, secretiones vel omnino deficient in partibus quo tales pertingunt nervi, vel saltem parcius solito procedunt, si verò acrior evadat, atque hoc nomine magis fermentativus, immoderatus concitantur.

Prioris exemplum in paralyfi cernere licet, quo in affectu plures ex solitis secretionibus minutius succedere solent, speciatim alvina rarius solito procedit excretio; quod non tam intestinis, præ spirituum defectu, contractionis munere orbatis tribuendum duco, quam succorum ex hepate & pancreate excernendorum, unde stimulatione debita carent; defectui, quandoquidem in taliter affectis non supra modum distentum abdomen, saltem in principio morbi, comperire solemus, ut exinde conijciamus intestina excrementis oppleri. Quinimo satis infrequens est diaphoresis, quam etiam difficillime, exhibitis licet diaphoreticis, concitare datur, quem effectum à nervorum ad glandulosam cutim tendentium obduratione pendere, non admodum durum est agnitu. Agnosco sane huiusmodi ægrotantibus liberatiorem in quibusdam partibus aliquando procedere secretionem (quemadmodum quandoque observavi, tales magnam salivæ copiam profundere) cuius tamen rei hanc forsitan reddere licebit rationem, quod nempe in his non admodum debilitetur succi nervosi crasis, sed potius extraneâ, ex sanguine illi demandatâ, nervorumque tubulis improporcionatâ sufferciaturs materiâ; quo fieri potest ut, quibusdam ex iis obturatis, alii, quibus patula magis cavitas obtrigit (nec enim eadem diametro omnes forsitan constant) vel quibus obstruens crassamentum nondum appulisse contingit, quandoquidem hinc ab obstructione immunes perstant, copiosius succum suum in partes, quibus inseruntur, deponant; unde si partes istæ secretorio muneri destinentur, majori quam alias solent, copiâ è perluente sanguine huius appulsu derurbantur serosiores, vel alix quæ coli poris proportionem gerunt, particulæ; eoque magis, quoniam secretionibus alibi deficientibus sanguinea massa nimia secernendæ alias materiæ copiâ luxuriat.

Secretionis verò supra modum naturæ statutum auctæ instantiam habemus in Scorbuto, quem non in solo sanguine, sed & succo nervoso, acri nimis reddito, at in hoc *secundario* tantum, radices agere Cl. *Willisius* (qui perquam accuratè morbi huius genium investigavit) censet. In quo affectu inter alia, quæ huic rei testimonium perhibent, symptomata (qualia sunt fluxus alvi, vomitio, &c.) Doctissimus vir hoc pro solemn

lemni ingravescentis morbi signo adducit, quod *copiose & corro-*
rodentes sputationes eveniant; quæ cum non nisi succo nervoso
 tandem affecto, se prodant [vix enim ingravescere potest hic
 morbus quin succus iste, è sanguine ortus, & vectigalia inde
 perpetim delibans, una afficiatur] indicio mihi sunt ab eo de-
 pravato provenire, quamvis doctiss. viro consentio, materiam
 ex sanguine provenire; & quoniam [quod supra ostendere co-
 nati sumus] nequit ex suo penu tantam, quanta erumpit, hu-
 moris copiam suppeditare, sequitur vires suas in sanguinem
 exerere, ad materiam hanc ex ejus sinu deturbandam; ad
 quod præstandum non parvam energiam ab acrimoniâ fortit-
 ur. Tono partium secretoriarum fateor aliquid in hoc nego-
 tio dandum, quo laxato copiosior liquoris ex ampliatis me-
 tibus profusio sequi potest: ut nisi aliquid insuper accesserit:
 quod huic determinationem ad istos subeundos imprimat,
 vix, ut mihi videtur, concipi potest, quin in patentiores ve-
 narum canales longe maxima ejus, quod secerni comperi-
 mus, pars iter teneat: hoc autem à succo nervoso petendum
 reor.

Verum reclamantes audio hoc esse *immodice* nimium de-
 laçare, minusque philosophicè factum, succum hunc tot mu-
 niis onerare, tamque diversis addicere; saltem indignum li-
 quore usque adeo elaborato videri ad tam abjectos usus detru-
 di, primariumque animæ in excelsioribus suis Operationibus
 exequendis ministrum, latrinæ patiter quasi exhauriendæ
 ablegari.

Quibus repono, primò quod quandoquidem nulla corpora
 seorsim, quoad agendi vim, considerata sunt, sed prout à
 plurimis aliis, iisque varii generis, circumsepta; à quorum
 discrepantiâ, dum in ea impingunt, multifariam eorum
 actionem determinari, affectusque propterea variari, necellum
 sit [quemadmodum pulchrè monet *φιλοσοφάτωρ* D. Boyleus]
 nequaquam rationi absolum videtur tot, imò plures quam
 nos ei adscribimus, ab hoc succo productos iri effectus; cum
 pro corporis organizatione [satis ut eleganti, sic diversis in
 partibus multum variatâ] nequit non diversimodè dererminari
 ejus actio, nec proinde fieri potest, quin tam ad sanguinem
 ubi in hunc agere destinatur, quam ad partes solidas, pro
 varia eorum habitudine, vario modo se habeat. Nec magis
 sane hoc mirum videri debet, quam quod Sol [quamquam
 nativum ei muus solummodo videatur radios de se spargere,
 istorum tamen famulatu] hic plantas germinare, illic tubera
 succrescere facit, alicubi bitumen è terræ visceribus exudare
 cogit, alibi vapores attollit, aëremque nubibus infercit, ce-
 ram

ram liquefacit, lutum in saxeam duritiem excoquit, nunc concreta ei debito modo exposita blando calore fovet, nunc eadem, vitri [imo glaci] in idoneam formam redacti ope, in fumum & flammam convertit. Quæ omnia cum à nullâ facultatum ipsi Soli insitarum diversitate, sed à solâ radiorum, prout in variè disposita corpora impingunt, diffusionem prodeant; quidni pariter succus nervosus, dum in partes variè contextas depluit, quarum ad sensationem, aliæ ad transmittendos liquores, &c. fabricatæ sunt, varios in singulis effectus producat?

Quod verò secundo de officii vilitate objicitur, nullâ difficultate laborat, si perpendamus naturam non eosdem in partibus construendis, earumve usibus assignandis, honoris servare modos, quos iuavis gloriolæ umbras consecretantes sibi proponunt homines, verum, pro singularum ad hæc vel illa munia obeunda aptitudine, illis pensa sua assignare, maximoque in omnibus compendio studere, pluribus, iisque multum distantibus, usibus, quâ partibus solidis, quâ liquoribus, demandatis. Sic quamvis pulmones ad motum sanguinis tuendum potissimum fabricari verisimile sit, quid tamen vetat, quominus ejusdem gravatius non paucis recrementis eliminandis æstibusque [aëre sive amisso, sive solo contractu vasa, & his mediautibus, sanguinem, afficiente] temperandis ancilletur? Sic intestina chylosæ massæ convehendæ, atque purioribus ejus partibus in vascula adfusa segregandis inserviunt; interea tamen & transmittendo noxiæ cuicunque, ex ductibus hepatico pancreaticove extruulo, humori, si quando hoc accidat, ut per seidem amaudetur, ex usu sunt, pariter & succorum plurimi (si non omnes) sicut variis impenduntur negotiis, sic non raro satis sordidis. Hepaticum liquorem massam chylosam ad hæmatosin, & consequenter ut in ipsum nervosum facessat succum, parare vix quisquam negaverit; at insuper ad intestina quo hanc propellant; irritanda conducere conceditur. Saliva ad os & linguam, pro motu suo facilitando, humectanda inservit; nihilominus tamen nobile illud cibus in ventriculo conficiendis fermentum (ex parte saltem) subministrat. Sanguis ipse tam calore suo refocillandis, quam nutriendis cunctis quâ nobilioris prosapiæ, quâ magis abjectis partibus (si modo talis admittenda sit distinctio, inter eas saltem quæ ad vitam absolutè necessariæ sunt) natus est; dum tamen hoc præstat, in gremio suo excrementitias illas, quas, postquam excretæ fuerint, tantopere averfamur, & insperso naso contuemur, substantias gestat. Quidni igitur nervosus secretionis muneri vices suas præster succus, quandoquidem dum hoc peragit,

sanguinem aptiorem solummodo ad actiones, illi ab animâ demandatas, reddir, cui & non minus quam cæteri, seu liquores, seu partes, famulatur, & sine quo vix perfici posse secretionis opus mihi videtur? Et sane si ipsius animæ minns sit, à magno Conditore assignatum, cunctis, vel infimæ notæ operationibus præsidere, easque moderari, non video cur tam elatos ipsius ministros (cunctos tum liquores, tum partes solidas) suspicemur, ut, quod ipsa non dedignatur domina, hi respuant.

C A P. XII.

Hypothesis pro secretionum mixtarum ratione reddendâ proponitur.

Quoniam verò non satis videtur, succi hujus ministerio secretionis peragi nudè supponere, nisi quâ arte & methodo hoc fiat monstremus, proximum est, ut *Hypothesin* nostram hæc de re proponamus, unde & major dictis probabilitas (nec enim aliud præ se fert hoc, quicquid est, excepti) forsan conciliabitur.

Præquam verò hoc aggrediamur, assumere liceat, primò, quod sicut promptus sanguini ex arteriis in venas transitus, positionis ratione, datur, sic ex nervorum glandulis interiorum aperturis in eas vasorum secretiorum, pariter, facilis & directus pateat rames: secundò, quod vasorum istorum positio ea sit, ut ad sanguifera transversim se habeat, ita ut linea ab uno horum ad alterum ducta, decussatim (licet forsan non ubique ad angulos rectos) intersecet locum, quo arteriarum capillaria in venarum se exonerant.

Nulla his firmandis, lubens agnosco, à sensuum testimonio speranda suffragia; quoniam, tam hic quam alibi, minutula adeo, ubi in extrema dirimuntur capillaria, sunt vasa omnia, ut vel perspicacissimorum oculorum aciem effugiant. At verò quandoquidem suppositio hæc nullo modo in naturæ leges injuria videtur, sed talis vasorum positio particularum secessuratum, tam è sanguine, immissi succi nervosi ministerio, præcipationi, quam in vasa secretoria derivationi, non parum ex mechanices legibus favere videtur, veniam illi facile dandam iri confido.

His ergo suppositis, conjicio, quod dum sanguis glandulas, ubi hujusmodi secretio peragenda est, tranat, perpetim (sed

ma-

majori solito copiâ & impete, si irritatio quævis accesserit) ex adstantibus nervis in illius fluentum effunditur succus, qui absque morâ satis magno impetu objectum rivulum trajicere gessit, tum quod suo apte genio summe agilis existat, tum quod insuper à sanguinis calore, & quam impulsui debet, agitatione vegetiorem concipit motum. Dumque hoc facit, particulæ ejus nequeunt non in grandiores, ex quibus sanguis maximam partem constat, & quæ majoris superficiei sunt, in itinere suo impingere, quas, cum recto earum motui obstitunt, præ agilitate & motus pernicitate, ad vasis in quo feruntur oppositum latus recta, quantum possunt, lineâ propellunt, quandoquidem istæ, in motu jamjam positæ, determinationem ab aliis fortius motis, & in eas à latere impingentibus, facile patiuntur. Hæ autem sic protrusæ sanguinis particulæ, cum aperturam, quam dixi, in secretoria vasa ducentem offendunt, in eam si mole & figurâ eidem proportionatis donentur, nullo negotio divertunt, sin majusculæ sint, vel talis figuræ, quæ figuræ osculorum istorum non respondet, unde ab his admitti nequeant, hoc solum inde reportant, quod in torrentem suum parietis objectu retorquentur, & una cum eodem prorsum rapiuntur. Cum verò succi istius continua sit à sanguine novum indefinenter cerebro penum suppeditante, protrusio [maximè verò dum evigilamus, quoniam tunc temporis major nervis accedit tensio, præsertim verò post plenariam chyli distributionem] hinc novus, isque satis copiosus, ex sanguine glandulis, in quas nervi isti inseruntur, appellente effatim detruditur, istiusmodi particularum proventus, inque vasa secretoria corrivatur, quæ tandem impendio auctæ satis plenum sic fluentum constituant.

Hypothesos hujus vetisimilitudo inde colligi forsân potest, tum quod cunctis in confesso est, omne corpus in motu positum ab alio impingente, quod majorem motus vel gradum, vel vim, possidet, ubi cætera consentiunt, determinationem acquirere; tum quod omnis motus in lineâ, quantum licet, rectâ peragatur. Unde ex modo allato suppositio, quod vasa secretoria nervulorum osculis positione respondeant, & locum ubi sanguifera concurrunt intersecant, quid incongrui ab hoc, quem nervoso succo adscripsimus, usu requiritur? Etenim cum tam liquor hic, quam sanguis, in vasis suis continuo prorsum ferantur, necessariò, ubi ad occurstationis articulum pervenerint, in se invicem impingere debent; dumque sibi mutuo in motibus suis rectis hic moram faciunt, necesse est ut particulæ unius alteras loco pellant, quâ in lu-

Qu

ita fortioribus victoria deferetur. Cum verò succi nervosi particulae, præ summâ tenuitate, adque motum aptitudine, sanguinearum agilitatem superent, majores proinde vires obtinent ad id, quod in sanguinea massa motui suo resistit, deturbandum, quam sanguis ad has secum rapiendas, quod propterea, si vasorum secretiorum ora satis patentia sunt, in ea propellunt. Interea tamen haud fieri potest, quin ex spirituosius his plures se una in vasa secretoria influent, dum earum, quas e sanguine extruserunt, calci insistant: atque hinc sit, quod nullæ secretiones (ne excrementitiae quidem) dantur, quarum materia spirituosius hisce particulis non sit re-ferta (id quod ex earum debita analysi satis liquet, cujus medio non exiguus harum numerus separari solet,) quæ tamen non unice ab hoc fonte prodire videntur, cum copiosiores sint, quam ut hinc suppeditari possint, sed e sanguine ipso magnâ ex parte suggeri: dum enim crassiores, fermenti nervosi affusi vi, versus secretiorum ora propelluntur, atque hoc nomine majorem agitationis gradum nanciscuntur, ex minutionibus (quæ eas undique circumfluunt) quibus in tramite suo occurrunt, aliquas nequeunt non secum rapere; utpote quæ minorem, præ molis minutiæ, vim habent ad istarum celerius motarum, impulsui resistendum, quam hæ ad impellendum; unde à recto, quo prius ferebantur, moto deflectere coguntur, inque vasa secretoria viam capeßendi determinationem acquirere; quoniam verò horum porulis minutiores sunt, nullam vel sibi, vel crassioribus ingressuris, moram nectunt, sed placide subintrantes unum cum istis flumen exhibent. Interea tamen crassiusculas majori numero depelli contingit, eo quod hæ, majorem habentes superficiem affusi fermenti actionem magis recipiunt, atque hinc determinationem promptius acquirunt, tenuiores verò & subtiliores (nisi quas in transitu suo ad secretiorum ora à crassioribus intercipi diximus) cum & præ æquali ferme cum fermenti particulis exiguitate, unde ab iis prehendi nequeunt, donec, & recto, præ eo qui in vasa secretoria ducit, canali potiantur, & forti, à cordis impulsu, agitatione polleant, satis liberè ea præterlabantur.

Verum in hypothesin hanc nostram objici forsan poterit, succi hujus impulsu, qualem sanguis à corde sortitur destitui, motum in nervis lentum adeo esse (circa extremitates maxime, utpote quibus aucta in decursu amplitudo celeritatem trajicientis liq oris necessario minuit) ut vix supponere liceat, tam fortiter in sanguinem agere posse, ut inde quicquam, quo diximus modo, præcipitare valeat, quandoquidem

dem satis magnâ vi opus videtur, ad particularum sanguinearum agitationem eoque superandam, quo locum ullæ ex iis cedant.

Cui referimus, quod quamvis omnino concedimus, motum hunc satis lenem esse intra nervorum tractus, hoc tamen non impedire videtur, quominus, ubi emissus fuerit, satis magnam agitationem subeat. Dnm enim intra nervos stabulatur, usque adeo coarctantur ejus particulae, ut sese explicare nequeant, nec tantum calorem possident, qui eas multum exagitet: porro nec à substantiâ quavis heterogenea, ab ipsis constitutivis sui particulis diversa, sollicitantur. Postquam verò è suis conceptaculis extrusus, inque sanguineum torrentem traductus fuerit, quandoquidem hinc tum majus offendunt, in quo se explicant, spatium activæ, adque nixus expausivos maximopere proclives, ex quibus conflatur, particulae; tum sanguinis calore (quo pollet, quam succus hic, intensiori) & promiscua agitatione concitantur, satis primum est concipere non exiguam motus accelerationem, in ipso etiam effusionis articulo, indepturas: At insuper (quod maximam forte huic negotio operam conferat) ab occursatione ad particulas sanguinis heterogeneas, orgasmo hinc concitato, haud improbabile videtur, quod eam facile concipiant vim, ut has non contemnendâ impete insiliant, resistantiamque vincendo cedere cogant. Obvio enim satis experimento cernimus, varias substantias, quæ seorsim nulla agitationis (momentosæ saltem) indicia produunt, sæ magnam commistas præbere: sic verbi gratia, liquores acidi, salibus, vel volatilibus, vel fixis, vel oleis sulphureis affusi, non parvam ebullitionem, imò calorem [agitationis inter particulas plurimum auctæ indubitatum argumentum] concitant. Quanquam verò major solito in utrumque liquorem invicem commistos particularum agitatio, hoc pacto necessario invehetur, ille tamen cujus particulae subtiliores sunt, adque motum magis dispositæ, eam potius experietur, eoque efficacius, si calor auctus accesserit, quo facile fieri posse videtur ut, quam supponimus, præcipitatio efficiatur. Quæ sane & eo facilius promoveri potest, quoniam tam breve inter nervorum & vasorum secretoriorum interjacet spatium, ut non prorsus absurdum videatur vel minorem, quam succus iste ab hac miscellâ obtinet, vim sufficere posse ad effectum hunc producendum [quemadmodum ex pulveris pyrii, variorumque liquorum Chymicorum invicem commixtorum effectibus, mixturæ huic quodammodo analogis, colligere datur] nisi natura, quæ cunctas justo discernit partes construit, nervos [quamvis majoribus partes huic opeti

peri destinatas, quam quos aliis largita est, donavit) satis exiles, si inconspicuam eorum cavitatem contemplemur, fabricasset, atque sic cavisset ne, nimiam activi hujus succi quantitatem suggerendo, tantam effusus agitationem, dum sanguini commiscetur, subiret, quæ destinato effectui regulariter proterendo improporcionata esset.

Verum hic porro objicitur, succi hujus effusi motum non merè trajectory esse, ut in rectâ totus lineâ à nervi, à quo effunditur, extremitate ad secretorii vasis oppositum osculum tendat, verum undiquaque se diffundere. Cui respondeo, nil hoc obstarè quominus aliqua ejus pars rectâ prorsum feratur, quæ forsitan sufficere poterit ad determinationem, quam volumus, sanguineis particulis imprimendam: interea tamen reliquæ, quæ sese sic diffundere supponuntur, non possunt non objectas sanguinis particulas à se propellere, adque adversum latus determinate, secus enim nullum se explicandi locum haberent: quodato, nil aliud nostra postulat hypothesis.

C A P. XIII.

*Phænomena quorundam & dubiorum solutiones ex
allata hypothesis.*

Particulares secretiones singulatim, & minutius prosequi nostri non est instituti, qui generalem solummodo earum rationem reddere satagimus: quo ramen hypothesis allata ulterius statuminetur, *phænomena* pauculorum, quæ vel notatu magis digna occurrunt, vel assensum illi cohibere videantur, solutiones ad dictorum normam breviter attexere forsitan non abs re erit.

Et primò, constare videtur, cur ex secretoriis partibus quædam *amplioribus*, quam qui aliis obrigerunt, *nervis* donantur. Etenim ubi œconomix animalis ratio postulat, ut major exturbetur ex sanguine humoris quantitas, merito *fermentum*, quod hoc efficiat, majori copia supplendum, & proinde vasa hoc adducentia ampliora sinè oportet. Hoc in mammis luculento satis, ut mihi videtur, indicio observare licet, in quibuscum tanta copia lac proveniat, non mirum tam confertam nervorum sobolem iis contigisse.

E

Testi.

Testibus exiguis solummodo nervos adesse Cl. *Willisius*, contra priorum Anatomicorum effata, ex propria observatione pronuntiat; & proinde universam spermatis materiam ex sanguine immediatè derivari vult. Ex sane inde magnam (imo maximam) illius partem delibari rationi consonum videtur. Interea tamen (præfatà doctissimi Viri veniâ) ista nervorum exilitas non obstat videtur, quominus, quem deferunt, succus suas in exiricandâ hac ex sanguine materiâ vices præster. Probabile enim est, sperma hoc exiguâ solum quantitate generari, quandoquidem & exiguâ mole, & non nisi per satis longa intervalla excerni solet, proptereâ exiles sufficere posse nervos videtur, utpote ad secretoriorum vasorum proportionem, & secernendæ materiæ quantitatem, commensuratos. Cum enim materia admittenda valde subtilis est, oportet ut suscepturi poruli perquam angusti sint, ne simul crassior se insinuet, & proinde minori apellentis fermenti quantitate, quam ubi copiosior designatur secretio, opus est; eoque minori, quoniam secernenda materia suâ naturâ valde agilis est, minimoque impulsui faciliè cedens. Non equidem negavero, præter spermatis expensas in coitu fieri solitas, alias dari: nempe ex eo aliquid sanguini jugiter reafundi hoc nota virilitatis indicia, vox gravis, barbæ eruptio, robur corporis præ eo, quo gaudere solet muliebris sexus, &c. testatum faciunt; atque cernimus insuper eunuchos ejus defectu in femineam molliem degenerare; porro ab hujus privatione, dum extorsum erogatur, potissimum fieri arbitror, quod post coitum tanta virium prostratio, & corporis enervatio eveniat; corpore hinc debitis vestigalibus summè activis, ab his partibus persolvi solitis, fraudato [licet, ut hoc obiter adnotem, magna cunctorum fermè in corpore nervorum in actu aphrodisio eveniens tensio, unde nequit non copiosa succi quo scintille haberi profusio, atque insuper animi, re petactâ, relaxatio, qui prius cunctas partes invigoraverat, ad hunc effectum concurrant] unde forsitan deducere quis voluerit, satis largam, & cui ex nostrâ hypothese parando impar sit nervosus, per tam tenues canales allatus, succus, ejus quantitatem indefinenter generari. Verum isti effectus à subtilibus tantum quibusdam aporrhæis procedere videntur, quæ præ summa activitate, quæ forsitan reliquis in toto corpore elaboratis substantiis majori pollent, non opus habent magna copia transminari; cum notum sit, materiam summè exaltatam permagnas vires exiguâ mole exetere posse, necdum detecta sunt vasa quæ crassiorem substantiam introrsum devehant. Si verò objiciatur meram, qualem in cerebra-

li,

li, pro nervoso succo parando, secretipue supposuimus, percolationem hic etiam sufficere posse, adeoque naturam faciliorem, quam comminiscimur nos, methodo rem absolvere; repono, quod quandoquidem tantos, tamque eximios hujus substantiæ effectus, & qui altiore redolent genium, quam qui nudo succo nervoso compeiere videtur, tam in corpore, quam postquam emissa fuerit, experimur; probabile videtur elaborationis esse isto succo indolis, crasque requirere ab omni eâ diversam, quam à particulis quibuscumque ex sanguine immediatè delibatis, utpote nondum ad summam subtilitatem redactis, habere potest; cui proinde comparandæ fermenti admixtione opus habet. Hoc autem unde quam à succo nervoso suppleri potest, qui morâ & transitu per nervorum canales, ulteriorem comminutionem, altioreque indolem, quam inter secedendum in cerebro obtinere potuit, adipiscitur, uti supra fufius disce-ruimus.

Dubitari forsan potest, an secretiones ab exhibitio cathartico, aliisque medicamentis, concitæ, quicquam nervoso succo debeant, quandoquidem & succus iste iusto dimenso ad secretionem ex naturæ lege concitandas, si omnino ex usu sit, ex ejusdem designatione suggeri supponatur, unde tam copiosis, quam exhibitis hisce medicamentis proveniunt, cendis impar videatur, & concreta ista fermentorum vices hoc in negotio gerere forsan concipiantur. Cui difficultati referre liceat, quod quoniam fermentativæ istæ substantiæ magnam quibusdam præ cæteris sanguinis particulis laxitatem inducunt, per seque, quibus reliquis ante sociabantur, & unde à divortiis arceantur, solvunt, exigua fermenti nervosi, summæ activi, quantitas sufficere concipitur ad determinationem iis, dum partes secretorias tranant, in commensuratos vasorum, quos offendunt, porulos divertendi imprimendam. Verum qualemcumque tandem laxitatem naturæ fuerint istæ sanguinis particule, difficile tamen conceptu videtur, quod supra monstravimus, quomodo suoque genio absque dirigente fermento subintrent, quandoquidem majori constant mole, quam partes sanguinis spirituosæ, quæ proinde aditus prius occupando istas ab ingressu arceant, ipsumque sanguinem, depurationis vice, depauperent? Porro vix concipi potest quin absque tali, forinsecus inductâ, impetitione (quam à medicamento sperari nequeunt) patentiores, & magis rectos, sanguiferorum vasorum ramus potius capessere debeant, quam devios & angustiores secretiorum. Adde, quod probabile videtur, pungitivas medicamenti particulas, dum sanguini immixtæ cerebrum

inter circulandum tranant, ipsum vellicare, quo fiat, ut in nervos copiosius succum suum propellat. Quinimo concipere fas sit, harum subtiliores etiam in nervos se cum eorum liquore insinuare, adeoque acriorem reddendo, majorem ei ad exturbandas, quibuscunque obviam fir, particulas vigorem addere; & quamvis universalis sit istius succi excretio, in illis ramen solummodo partibus concitari potest, quam diximus, secretio, ubi vasa adsunt laxatarum sanguinis particularum figuræ & diametri ratione susceptiva.

Obiter hic, quid de famigeratâ illâ, *An medicamenta purgent electivè*, controversiâ tenendum existimamus, paucis attingere liceat. Ne enim veterum de humoribus doctrinam, ad quam sensa sua super hac re accommodarunt, disceptationesque utrum *ἰατρῶν*, an *ἰσχυρῶν*, res transigatur, aliasque hujusmodi exagitemus; rationi omnino consentaneum videtur, quod cum sanguis ex variæ & determinatæ magnitudinis particulis constatur, unius generis medicamenta (quorum invicem diversitas in hoc solummodo consistit, quod diversæ inter se sint, quoad particulas constituentes, magnitudinis, & figuræ, variæque texturæ) has, alia illas laxent, adque secedendum disponant. Cum enim nulla corpora indiscriminatim in cætera omnia agant, sed quædam in hæc, alia in illa, pro particularum alterutrius quoad dictas affectiones proportionem, quid aliud concipere possumus quam quod, ubi corpora, ex certæ cujusdam figuræ & magnitudinis particulis constata in sanguineam admissa fuerint massam, in tales solummodo ejus particulas vim suam exerere valeant, quæ eam his nascæ sunt proportionem, ut ab iis in motum reduci habiles sint, cæteris, quibus diversa est indoles, intactis? istis verò sic agitaris, atque à reliquarum amplexibus liberatis, majorem, quam sociis suis minus laxatis, ad secedendum, ubivis propellens accesserit, promptitudinem adesse nemo negaverit. Unde non mirum quædam exhibita bilem (magis propriè sic dictam) alia serum, alia crassiores, aliæve generis substantias evacuare, prout nempe ad has vel alias sanguinis partes laxandas & exterminandas variè disponuntur; nec injuria cholagogæ, phlegmagogæ, appellaciones (modo satis sano sensu sumantur) talibus medicamentis à veteribus [mihi summè venerandis] inditas fuisse videtur.

Hinc etiam copiosæ & subitæ, à *large potu*, *missionis* reddi potest ratio. Erenim sanguinem potus ingestus onere suo gravans, nec in ejusdem genium præ copia converti habilis [quod requirit, ut & sat longo tempore cum eo circuletur; & justo dimenso suppediteretur, cum nimia quantitas sanguinis crassa lab-

labefactando assimilationem prohibeat] laxus in ejusdem gurgite fluitat, quo fit, ut dum ad glandulosa renum corpora (quo præ declivi situ facilius tendit sanguis, minus elaborato hoc liquore refertus) appellit, ab exigua fermenti nervosi quantitate nullo negotio expelli posse verò consentaneum videtur. Porro eo copiosius ista secedere concepiatur materia, quoniam, renibus diluto hos sanguine distentis, nervorum etiam ora necesse habent dilari, adeoque succum suum in sanguineum rivum præterlabentem profundere, unde majori copiâ aquosa hæc materia exturberetur. Nec sane opus videtur alias, quam uoras chyli & sanguinis vias pro phænomeno hoc solvendo (nisi tales revera adesse monstraret autopsia) comminisci. Haud enim conceptu adeo durum videtur, arque nonnulli sibi fingunt, quomodo fluida adeo substantia, qualis est potulenta materia, comprimentibus imi ventris musculis & visceribus, necnon & diaphragmate inter respirandum, promiè è ventriculo [maximè si nimia illic copiâ congeratur] extrudi possit, dein ex intestinorum sese stringentium, utpote seu quantitate seu acrimoniâ lacessitorum, cavo in lacteas nullâ morâ coletur, perque eas & receptaculum, citò pede labatur, inque sanguinem convehatur, cum præter partium circumpositarum pressuram, motu peristaltico hæc etiam vasa gaudeant; id quod ex hoc liquet, quod si in viva sectione chylus, etiâ ex crassioribus cibis confectus, aliquantisper in lacteis, donec nempe sufficienter impletæ fuerint, detineatur, dein vero (intereepro interim cum intestinis commercio) liberè fluere permittatur, dicto citius in receptaculum serpit, disparentibus lacteis; quanto celerius hoc fieri debet ubi solus fetosus liquor eos tranaverit: Postquam verò à sanguine absorptus fuerit, neminem laet quantâ pernicië fluit; nec dubitari posse reor, quin in descendente aoræ truncum majore sui parte delapsurus sit, cum præ *πυκνότητος* defectu, & miscellæ cum sanguine exactioris carentia, pronior ad descensum sit, arque sic renibus se, à sanguine, cui modo immixtus erat, separandum, sistat.

Verum ab instituto nostro non multum fortasse alienum erit breviter expendere, unde fiat, quod, *suppressa una evacuatione*, materia, illae exterminari solita, per alias, & *diversi generis materia advehendæ* dicatas, feratur vias, quod incongruum videtur ex supposito, quod secernendæ partiæ vasorum porulis commensuratae esse debent. Sic e. g. observari potest, obturatis [à quacunque demum causa perinde est] ductibus urinariis, materiam, illae asportari solitam, per poros cutis, vel sedem, amandari solemus esse; poris occlusis, majorem

rem urinx copiam prorumpere, &c. quodque notatu dignum, naturâ crisin in febribus moliente, ex certâ aliquâ, nunc illa, parte, totum (ferme) quod negotium illi facit, expelli cernimus, licet ex diversimodis confietur secedens massa particulis, quarum plurimas & crassiores, & figuris, ab iis vasorum secretoriorum, debite constitutorum, per quorum ora prodeunt, multum discrepantibus, præditas esse, nemo opinor negaverit.

Cui dubio reponimus, quod sicut concedendum est ad secer-
nendæ materiæ particulas mole sua secretoriorum vasorum
diametrum non debere excedere, sic pariter, ex naturæ desig-
natione, certam massæ, ex qua secernendæ sunt, adesse de-
bere proportionem; quæ si nimia adsit copia, ut vasa conti-
nentia ultra modum distendat, haud concipi potest, quin sic
ubi emissaria à latere isti vasa habeant, hæc insuper ultra pri-
stinam & naturalem dimensionem ampliuntur, adeoque aliis,
quam quibus ante commensurata erant, transmittendis paria
evadant. Adeo ut, si vel secernendæ materiæ suppressio, vel
contentæ massæ turgescencia invecita fuerit, fieri non possit,
quin ubi aperturæ aliquæ ex continentibus vasis in proximitate
fuerint (quales secretoria præbeant vasa) necessario hæc amplius
dilatentur, eoque potius si, vel præ debilitate aliquâ, vel
naturali habitudine, laxiores esse contigerit. Idcirco nil mi-
rum effectum hunc in propositis instantiis produci, cum præ
nimia retenti humoris copiâ nequeant non ultra statum soli-
tum distendi vasa. Quin observare licet, & solitas evacua-
tiones (maximam saltem earum partem) aliquo ante crisin
spatio non procedere (quod massæ sanguinæ confusio, quâ
sic invicem singulæ, ut sese à mutuis amplexibus extricare ne-
queant, inque vasa proinde impelli, tribuendum duco) &
turgescenciam sanguini, quod symptomata præcedentia restan-
tur, adesse: quæ ambæ ubi concurrent causæ, quomodo
fieri potest quin, particulis noxiis & ablegandis, præ spiri-
tum summâ tandem potiorum actione, dispositionem jam
ad secedendum nactis, debiliora, & magis dilatata vasa [ipsa
foras massæ constitutione ad quædam præ cæteris laxanda
conferente] transitum egressuris concedere incipiant: cum
veto jam patere incipit janua, atque primæ æiei portis assu-
denti egressus sic datur, reliquæ carceris sui pertæxæ, dum
illarum vestigia premendo confertim erumpere satagunt, cu-
neorum violenter adactorum instar, majorem hiatum ape-
riunt, adeoque crassioribus etiam, quæ secus nullum hæc exi-
tum invenire possent, satis liberum commercium præbent:
hinc major sequitur ad hanc partem sanguinis affluxus, cum
no-

notum fit, majori semper copiâ illuc propelli, ubi via extrorsum ducit, à qua, præ partis distentione & dilatantur, ut modo dixi & irritantur inserti nervi, unde copiosius succum suum profundunt, qui hæc opera crassiorum in sanguine particularum motum in vasa secretoria determinate concipiatur; adeoque magna spirituum sanguinis, qui secus erumperent, pars, intercepto sic à crassioribus itinere, intus retinentur: venarumque tramitem solito tenore repetere coguntur. Interea tamen non inficias ivero magnam spirituum expensam fieri, nec enim aliter evenire potest in tantâ vasorum dilatatione; verum hac arte magnus eorum numerus ab exitu præverti videtur. Postquam verò hinc depleta fuerint vasa sanguifera, sponte connivent secretiorum oscula [adhærentibus insuper forsan viscidioribus quibusdam ex massâ lentius jam motâ, particulis] atque una nervorum, unde pristinum repetente tramitem sanguine cessat hæc eruptio.

At ambigi potest utrum ad *hepaticam secretionem nervi* quicquam faciant, quandoquidem, licet grandiusculi hic inserantur, minores tamen, si partis eximiam amplitudinem spectes, forsan sunt (servata proportionem) quam quibus aliæ plures secretoriæ partes gaudent; cum tamen vasa secretoria & ampla & numerosa sint. Proinde, cum uniformiter agit natura, deducere quis forsan poterit, nec aliis hujus prolapix in partibus nervosum huic muneri succum inservire.

Cui dubio ut occurramus, è re forsan erit attendere quod, quandoquidem laxitas in sanguinem (prout superius statui-mus) introduci debet, ut sic particulæ ad secessum destinatæ promptius fermento nervoso, in ipsa parte suggerendo, obsecundent, inque vasa secretoria adstantia propellantur; ubi hujus gradus major fuerit, minor sufficere potest fermenti istius quantitas, unde concludere licebit, minores in partibus, ad quas sic laxatus appellit sanguis, adesse debere nervos hoc adducentes. Ad laxitatem hanc efficiendam, naturam, intestina solummodo fermentatione non contentam, fermentorum præcedaneorum variis in partibus affusione prospexisse notavimus, unde major hic, minor illic in allabente sanguine, pro fermentorum istorum activitate & copiâ, supponi debet introducta laxitas, adque particulas dimittendas aptitudo. Hanc in sanguine hepar alluente majorem esse, quam in eo, qui cæteris plerisque adducitur partibus, conjicimus; propterea minor fermenti nervosi, immediatè effundendi, hic sufficere potest proportio. Si quærat, unde tanta hæc

hæc isti sanguini laxitas accedit; respondeo, verisimile videri à *lienari* fermento pendere: sanguis enim lieni advectus, & nervosi succi affusione illic subtiliatus & morâ, quam in ejus cellulis (à Cl. *Malpighio* detectis) trahit, elaboratus, nequit non & ipse multum laxari, fermentique genium hinc induere, & reliqui, à melsaraicis, ceterisque venis, hepatis allati (illo enim totum properare circuitus leges dubitare vetant) compagem non parum solvere, unde minori negotio in poribilibariis assantia ora secessuræ impelli valent particulæ. Usus hic (de quo tantopere inter authores, dissentientibus invicem calculis, disceptatum fuit) lieni à *solertissimo* modò dicto viro [*de liene* c. 6.] assignatus maximâ probabiliter niti mihi videtur. Cum enim [ex ejus observatione, magis quam antehac factitatum erat, accuratâ] glandulosis corporibus pars hæc scateat, secretionem in his, ad morem alibi constitarum ejusdem generis partium, institui verisimile est; cum vero cuncta glandularum producta introrsum devchenda altiore, quam sanguis ex quo proliciuntur, energiam sapiant, atque huic remixta eidem fermentativa evadant; cum porro nulla adfita, per quæ secreta materia extrorsum deducatur, sed sanguine ad hepar properanti necessariò remiscenda sit, cuinam alii, naturæ methodis magis congruo, dicari potest hæc pars usui, quam ut ad secretionem in hepate sanguinem disponat? Una, ex quâ me, ut liberè fatear, satis expedire nequeo, etiamnum hæret difficultas; quâ nimirum atte *splene exsecto*, fiat, ut secretio hepatica satis liberè, ad chyloscos in intestinis munus complendum, recrementaque hac elutriari solita, pro naturæ exigentiis amolienda procedat, postquam sic (juxta hypotheseos nostræ tenorem) sanguis appellens fermento hinc propagando fraudatus fuerit. Nisi forsan conjecturam hic ferre liceat, Numinis ministram *Naturam* [cujus solertiam non minus in defectibus reparaudis; quam singularum partium staminibus primitus jaciendis, & agnoscere, & suspicere tenemur] copiosiore nervosi succi ad hepar, per nervos huic insertos, affusione isti defectui subvenire: Cui sane conjecturæ favere videtur, quod [juxta Cel. *Willisium*] inter plexum hepaticum, & lienarem, per fibras utrinque interjectas, communicatio intercedat: & quoniam [ex annexo à Cl. Viro *schemate*] constare videtur, commercium hoc intercedere, antequam in ipsum lienem nervi inseruntur, quidni coniciamus naturam, quasi prævidisset quo pergerent hominum ausa, consulto prospexisse, ut succus in lienem erogari solitus, hoc exsecto, ad hepar in dictum usum deduceretur.

Ut

Uteunque sit ex *Malpighiano* experimento (loco cit.) inferre forsitan licebit, ad secretionem (ubicunque tandem) promovendam conferre lienem: canem enim, cui vasa ad partem hanc ar-
 tentia strictè ligaverat, plurimum & frequentissime, ultra quam solent hujusmodi animalia, mingere observavit: Qui effectus ab hoc pendere, non prorsus fortassis absurdè concipiatur, quod secretionem, cui excitandæ lienare fermentum opem conferre supposuimus (quam nisi hepaticam nemo, opinor facile monstraverit) parcius, hujus defectu, procedente, materia eliminanda, solitum tramitem deserere coacta, cum reliquo sanguine introrsum devehì necesse haberet, ubi morâ suâ vel taliter comminui forsitan poterit, ut ad renum porulos aptitudinem nanciscatur, vel copia sanguinem gravando, & partes distendendo istos (atque una nervorum insertorum, unde major succi horum profusio habeatur) ampliores reddat, adeoque hac via se expelli non invita patiatur.

CAP. XIV.

De vasorum biliariorum officio.

Quamquam nostri non sit instituti, ut supra monuimus, singulas particularim secretiones expendere; quoniam tamen circa humorum in intestina deponi solitorum vias dubia quædam occurrunt, arque de distinctis vasorum biliariorum muneribus, maximè verò de vesiculæ biliaris usu, non admodum explicite ab authoribus dictum est, liceat in ista paululum inquirere.

Et primò quandoquidem doctiss. *Græffius* (de suc. pancre. nat. & usu thes. 196.) nil copiosæ illius secretionis, quæ exhibitio catharrico supervenit, per arterias mesaraicas (quod tamen communis fert sententia) in intestina deponi asserit, totum autem quod ex sanguine in hæc secernitur per ductus pancreaticum & biliarium prorumpere; cui tamen effato, experimento licet nixo, paucos solummodo assensum præbere comperio (quamquam hujusce rei penitior contemplatio ad phænomena quorundam non temnendorum rationes reddendas medicinamque faciendam non exigui momenti mihi videretur) pauca quæ pro eo insuper militent in medium adducamus.

Primo igitur nequaquam naturæ methodis consentaneum videtur easdem glandulas (quas esse partes secretorio operi destinatas supra conati sumus astruere) vasis secretoriis ad contrarias metas tendentibus donari, nec pluribus diverſi generis materiis ſecernendis dicari, nec ſanè tale aliquid obſervationes Anatomicæ ſedulo factæ, quantum mihi liquet, teſtantur. Arqui cum interiorem inteſtini, chylum proximè amplectentem, tunicam glanduloſam eſſe obſervavimus, per quam decurrere vaſa chylum introſum verſus ſanguinem ducentia nemo, opinor, negaverit; haud tamen conſtet adhuc quæcunque Anatomicorum (quorum tanta ſeraci hoc ingeniorum ſeculo pullulavit ſeges) indagine, per eam tendere vaſa ulla quæ ex ſanguine quicquam exportent, nec quidem duum generum hic reperiri glandulas; propterea precarium mihi videtur, cum res aliter facilè explicari poteſt, duplex hoc ita & oppoſitum, chyli ſcil. verſus ſanguinem deferendi, & excrementi ex eodem educendi, penſum aſſignare.

At ſecundò magis incongruum foret per chyloſas ſemitas expurgari. Ut enim ſileam, quod vix ſatis certo indicio conſtare arbitror, ipſorum eorundem liquorum in iſdem vaſis reciprocationes dari, haud omnino rationi conſentaneum eſt liquorem, cui reliqui omnes, totaque adeo partium vel ſolidarum cohors natales debent, per eoſdem canales inſus deducendum fore per quos emerita depluunt ſanguinis recrementa, quorum occuſu ſi non repelli, ſaltem inquinari neceſſe haberet. Sed non libet tam abſurdo commento immorari.

Tertiò, ſi verò oggeratur immediatè ex arteriarum oſculis in inteſtina tranſcolari recrementa hæc; repono, præterquam quod non conſtat numerosas adedò arterias, ut tantum humorum, quantus ſæpenumero excerni ſolet, proventum apportent, huc propagati, ſed quod maxima eorum pars in exteriori tunica deſinere videtur, ut ſic facilior ſanguini ad hepar (mixtarum ſecretionum maximum, ni fallor, quod corpus habet ſecretorium organum) properanti ſternatur ſemita: difficile inſuper explicatu videtur, quomodo ex iis coletur crassa, quam excerni videmus, ſubſtantia; cum potius ſubtiliorem & ſpirituofam ſanguinis partem elapſuram veriſimile ſit, ſi mera pereolatio hic locum habuerit. Nemo enim non concedet parentiores eſſe ex arteriis in venas hiatus, quam qui in inteſtina, pro tranſfretandis hiſce recrementis concipi poſſunt, cum totà ſua maſſa ſanguis illac feratur, unde fieri non poteſt quin, ſi omnino ullæ, ſub-

tiliores solummodo in intestina delapsuræ sint particulæ, crassioribus in venas sese recipientibus. At insuper cum natura secretionem regulares & nstratas non nisi in glandulis certo artificio extructis moliri observetur, vel tales hic adesse monstrandum erit, vel ratio saltem assignari debet, cur à solita operandi norma deflectat.

Verum quarrò, detur glandulas eductorias inter eas quæ chylum important dispersas esse (nec enim post tot, veteribus ignotas, nuper detectas, partes peremptoriè negaverotales forsan haberi, cujus rei penitior notitia à cultro Anatomico quærenda est) quandoquidem tamen admodum exiles ut sint necesse est, cum hæcenus, una cum vasis suis, visum effugerint; verisimile est eas, si omnino adsint, potius fermento ad ulteriorem chyli elaborationem ex puriori sanguinis substantia suppedirando (more earum quibus ventriculi tunica, cui hæc intestinorum continuatur, respersa est) quam emeritis ablegandis ejus partibus scernendis natas esse, cum si posterius hoc munus iis competat, satis conspicui ab iis canales emergere debere videntur, qui tam crasso, qualis sæpenumero excerni solet humori eliminando pares sint.

At quintò magnum secuturum videtur incommodum, si per intestinorum tractus separarentur recrementa hæc. Cum enim ubivis juxta vasorum, quæ istud subire pensum debent, emissaria poruli chylum iutrosum vehentes adstare agnoscuntur, quæ quæso ratione præcaveri potest, quo minus ista recrementa chyli ductuum horum oscula oblinant? Unde si non in ea (verante forsan figura & mole) admitti possint, saltem chyli particulas ab ingressu arceant, utpote aditum quibus ingredi debent ostia prius occupantia. Si obijciatur certum esse recrementa à quibus tantopere timeamus, in intestina, undecunque tandem, deponi; nec tamen eam, quam causamur, noxam, nisi raro, inveniri respondemus istas materias, si per intestinorum decursum separantur, quandoquidem ex perexilibus emissariis necesse habent prodire, continuo & sensim exstillare, unde nullo negotio super ductuum chyli ferorum ora se diffundere valerent, cum si ex hepatico pancreaticoque ductibus provenirent confertim & interpolatè, quando luxuriare contingerit, erumpant, unde intestina tam copia, quam molesta qualitate irritando & ipsa excludantur, & secum una obstruentes quascunque sive chyli sive alias reliquias deturbent.

Sextò quod verò agmen claudat non omnino necessarium

videtur ad abstrusas hæc vias confugere, ubi patuli adeo & obvii sese exhibent ductus, ac sunt hepaticus pancreaticusque, quorum tanta est amplitudo, ut cuncta secretionum istarum momenta hinc pendere facile posse satis obvium sit concipere. Quamvis enim ductuum horum alter bili soli, alter limpidi, salivæ plurimum affini, liquori ex sanguine secernendis ab authoribus dicuntur, non video tamen cur non & superfluis, cujuscunque ferme generis, substantiis ex eo in intestina eliminandis pariter ex usu sint. Et pancreaticum quidem ductum quod attinet, cur non hæc varii excernantur humores, perinde ac per salivares, quos & in morbosa diathesi & exhibitis pyralismum concitantibus medicamentis variorum humorum saburram profundere notum est, ut alias secretorias partes taceam, quæ non semper unum idemque humorum genus secernunt; At regiam sanguineorum recrementorum, per sedem deturbandorum, viam hepaticum censeo ductum. Si enim hepatis (molem quod hoc seculo hæmatoseos muneri famulari defuit) quantum vix ulla alia in toto corpore secretoria pars habet, copiam sanguinis illo prope-rantis, ejusdemque insuper à lievari fermento prædispositionem ad secedendum pensitaverimus, vix credibile videtur, tantum ad bilem solam secernendam quam (cæteris humoribus calidiorem & proinde magis mobilem, faciliusque secessuram, quibus humorum doctrina placet agnoscunt) apparatus requiri, interea ut aliæ ex inveteralcente continuo sanguine biliosæ crassiores & tenaciores particule affasim, & majori forsitan copia pullulantes, quæ & amandari necesse habent, nullam tamen ad secedendum procacitatem fortiantur, & obscuras quibus abscedant semitas quærere cogantur.

Si quærat ergo cur tam numerosæ, tamque amplæ ad intestina discurrunt arteriæ, nisi iis aliquid eliminandum suggerant; Respondeo hoc fieri, tum ut major hisce partibus refocillandis sufficiatur calor, quæ cum membranosa sint, hujus fori plus indigent; tum ut hoc facto ambitu rapidior sanguinis ad hepar tendentis refringatur motus. Videtur enim (prout supra fusius disserimus) quod si tam rapido torrente hanc partem allueret, atque necesse haberet si immediate per arterias illo deportaretur, nulla secretio præ magna sanguinis confusione succederet; hæc verò sanguinis retardatione fit, ut singulis particulis ab agitatione à corde impressa minus sollicitatis, quæ ad secessum destinantur facilius, ab affuso nervoso in hepate fermento, in ductus hepatici ora deturbentur. Huic favet quod venæ mesaraicæ in tantum am-
plia-

pliatæ præ arteriis conspiciantur ; hanc enim auctam istorum vasorum proportionem ad motum sanguini retardandum , quo pacatiori flumine ad hepar feratur , plurimum contribuere notavimus.

Sed ne diutius *Graeffiano* huic placito immoremur (cui plenius vel statuminando vel reprobando accuratiores, fateor, observationes *Anatomicæ* in scenam vocandæ sunt) distinctum cystis biliaræ usum , de quo parvus inter *Authores* sermo , explorandum descendamus.

Sylvianum quidem vel potius *Bachianum* , quod in limine sese offert , dogma , *Bilem ex sanguine , cysti felleæ per propriam arteriam allato , fabricatam , ut volunt , reliquo hepar trahenti , ut ei fermenti loco inserviat affundi , non opus erit hic exagitare* , quandoquidem tum experimentis , tum rationibus , à *Cl. Needhamio & Malpighio* allatis , abundè satis evincitur , unicum cysticæ huic bili , in intestina scil. iter esse , nullatenus verò ex cysti delapsum in hepar sursum per porum bilarium serpere.

Quo sic habente , proximè inquirendum erit qua via vesiculæ , quem continere solet , liquor suppeditetur.

Et partem sanè ex glandulis miliaribus , quas per ejus radicem dispergi observavit *Cl. Malpighius* (*De hep. cap. 4.*) delibari rationi consentaneum videtur , quo enim sine tales hic sitæ sunt glandulæ , nisi ut liquorem aliquem in vesiculæ cavitatem effundant , cum & eas omnes secretorias esse partes constet (saltem admodum probabile sit) nec quisquam , puto , asseruerit inde quicquam in sanguinem devehendum exugere ? Verum longè maximam ejus partem ab hepate derivari extra dubium habetur , cum nulla alia in procinctu pars sit , quâcum tantum habet commercii , ut inde eam suppeditet copiam quæ hic scarurit. Sed de via qua ex hepate deportatur , utrum scil. per proprias radices , an per meatum cysticum huc deferatur , difficultas (cujus enodationem ad præsentis quæstionis solutionem aliquantulum conferre posse censeo) etiamnum hæret.

Equidem priusquam innoverat fibras (quarum unam majusculam juxta anulum fibrosam insertam vesiculæ radicem *αὐτὴν ῥίζαν* appellant *Cel. Anatomici*) à vesiculâ in hepar protensas esse , antiquitus jute creditum fuit istam partem liquorem omnem suum à poro bilario per meatum cysticum accipere ; nec enim alium in promptu erat comminisci tramitem. Postquam verò accuratiori *Anatomicorum* (*Fassolini* imprimis , uti censet *Cel. Glissonius*) industria earum notitia inveccta est , adeo perplacuit inventum hoc , ut longè

potior medicorum pars, relicta veterum sententiâ, per has tanquam radices impleri cystin (maxima saltem ex parte) opinari fuerint. Quam licet haudquaquam, antequam ex sedulo facta indagine Anatomica ulterius quid veri falsive subit plenè constiterit eversum iverò (nec enim eam præ me fero dissectandi peritiam ut hac in re pronuntiare ausim:) præfata tamen Cel. *Glissonii*, aliorumque doctissimorum virorum eidem astipulantium venia, dubium mihi (cui veterum, quousque nec experientia nec evidens ratio aperte refragantur, sacra authoritas) adhuc videtur, utrum plenè constet omnino admittendam, esse hanc per proprias radices implendi rationem, atque annon totum, quem ei hepar sufficit liquorem cystis eadem, quæ veteribus placuit, modo memorata via accipiat.

Quæ mihi hanc dubitandi ansam suggerunt hæc sunt.

Primò, quod si per radices, uti adstruit Cel. *Glissonius*, nec omnino per meatum cysticum, nisi per accidens implenda sit vesicula, vascula tantilla huic munerì plurimum improporcionata videntur. Mox enim monstrare conabimur partem hanc indies, idque plerumque sæpius in die, suam sarcinam satis magna copia deponere, & novum proinde proventum identidem admittere, quod ut præstet satis largi hiatus vase donari debet, qui liquorem hunc ea, quæ ferè inagnitæ replendæ sufficiat, quantitate suppediet; eoque magis quoniam bilis secretionem non perrenniter, sed interpolate (saltem non æquali omnibus horis mensura) fieri censemus. At haud ipse oculatissimus vir, nec, puto, quisquam alius, disertis verbis sibi compertum asserit cavitatem in majori illâ, quam vocant, radice (ut de cæteris taceam minoribus fibris) conspicuam haberi; quæ certè, si tam eximii usus foret, & omnino adesset, sicut vix sagacissimi viri indaginem effugere potuisse credendum est, sic ab eo procul dubio prodita fuisset. Imò nec Cel. vir illius in hepar distributionem ad modum explicite describit, verum postquam edocuerat hujus vasis truncum ramusculos aliquot & vasa capillaria in hepatis cavum distribuere (*Anat. Hip. cap. 13.*) satis cautè addit videturque etiam ipsum ramulus quidam *Portæ comitari*, tanquam innuisset, talem ejus com meatum ei omni ex parte non prorsus perspectum fuisse.

Secundò, nil repugnat quin vesicula satis commodè per meatum cysticum impleri possit; quod & ipse doctissimus vir haud obscurè agnoscit. Siquidem & inficiatur ullam hic sitam esse *valvulam* quæ bilem ascensuram repellat, verum

rum cap. 14. & 19.) levi digitorum compressione hanc horsum & retrorsum per hoc vas adigi posse asserit; atque insuper (cap. 17.) fibrosum vesiculæ annulum, quam obliquam ductus communis in intestinum insertionem, ut plurimum infirmius oblutari. Quo sic habente, quandoquidem magna (quod omnes, opinor, agnoscunt) copiâ per bilarium porum suus ex hepate descendat humor, sitque major fibrosi annuli quam obliquæ insertionis laxitas, unde prius impleri, quantum circumpositarum partium finit pressura, necesse habeat vesicula quam liquor hic in intestinum erumpere possit; cum porto nulum vel perexiguum (ex mente sagacissimi viri) inter liquorem cysticum, & per porum ex hepate delatum intercedat discrimen, mihi haud opus videtur (nisi clarè monstraret autophia) alios comminisci, per quos impleri teneatur vesicula, canales, & quamvis urgeri possit multos in corpore dati secretos, omniumque vel solertissimam eludentes indaginem, meatus, ubi nihilominus certum est liquorum decursum esse, quemadmodum de nervis (missis aliis instantiis) affirmati potest; reponere licet bilem in cysti contentam & satis crassum esse humorem, & frequenter (nec exigua, prout mihi videtur, quantitate) in intestina ex hoc conceptaculo evacuari, ut proinde necesse habeat satis patulum & obvium sortiri vas, per quod ex hepate in eam deducatur.

Tertiò Liqueat porum bilarium easdem cum Porta ramificationes obtinere. Eo enim in loco, Anatomicorum consensu, ubi ex collectis mesaraicis, splenicis, &c. venis, in unum intra hepar coit truncum Porta, porus bilaris ej sociatur, atque æquo dimenso (saltem nondum notata variatione ulla in amplitudinis proportionem) ad omnes ejusdem intra hepar distributiones illic pariter dirimitur, unde persicilè per totum hepar à Porta suffultus distribui potest, ut precarium videatur (quandoquidem ex autophia hanc clarè satis rem ita se habere deprehenditur) si non naturæ methodis dissonum, ullos ejus ramos ante abrumpi vel desinere, ut vesiculæ radicibus, idem onus suscepturis, locum faciant, quam ad omnes hepatis, quod Porta tendit, partes se disseminant. Propterea, cum præ tali vasorum distributione satis commodè totum per porum bilarium exterminari potest, quod sub bilis appellatione in hepate fecerni tenetur cumque promte adeo ac diximus per meatum cysticum ex poro impleri potest vesicula, cur gratis supponamus naturam, regularem suam & simplicem methodum deferendo, pluribus condendis vasis demandam iri, ut itidem opus exequatur?

Quar-

Quartò , At quod majoris forsàn momenti hoc in negotiò sit , observavit in quibusdam animalibus Cl. *Malpighius* (de liene cap. 6.) vesiculam ab hepate prorsus determinari. Nempe in viperis & consimilibus , eo dicente , oblongus à jecore producit in intestina porus biliaris , cujus extremitati in intestinum hiantì nectitur meatus cysticus à proprià vesiculà emanans , quæ multo intervallo ab hepate dissociata proximo intestino hæret. Quæro hic , quandoquidem haud in promptu est aliud vesiculæ in hisce animalibus usum & actionem comminisci , quam quæ aliis , in quibus hepaci affigitur , competunt , quomodo , nisi per meatum cysticum bilem ex hepate obtineat , cum nullum immediatum cum eo commercium habeat. Quod si ita sit , deducere licebit bilis cysticæ proventum , non necessariò ab hepate per radices inde ad vesiculam propagatas petendum esse , quorsum aliter in istis animalibus hepati non affigitur ; Proinde haud sequitur quod in quibus hepati affigitur inde suum eo modo depromit liquorem : cum enim in utroque genere patet usus , & , quoad cetera , fabrica sit , quæ ratio dari potest , cur in his magis , quam in illis , aliud quam per meatum cysticum ad vesiculam bili ex hepate trames esse debeat ; sium verò ejus in his intra hepatis crepidinem , arctamque cum eo connexionem , non frustra à natura designari mox firmare conabimur.

Quamvis autem bilem haud immediatè in intestina penetrare , sed in cystin (ad eximium intra tradendum usum) prius divertere debere censcam , ideo tamen etiam huc desistere videtur , ut liquori ex glandulis *Malpighii* cysticis modo memoratis exstillato admisceatur à cujus (utpote diversi genii , si fas sit suspicari , humoris) miscella alias , magisque muniis subsequenteribus accommodatas dotes acquirere verisimile videtur. Quod verò in cysti non raro (ex *Glissonii* observatione) æque crassa imò (ex *Malpighii*) quandoque crassior quam in poro deprehendatur , cum probabile sit liquorem ex hisce glandulis exstillantem modum illius quis ex cæteris plerisque excernitur limpidum & tenuem esse ; id partim longiori quam hic trahit moræ , unde in majorem crassitiem excoqui necesse habeat , tribui potest , partim stagnationi aliquali dandum , qua fieri vix potest , quin & crassiores subsidant particule , & tenuiores supernatantes , compressione facta , promptius , illis relictis , exprimantur : Imò quamvis , usque dum in motu fuerint , satis fluidæ & tenues videantur , ubi tamen paululum quieverint , in mutuos ruunt amplexus , atque hinc multo , quam secus eveniret , crassiorem liquorem exhibere faciliè possunt , diversamque forte ab ea , quæ in poro etiamnum scaturit ,

bi-

bilis speciem simulare ; nec sanè rarò evenit , quod in calculosam etiam substantiam concreſcunt ; tantopere ad crasseſcendum proclivis eſt hic liquor. Utcunque ſit , ſaltem acriorem ſuſpicor eſſe bilem , quæ ex hepate noviter emanavit , inque poro adhuc ſtabulatur , quam poſtquam in veſicam irreperit , atque illic aliquandiu morata fuerit : Ex vaſis enim exportantis amplitudine , prodeuntis liquoris (plurimum ab omni qui in cæteris quibuſcunque glandulis ſecernitur diverſo) colore , inſigni amaritudine , aliisque notis , colligi poteſt ex craſſioribus æque ac tenuioribus , & proinde inter ſe diſformibus & irregularibus particulis conſtati , quarum tamen acrimonia à lenioribus , quæ [ſi conjecturæ locus ſit] ex cys- tictis glandulis erumpunt , deliniri aliquantum poterit ; ut ſic commodum magis fermentum deſcendenti chylo exurgat.

Sed objiciat forte aliquis veſiculam , cui cervix à calculo obturata fuerat , aliquando bile ſuperius plenam inter diſſecandum deprehenſam fuiſſe , ut ideo alium , quam per meatum cys- tictum , ei aditum concedendum eſſe videatur. Cui referimus , hanc obſervationem nil noſtram ſuppoſitionem infirmare : Calculus enim iſte , in ejus cavitate genitus , quamvis elapſuro humori obſiſtat , utpote ad veſiculæ cervicem , qua propria tendentia , qua partium circumjacentium compreſſione & contenti liquoris impulſu , ſatis promtè decidens , facile tamen præbere viam poteſt humori ſuſum ſe inſinuanti , qui ex anguſtiori canali in amplius ſpatium repens , vel retroſum obſectum calculum levi negotio trudere poterit , vel aliquatenus diſtendendo meatum cys- tictum , ſibi viam inter vaſis hujus (laxioris texturæ cum ſit) latera , & calculum in veſiculæ cavitatem citò parare poteſt.

Ceterum ſive per proprias radices , ſive per meatum cys- tictum impleatur , hoc tamen pro rato habendum mihi videtur , naturam tam notabile conceptaculum nunquam formatum vo- luiſſe , niſi ut inſignem aliquem uſum præſtaret ; qui qualis ſit propius jam inquirendum incumbit.

Hanc autem diſquiſitionem quò melius proſequamur , conſiderandum inprimis eſt , obſervari , ni fallor , poſſe , Secre- tiones omnes (exceptis iis quæ vel in ipſa interiori ventriculi tunica pro fermento chyliſicatorio congeſtis illic cibis ſuggerendo , habentur , vel quarum materia inſuper ad ventri- culum in eum finem tendere debet) poſt aſſumptos cibos quamquam non in totum ſupprimi , ſaltem minutius (in iis animalibus , quæ non niſi per intervalla ſat longa cibos

assument) naturaliter procedere, usque dum in sanguineum rivum distributus fuerit chylus. Cujus rei causa forsitan assignari potest, non solum quod minor secretionibus intus suppetit materia (cum raro cibos assumimus, nisi assumtis, vel alias erogatis, maxima ex parte, prioris escæ auctariis) sed & quia succo nervoso ad ventriculum glandulasque salivares, majori copiâ (præ nervorum, tum laceratis inter masticandum glandulis istis, tum distento ventriculo, invigoratione, quâ copiosius illic suum profundunt succum, atque hinc secretionem ex præterfluente sanguine, modo superius allato, uberius concitent) suppeditato, aliæ partes illius influentiâ magna ex parte fraudari necesse habent: Natura, providi instar œconomi, hac arte prospiciente, ne massa hæc, in futuram corporis alimoniam destinata, crudior in venas admittatur. Postquam verò sanguinea massa chylo referta fuerit, & uberior universis secretionibus materia suppetit, & secretio in ventriculum aliasque memoratas partes prius facta, postmodum maxima ex parte cessat, conniventibus scil. vasis distentione sua ab oppleto ventriculo, jam immunibus, nec amplius (vacuato nempe ventriculo) laceratis nervis suis, unde copiosius in alias partes profluere potest succus nervosus: quo fit, ut natura à primis coctionis curis liberata, magis secundariis hisce muniis vacare possit.

Inter partes autem quibus hæc secretorii muneris interpolatio accidit, hepar, aliæque propè confixæ partes secretoriæ, numeranda videntur; quæ exigua solum quantitate laticem, cui secernendo destinantur, quo chylus ex ventriculo descendit tempore, deponere existimo; hoc verò (maximam saltem partem distributo, secernendi munus repetere partes has, atque tum vesicæ biliaris suum suppeditari liquorem, tum pori biliarii radicibus suum etiam suggeri.

Si quæras quomodo ex hoc supposito bilis (quemadmodum modo adstruxi) chylosæ massæ in intestinum delabenti in fermentum cedere possit, cum nisi ei toto descensus tempore continuo admisceatur, haud æqualiter in eam agere potest; respondeo, satis obvio, ut mihi videtur, & planè *mechanico* artificio hoc præstari; prout facillè patebit, si prius paucis circa vesiculam observandis attendamus.

Idcirco adnotandum vesiculam felleam in iis animalibus in quibus hepati annectitur, in concavâ ejus parte locari, quam ex adversa parte premunt tum ventriculus, tum intestinorum aliqua; in iis verò, quibus ab hepate determinatur, *intestino proximo* (dicente *Malpighio*) *herere*, ubi & non potest non ab adjacentibus aliis partibus undiquaque stipari. Observare insuper est,

est, quod quamvis raro in totum plenè deprehenditur, liquoris tamen penum aliquem perpetuo asservat: porro quod à compressione aliquanto fortiori non admodum invita suum effundit liquorem, quem tamen, præ fibroso & contractili annulo, quem, in collo habet, nunquam, nisi ultra modum distenta, sponte dimittit.

Quibus ita se habentibus, facilè concipere possumus, quod dum, ventriculo, ut diximus, feriente, bilis (in hepate secreta, & ab obliquâ insertione fortius quam fibrosus annulus renitente repulsa) in vesiculam deponitur, satis magna ejus copia hic admitti potest, quandoquidem nullam à ventriculo (utpote vacuo) pressuram hæc pars sentit; cumque per sæ longa intervalla à cibis abstinere solemus, hinc satis temporis ei pro idoneâ liquoris sui quantitate comparandâ conceditur. Ubi verò, cibus fuerit ventriculus, statim hanc comprimit, adeoque pro compressionis gradu succum suum in ductum communem, atque inde (superatâ obliquæ insertionis resistentiâ) in duodenum, effundere cogit, semicocto chylo illuc properanti suggerendum. Utque magis magisque, procedente coctione, intumescit in ventriculo massa, jamque ex pyloro erumpit, fortius usque hinc comprimitur vesicula; unde jugis biliosi laticis non potest non haberi profusio. Nec quidem cessat hæc compressio, donec maxima chyli pars à lacteis absorpta fuerit: distenta enim intestina tum extrusæ è ventriculo massæ novæ usque copiâ, tum ejusdem, dum sensim elaboratur, intumescentiâ, necessariò, ut majus nanciscantur spatium, ventriculum comprimunt, atque unâ vesiculam, adeo ut continuo descendenti chylosæ massæ, in suo per duodenum transitu, ista bilis suggeratur. Atque hinc radicum (ubi perhibentur) & fibrarum in hepar spararum usus (quem & Cl. *Glissonius* ex parte agnoscit) satis commodus, & quo alium ut mihi videtur, non opus est excogitare, assignari potest; nempe ut totidem retinacula atque ligamenta sint, quibus valentius hepatis vesicula hæc alligetur, ne quando à loco suo divelli contingeret, quod certè cavere debuit natura, ne si hoc eveniret, chylus liquoris, quem suppeditat, tributis fraudaretur, adeoque in venas minus subactus & digestus ingere-retur: etenim præ mole ejus, & abdominis in perfectioribus animalibus capacitate, metus esset ne hoc illuc volveretur; nisi admodum firmam cum stabili aliquâ parte connexionem obtineret, adeoque & bilis, compresso meatu cystico, ingressus, & ejusdem, pro naturæ indigentis & designatione, egressus præpediretur.

Interea toto hoc tempore, si non nihil, parum saltem, no-

viter secretæ in hepate materiæ ex ipso poro bilario huic massæ affundi arbitramur; cum & secretiones (prout modo monuimus) parcius hoc tempore procedant, & quod in porum ex hepate secernitur, cum hanc ob causam in parvâ solum quantitate sit, faciliè intra amplam illius cavitatem se componere posse videtur; quod autem ex vesicâ erumpit, non isto tempore *secernitur*, sed tantummodo *excernitur*, utpote quod in hunc usum hic prius reconditum fuerat. Vix autem aliquid ex poro bilario nuperrime admissi liquoris sui (qui forsân si bili ex vesiculâ affluenti, & cystico humore proprio contemperatæ, in descensu affunderetur nimis acrem redderet) exprimi potest, cum quoad situm non eo, quo vesica, modo dispositus sit, ut pressionem faciliè sentiat, quodque in eo coærvatur, in ramis hepatis confiniis nondum egressis (utpote quorum cavitas in proportionem ad extantem truncum major videtur) residere probabile est. Et sanè etiam si concederetur succum hunc immediatè per porum excretum ad chylosin perficiendam idoneum (absque ullâ lenioris liquoris mixturâ) fore menstruum, si tamen jugiter eadem, quâ intermisso chylificatorio opere totaque sua mole, præterlabenti chylo affunderetur (valis enim amplitudo magnam illius quantitatem hic fecerui solere demonstrat) coctionem forsân nimîâ copiâ perverteret & pessundaret. Si ergo quæratui cui insuper usui inserviat? dico, quod fieri nequit, quin à chylosæ massæ crassioribus & viscosis, absorptâ à lacteis puriori parte, reliquis plurimum obliuantur earum in intestina hiantium ora, quæ nisi abstergantur, hand concipi potest transitum chylo postmodum admittendo dandum iri. Huic proinde noxæ averruncandæ consultò prospexisse naturam istius liquoris, post absolutam purioris chyli in lacteas traductionem, affusione censemus, cujus acrimonia facili negotio effici potest ut abstergantur mucosus ille lentor, forsân & præ fermentativâ, quâ liquor iste, quousque naturales conditiones retinuerit, pollet indole, in alibilem succum convertatur, atque à lacteis absorbeatur, quandoquidem activâ sui parte prius orbatus, fortiori & magis acri fermento indigere viderur, quam quod integræ massæ proportionetur.

Si dubitetur quomodo biliosus liquor in intestinum, nullo factò prius in vesiculam diverticulo, penetrare posset, quandoquidem (prout ex Cel. *Glissonio* notavimus) fibrosus vesiculæ annulus quam obliqua ductus communi in duodenum insertio infirmius obluatur, respondeo quod præ diuriori liquoris ex vesiculâ in intestina, à dictâ compressione, effluxu fieri potest, ut obliqua insertio aliquanto patens, vel saltem magis

gis cedens , per aliquod temporis spatium permaneat , ut facilius bili (secretione hepatica jam , novâ suppeditatâ materiâ , vices suas repetente) ex poro rectâ descendenti transitum det , quam contra obluetur ut in vesiculam ascendat ; donec tandem nativam contractionem sensim recuperans , in eam ad memoratos denuo urgeat : Imò postquam impleta fuerit vesicula , quod superest descendentis bilis , cystico liquore haud imbutum , viam sibi rectâ in intestinum nequit non facere , ut hinc opus hoc absterfionis , priori eruptione tantum inchoatum , iterato aggrediens plenè , ante novum admissum chylum , absolvat. Ab hujus liquoris suppressione vel pariori effusione chylosarum excretionum causa frequenter petenda est : nisi enim ab adhærente mucositate liberetur glandulosa intestini tunica , necesse est ut præterlabatur chylus , adeoque destinato nutritu fraudato corpore , tabes tandem insequatur : hoc verò absque debito istius liquoris supplemento haud præcaveri posse videtur.

Quod in hunc quem assignavimus vesiculæ usum obijciatur , ferè semper ab authoribus (moderatè saltem) plenam reperiri , quod secus eventurum quandoque concipiatur , si tam constanti tenore suas quotidie contentum liquorem deplendi & novum accipiendi vices subiret , solutionem hinc forsau admittat , quod vel animalia , ex quorum inspectione hæc eruitur observatio , violenta morte perimuntur , vel rarissimè saltem occurrunt , quibus adeò resolvitur partium (inter alias) secretoriarum tonus , ut absque omni luctâ emoriantur ; unde fit ut dum cerebrum , & reliquæ quibus vel nervi vel fibræ adsint , se in mortis articulo ad motus contractivos componunt , secretoriæ pariter in contractiones aguntur , quo molimine multò copiosior habetur secretio. Hinc hepat majorem humoris ibidem secernendi quantitatem profundit , qui in porum bilarium depositus , atque partim insequentis protrusione , partim hujusce vasis , arctius hoc tempore sese stringentis , compressione in ductum communem adactus , sursum in vesiculam urgetur (quæ sanè nullatenus ad arctam constrictionem , ut ingressurum non admittat , nata videtur) in quam facilior ei trames sternitur , quam in intestinum. Porro inter extremos moribundi animalis conatus , unâ cum reliquis partibus , constringuntur intestina , unde magis occludi necesse habet ductus communis in duodenum insertio , utpote sat longo intervallo inter ejus tunicas (arctè hoc tempore contractas) decurrens. Quod verò in aliquibus , licèt rarius , vesicula vacua deprehenditur , imputari potest vel violentiæ vesiculæ compressioni (quam & causam Cl. Gluss. assignat) vel fatali

enervationi , non tam fibrosi annuli (licet & hunc pariter resolvi credendum sit) quam partium in hepate secretionis effectricium , unde nil in potum , vesiculæ postmodum tradendum deponi potest ; ut proinde tantâ invecitâ debilitate (maximè si ad universam insuper , quod in tali casu forsan evenit , œconomiam animalem , vel maximam saltem ejus partem pertingat) non mirum sit animal , in quo isthoc observatur , repentinò fato succumbere.

Verum gravis hic urget difficultas de iis animalibus quibus deest vesica biliaria , quemadmodum in *Equo* aliisque non paucis observari posse Celeb. *Glossonius* & *Needhamus* testantur. Cum enim & hæc fermento chylificatorio in intestinis suggerendo , perinde ac alia quibus suppetit vesicula , indigere , quænam tempore variatæ in his organizationis ratio haberi potest ?

Cui dubio quamvis non parum difficilè mihi videtur satisfacere , & cui plenius enodando collatæ circa variorum animalium fabricam peculiare quædam observationes (quæ tamen mihi nondum constant) requiri videntur , ne tamen prorsus intactum præteream , conjecturas meas circa hanc rem aliorum censuræ subijciam , quæ & (quamquam non facis , saltem) scintillulæ forsan loco esse poterunt ad ulteriorem ejus elucidationem.

Inprimis autem hic observari poterit , primò plurimas animalium species vesicula hac præditas esse , inter quæ ea (quantum mihi observasse contigit) quæ per satis longa intervalla à cibis *abstinere* soleant , numeranda veniunt ; item *Carnivora* (domestica saltem) quorum nempe pabulum particulis magis activis constat ; quinimo *Ruminantia* , ea saltem quæ frequentiori observationi occurrunt , uti boves oves , &c. 2. *Equos* qui eadem destituuntur , continuo ferè (ubi hoc iis promitur) saltem per multas indefinenter horas , escæ intentos esse ; quin etiam horum usitata edulia , vel gramen , vel fœnum , aut frumenta varii generis esse , quorum utrumlibet particulis minus activis (saltem actu non multum agitatæ) constat ; in gramine enim , dum adhuc viret , crudiores & aquosæ plurimum scatent , quibus adeo diluuntur quotquot insunt magis activæ , ut exiguæ sint efficaciz ; in fœno verò & frumentis siccatis quamvis activæ hæc satis magnâ forsan copiâ abundant , adeo tamen aliis præ siccitate implicantur & subjungantur , ut non facilè sese extricare possint.

Hinc supponere forsan licebit *Equos* , quandoquidem minus exaltato hoc pabulo vescuntur , aliquanto acriori fermento chylosæ massæ , imperfectiori adhuc , in intestinis affundendo
in-

indigere, ad hujus particulas agiliores, at nimis obſeratas, extricandas, & craſſiores comminuendas, quam quod aliis animalibus quorum cibus ſtomachali fermento minus negotiū facceſſit, ex uſu eſt; quale quidem eſſe liquorem per porum in inteſtina recta deſcendentem, præ eo qui in veſiculam prius divertit, cumque cſtico mitioris, niſi me fallant auguria, genii liquore unitur, modo conatus ſum oſtendere. Potro cum pabulum ſuum conſtanter adeò ingerunt, nec prius devorato eas dant inducias, ut ante concoquatur & expellatur, quam novum ſuperinducatur, cumque proinde pars indeſinenter, ipſo quo hoc fit tempore, pariter in inteſtina expelli neceſſe habet, quæ & minus perfectè præ celliori hoc tranſitu in ventriculo elaborari valet, hinc continuo affundi debet in inteſtinis fermentum, quod æqualiter ſe ei admiſceat, & ſic chyliſicatorium munus tam conſtans ſubſidium expoſcens compleat. Hoc autem à cſti ſperari vix poſſet. Cum enim, ſi eo quo diximus modo impleatur, per ſat longum tempus ocludenda eſt, ut hoc præſtetur ductus communis in inteſtinum apertura, quo intervallo nil biliōſi laticis chylo affundi poteſt; ſin altera illa methodo, per radices ſcil. ei ſuus inducatur liquor, non niſi lentis gradibus propter vaſorum exilitatem impleri poſſit, nec proinde par eſſe poteſt ſecretus in eam humor deſcendenti chyloſæ maſſæ; cum porro præ ſitu quem obrinere neceſſe haberet haud daretur ei locus, propter continuam ferè ventriculi diſtentionem pro ſufficienti bilis copia colligenda; propterea non inconſultò feciſſe naturam augurari liceat, hanc partem iſtis animalibus denegando, quorum & uſibus improporcionatus videtur liquor quem deſert, & quæ ejus præſentia abſque incommodo vacare poſſunt.

Si obſiciatur boves, oves, &c. quamvis eodem, quo equi, pabulo veſcuntur, cſti tamen donari: reponimus iſtorum cibos non immediatè à primo, in quem ab ore delabuntur, ventriculo in inteſtina pelli, ſed in os reſumi, ut ruminatiōnem ſubeat, quo fit ut & repetita hac comminutione, & ſalivæ inter ruminandum miſcella, eam obtineant particularum ſuarum exaltationem, ut ſecundarii hujus fermenti gradus mitior iis ſufficiat. Adde quod præ mora quam trahunt cibi, cſti induciæ ſat longæ pro liquoris quantitate idonea comparanda, his in inteſtina erumpentibus ſuffundenda, dantur.

Quandoquidem verò ſuppoſuimus hepaticam ſecretionem poſtiſſimum à diſtributo chylo peragi, nec ſatis idoneè procedere poſſe natura ſtomachicæ coctionis ſatagente; conjicimus (ut

objectioni hinc forsitan orituræ obviam eamus) & chylum in hisce animalibus jugi renore distributum satis faciliè secretionibus materiam præbere posse; & ventriculum distentioni ab istorum animalium continua, uti notavimus, ingluvie assuefactum, haud faciliè irritationem quam diximus, ab ingestis (minus tum proprio genio tum exactioris in ventriculo elaborationis carentia, ad turgescentiam pronis) sentire, ut nervi inserti copiosius, quam alibi, succum suum illie profundant.

Quod *succum pancreaticum* postquam toties de fermento chylificatorio mentionem fieri, sileam, non id eo consilio facio, quasi crederem ad hoc construendum nil conferre: At quoniam haud integram de fermento isto tractationem meditor sed solummodo biliaræ vesiculæ usum inquirendum proposui, ea solum attuli, quæ ad hanc indaginem immediatè factura credidi, cumque organicum, quem assignavi, vesiculæ usum, haudquaquam à pancreate pendere censeam, ejus cum succi sui, considerationem prætermisi tantum, non neglexi.

C A P. XV.

Secretionum privatarum ratio.

Secretionum *Publicarum* sic pro modulo nostro, reddita ratione, sequitur ut *Privatarum* etiam methodum aliquatenus tradamus. quam tamen paucis perstringere sufficiet, quandoquidem fundamenta, quibus explicatio hæc inuititur superius exposuimus.

Videtur igitur, has perinde ac publicas, ad duas pariter species revocari posse, ut nempe sint vel merè colatoræ, vel præcipitatoræ.

Quod ad priorem attinet, nil vctare videtur, quo minus ubi pars nutrienda ex subtilioribus (quæ saltem ad cohærendum habiles sunt) sanguinis particulis constari debet, mera percolatio ad idoneas ex alluentis sinu suppeditandas sufficiat, quandoquidem istæ, quemadmodum superius adstruximus, & ad secedendum (qua propria indole, qua crassiorum protrusione) magis proclives sunt, & ad commensuratas partis, cui nutriendæ destinantur, cavernulas subeundas haud difficili negotio se accommodant: ubi si strictiores, in opposito ad
eum

cum quo ingrediuntur hiatu, meatus invenerint [quod facile, opinor, admittetur] satis promptè apponuntur, inque eandem substantiam concreſcunt. Atque hæc methodus locum habet, ſive exhaustæ partis redintegrationem, novas in deperditarum locum particulas ſubſtituendo ſive ejuſdem augmentationem natura designet. Ad hunc modum cerebrum & nutrirî & augeri cenſeo; imò fortasſe *unicus* eſt, quandoquidem ſubſtantix ejus modus à reliquarum omnium partium multum differt, nec ſubefſe ratio mihi videtur, cur non, ſi aliæ ex ejuſdem naturæ particulis ſubtilioribus nempe conſtarentur, & mera earum percolatione emergerent, eadem quoque textura conſtarent. Et ſanè ex purioribus & ſubtilioribus [cæteris paribus] ſanguinis particulis conſtari cerebrum, argumento eſt, quod puriſſimo & ſubtiliſſimo, quem corpus habet, liquori ſeparando præſtituitur; quomodo enim concipi poteſt colum adeo excluſum, meatibusque tam exilibus præditum, ut ad hunc uſum inſervire debeat, compaginari poſſe, niſi componens materia ex talibus conſtaret particulis, quæ, ubi coierint, tam exiles [at confertos] meatus linquerent, ut huius ſoli tranſmittendo liquori apti ſint; has autem ſuo genere & ſubtiliſſimas eſſe exinde conſtat, quoniam ſi & craſſiores, & minus regulares ſint, neceſſe eſt ut intercepti patentiores, & diverſæ invicem figuræ ſint pori, qui proinde craſſioribus, minusque inter ſe conformibus, materiis tranſmittendis [quales à ſucci nervoſi genio multum abludunt] diſpoſiti neceſſario evadunt. Huc porro facit, tum quod teneræ adeo ac cernimus texturæ ſit, tum quod natura tantopere illius tutelæ cavit, qua duplici membrana cingendo, qua fortiſſimo cranio circumvallando, ut ab injuriis forinſecus illatis tutior foret. Cum ergo hæc ei textura adeſt quid impedit, quominus mera hanc ei donet fabricam percolatio, eoque magis quoniam hæc naturæ ſimplicitati [toties antea decantatæ] magis convenit; Adde quod nulla hic terminantur vaſa quæ fermentum advehant, nec, ſi præſto eſſent, facile monſtrari poſſet unde, & qua arte id compararent.

Alteram quod attinet ſecretionum privatarum ſpeciem, eam nimirum quæ circa eas impenditur partes quæ non ex ſubtilioribus modo dictis, ſed mixtis, conſtruuntur; videtur hic, non minus quam in publicis, quibus analogiam iſtæ habent fermentum requiri, quod particulas aſſimilandas pro partis nutriendæ diſpoſitione, & comminuat & ditigat inque deſtinata conceptacula depellat; ſecus enim vix eventurum videtur, ut aptè ad hoc concinnatæ, præconfuſa, qua in ſanguine urgentur, agitatione commenſurata ſpatiola, earum
com-

commensurata indigentia, offendant. Istud succo nervoso minus perquam ingeniosè Cel. *Willisium* detulisse supra notavimus. Cujus quidem suppositionis probabilitatem, non solum ad hanc, sed & ad publicas secretiones, quoniam supra ostendere conati sumus, superest ut de modo, quo res ista (foras peragatur, paucula adjungamus. Ut ergo appositio in partem, vel nutriendam vel augendam substantiam habeatur, concipiendum est; cavernulas adesse (utrum à particularum quæ eas prius explerunt, seu avolatione, seu in sanguineæ massæ gremium resumptione proveniant, an propria sanguinis, ad quam in junioribus animalibus pronior est, expansione aperiantur) in quas, sicut necesse est ut idoneæ & commensuratae deponantur, sic vix verisimile mihi videtur tales eas ingressuras, nisi vis quædam directrix accedat, quæ eas in has cavernulas disponat. Ex enim ex sanguinis particulis, quæ subtiliores & magis spirituosæ sunt quanquam hoc nomine ad secedendum magis proclives sunt, minores tamen videntur, quam ut istis adequatæ sint cavernulis, utpote quæ ab iis haud attractæ, nec proinde apponi possunt: crassiores autem, quæ ad hoc opus requiruntur, & suo apte genio magis patulum (qualem venæ præbent) tramitem affectant, & præ majori agitationis vi quam quæ mole minoribus comperit, nec propria indole desectunt, nec ab istis distorqueri aptæ sunt, unde in venas (favente harum ad arterias positione) sponte decurrunt. Ut ergo earum secessio habeatur, fibræ a nervis ortæ, ubique in partium habitu disponuntur, quarum succi, à nervis ad eas deportati, & constanter effusî, ope fieri non potest, quin ea crassioribus istis sanguinis particulis comminutio inducatur, & determinatio (modo superius allato) imprimatur, ut, pristinam linquentes semitam, cavernulas dictas tales quæ iis commensuratae sunt secedant, reliquis præterlabentibus. Cumque non facilis sit egressus tum præ ambientium partium oppositione tum quod extra sanguifera vasa protrusas non adeo cordis urgere potest impulsus, hinc necesse habent moram inibi facere, atque apponi, partemque, pro naturæ intentione, vel resarcire, vel augere.

Suggeri hic forsan poterit, non meram hic ex hypothesi *Willisiana* (superius laudata) præcipitationem fieri, sed dissolutionem & alterationem induci. Agnoscimus; interea tamen nil hinc reportare datur, nisi ut talis particulis apponendis moles, & figura, adque partes resarciendas hinc aptitudo emergant, ut, accedente, quam memoravimus, determinatione, in dictas cavernulas, istæ secedant particulæ? quibus na-

ctis

Etis non potest non haberi appositio, partisque proinde nutritio.

C A P. XVI.

Secretionum præter naturæ institutum evenientium ratio.

UT tandem Secretionum *præter naturæ institutum*, ab illata forinsecus partibus, ad hoc munus minime natis, injuria evenientium rationem aliquam reddamus, qualis in foniculis, ulceribusque aliis, hydropicis item affectibus, obtingere supra notavimus; videtur hæc à nuda plerumque percolatione (non tamen prorsus ad regularem naturæ normam suscitata) pendere atque erumpentem materiam, vel per arteriarum venarumque tunicas, vel ex illarum extremitatibus, ferri. Corrosis enim, vel usque adeo læsis tunicis, unde poti earum vel ultra naturalem statum ampliuntur, vel novi cudantur, haud fieri potest, quin præ sanguinis protusione talis materia, quæ iis commensurata est, colatura fiat, quæ & majori vel minori copia, varia item specie, pro istorum amplitudine & numero, prodire necesse habet. At insuper ex arteriolarum finibus, quandoquidem harum cum venulis commercium, si profundius saltem fuerit ulcus, non potest non intercipi, colatura haberi potest. Si quæras, qua arte hoc succedere possit, cum sanguis à corde impulsus tota sua massa per has decurrat, adeoque hæmorrhagiam potius, quam colaturam sic insectam fore concipiatur, quandoquidem nullam in parte exulcerata structuræ rationem comminisci in promptu sit, quæ hanc efficiat; respondeo, si eandem retinerent arteriolarum harum fines diametrum, qua in statu sano fruuntur, sic eventurum: verum notum est cuncta in corpore vasa, si præcidi contigerit, & sese versus integram partem contrahere, & corrugationes pati, utpote retinaculis quæ ea in debita tensione detinebant orbata; quin & effusi sanguinis grumuli, circa patentia conetrescentes ora, nec non & ipsius serosæ partis lentor (quem & mora, & partis calore contrahit) in tantum hæc obturare concipiantur, ut tenuiores solum partes, integræ massæ respectu, erumpere possint. Nec conceptu arduum est, quo tramite crassior pars in venas reducat: cum enim constat (quod sagacissimorum nostri seculi Anatomicorum industria debemus) inter arteriarum ramos ubivis, fere ana-

anastomoses dari, quicquid ulteriores & rectos tranare prohibetur tractus, per anastomoses has in alios ramos facillè transfretatur, atque inde in aditas venas solito more deportatur; tenuior autem & serosior pars cum satis facilem & arteriarum extremitatibus (nec enim in totum occludi possunt) viam offendit, è crassioris gremio minimo negotio præ peristaltica arteriarum contractione exprimitur, perque angustiores hosce, at moli suæ non improportionatos, ductus facessit. Non sane negandum est, ipsum crassamentum rubrum in purulentam, ab ulceribus evomi quandoque solitam, materiam digeri & posse & solere; quandoquidem texturæ mutatio, quam mora sua sanguis extravasatus acquirere potest, & calorem & consistentiam mutare valet: at vero hoc sanatis fere pristinos jam calles repetente sanguine tantummodo evenire solet, reliquis autem temporibus tenuior, & indigestus, apparet erumpens humor, quem proinde transcolatione, quam diximus potius suppeditari conjicio.

Quamvis autem nullâ non in parte istiusmodi transcolationem fieri posse autumo, non raro tamen observare licet, glandulosam in ulceribus succrescere solere substantiam, per cujus poros istam accuratiori methodo secretionem velle celebrare naturam fas sit suspicari; tantopere uniformitati in cunctis suis operibus studet.

Hydropicorum in abdomen depositum humorem nudâ colaturâ, ex sanguine viscerum, aliarumque in abdomine contentarum partium membranas laxatas trajiciente, per ampliatos eorum poros separari fas sit concipere. Sanguine enim vel sero supra modum referto, prout immodicis potatoribus usu venit, vel pneumatosi aliâ quacunque de causa indigente, atque lentius, præ vasorum per totum mesenterium, intestina, visceraque in abdomine conclusa amplitudine, supra notatâ, moto, quid mirum tunicas ultra modum distentas iri, adeoque facilem satis per ampliatos hinc poros suos serosiori, atque una spirituosiori sanguinis parti transitum concessuras? Etenim magna spirituosioris sanguinis partis copiâ hunc abundare liquorem satis testantur virium, in taliter affectis constantis debilitas, tum subita earum prostratio, si adhibita parentesi copiâ largiori extrahatur hæc colluvies. Non eo inficias percolationem evenire posse, quantumvis sanguis satis ab hac colluvie serosa immunis persistiterit; notum enim est hunc affectum hominibus plurimum abstemiis quandoque evenire: in hoc autem casu vero non dissentaneum videtur membranas nimia crassioris & pigrioris sanguinis quantitate distendi, qui vehiculo aquoso destitutus facile, ubi minus à corde sollicitatur

tur (id quod in ampliatis hic vasis nullo negotio eventurum concipiarur) ad stagnationem propendet, adeoque partes, quas appellit, distendere necesse habet, unde facili negotio tenuior ejus exudat pars. Adeo ut in utroque casu percolatio utramque paginam complere possit, ut non opus videatur [nisi perraro] ad lymphaticorum rupturam pro hujus affectus phaenomenis solvendis recurrere.

Quod ad secretionem vesicatoriorum ope excitatam attinet, quamvis forsan ex jam dictis solvi possit, supponendo capillares in cute terminatas ab acribus medicamenti particulis corrodere, adeoque exudationem modo allato concitari posse; censuerim tamen invigorando potius nervos agere, qui dum horum acrimoniâ vellicantur, majori copiâ suam profundunt liquorem: cumque eorum, ex hypothesi nostra, hic loci manus sit secretionem quæ per poros cutis fit excitare, probabile videtur, quod, ubi plus solito sollicitati fuerint, majori copia serosas ex sanguine, per arterias illic terminatas allato, particulas propellendo, insensibilis transpirationis vice visibilem hanc & copiosam evacuationem concitent. Eundem effectum admota quavis ignita cuti substantia experimur, cui quandoquidem, non secus ac ab admodis vesicatoriis, magnus succedit dolor, à *Nervorum* invigoratione istud phaenomenon emergere augurari liceat; adeoque horum usum non solum ultra angustos, quibus veteres terminarunt, limites, sed vel auctiora, quibus recentiores donarunt, pœmateria extendi debere.

F I N I S.







2.

N O V Æ
HYPOTHESEOS,
AD EXPLICANDA
Februm Intermittentium
SYMPTOMATA
E T
TYPOS EXCOGITATÆ
HYPOTYPOSIS.

Unà cum Ætiologiâ Remediorum;

SPECIATIM VERO
DE CURATIONE PER CORTICEM
PERUVIANUM.

Accessit Dissertatiuncula de Intestinatorum
Motu Peristaltico.

Authore **GULIELMO COLE M.D.**



AMSTELODAMI,
Apud **GEORGIUM GALLET, Bibliopolam.**

M. DC. XCVIII

THE
GOVERNMENT
OF THE
STATE OF
NEW YORK
IN SENATE
JANUARY 1893

REPORT
OF THE
COMMISSIONER
OF THE
LAND OFFICE
IN RESPONSE
TO A RESOLUTION
PASSED BY THE SENATE
JANUARY 1893



ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT & CO.
PRINTERS
1893

CELEBERRIMO

COLLEGIO REGALI

MEDICORUM LONDINENSIIUM;

SPECIATIM

DIGNISSIMO PRÆSIDI,

DOCTISSIMISQUE CENSORIBUS;

TENUEM LICET,

HANC OPELLAM, IN SUMMÆ

OBSERVANTIÆ TESSERAM;

SACRAM VOLUIT

AUTHOR.

THE

AMERICAN

REVIEW

OF

THE

ARTS

AND

SCIENCE

OF

THE

UNITED STATES



Clarissimo, Eruditissimoque Viro,

D. *Thomæ Millington* M. D.

EQUITI AURATO,

Collegii Medicorum *Londinensium*
Socio dignissimo, nec non
Medico Regio.

POST Solemne Officium Collegio vestro præstitum, non est quod mirerentur alii, Vir Celeberrime, si pagellæ sequentes peculiarem TE Patronum ambiant, cujus potissimum hortatu in Lucem prodeunt. Cum enim familiari & frequenti congressu in sermonem forte incideremus de Febrium Intermissione, & super eâ re tecum liberius differerem; Author fuisti ut animi sensa quæ in colloquio protuleram scriptis mandarem: Quod quidem tibi

* 3

hor-

Epistola Dedicatoria.

hortanti denegare nec potui propter veterem amicitiam, nec certè debui ob singularem tuam in omni litterarum genere peritiam, tum præsertim in hac Arte nostra, quam tanto ægrorum commodo, tantaque scientiæ & judicii fama tam multos annos exercuisti. Itaque habes, quam volebas, Hypothesin de Causis Februm Intermittentium, non ex aliorum scriptis collectam, sed novam, planeque nostram; nullo gloriolæ aucupio editam, sed studio veritatis, cujus & Te scio esse amantissimum, quamque amare me & ante omnia colere lubenter atque ex animo profiteor. Nec me interim latet quam difficili in materia obscuraque verser, tractata sanè à multis, à nemine, quod sciam, satis adhuc explicata: ac ne ipsi forte nos id efficiemus quod speramus & volumus; at certè quidem conati sumus, & conjecturas bona saltem voluntate in communem usum exponimus: Quod utinam & Tu facias, Vir Clarissime, nec scripta tua,

Epistola Dedicatoria.

tua, quæ jam diu premis, diutius nobis invideas & Republicæ litterariæ. Ita enim fiet ut quasi prælata hac face aliorum quoque ingenia accendantur. Mihi certè addetur animus, si affuerit huic meo opusculo, quæ se tueri ac munire possit, non tantum cohortationis Tuæ atque consilii, sed etiam exempli autoritas. Vale, Vir Ornatissime; & inter plurimos quos ubique habes cultores, noli postremum numerare.

Studiosissimum Tui atque

observantissimum

GULIELMUM COLE.



PRÆFATIO.

PLURIMI elapsi sunt Anni ex quo dubitare cœperim an Febrium Intermittentium causæ ab Antiquis rectè assignarentur, an verò earum origo à Nervoso genere rectius petenda esset. Nam & hic loci plerunque se prodere solent earum Symptomata quæ primò ingruunt, eaque ipsa sunt ejusmodi ut ab alio fonte derivari vix possint. Tum præterea ubi animo meo penitus infudisset, Nervorum munia, arctioribus licèt cancellis olim clauderentur, reverà multò patere latius, atque ad plura, quàm Veteribus visum est, pertinere (quod quidem in Tractatu, *De Secretione Animalis* antè ostenderam) facile hinc erat suspicari, potuisse etiam plures Morbos, imò & has ipsas Febres, ab eâdem scaturigine

P R Æ F A T I O.

rigine manare. Sed tanti apud me fuit ponderis ac momenti magnorum Nominum authoritas, qui aliunde eas arcefferent, ut omnem ejus rei cogitationem aut prorsus negligendam, aut saltem dissimulandam censerim: Donec annis abhinc circiter decem, si rectè memini, occasione oblatâ attentius contemplandi Quartanam vernalem, quæ mox infra memorabitur, in eam planè sententiam perductus sum, primò hanc, & deinceps facili ductu cæteras omnes Febrium Intermittentium Species, à Nervoso genere pendere, hunc focum agnoscere, mineramque earum hic sitam esse. Quam quidem opinionem ubi altius imbibe-
ram, necumque sæpè ac seriò revolverem, tantò mihi plus lucis ad Symptomata solvenda indices affulgere videbatur, ut tandem cogitationes meas succisivis horis in Adversaria summatim conjicerem, easque cum Medicis quibusdam doctis,
ut

P R Æ F A T I O.

ut fors tulit , identidem differerem. Denique id unum mihi superesse visum est , ut experirer utrum in curandis hujusmodi Febris Corticis Peruviani vis atque effectus cum Hypothesi nostrâ ita conveniret ut mechanicâ ratione satis aptè explicari posset : Nam , ut de me semel fatear , in Morborum productione eorumque curatione , & in Corporeis operationibus quibuscunque explanandis , non conquiescit animus , aut satisfieri sibi patitur , priusquam intellexerit quâ viâ , quibus instrumentis , quo Naturæ artificio & apparatu planè mechanico efficiantur. Hisce igitur invicem collatis ut satis quadrare compereram , cuncta illicò ordine disposita in chartas retuli , eâ ferè formâ quâ nunc prodeunt.

Cum autem ante septennium Doctissimo D. *Gibbonsio* fortuitò occurrerem , eique conjecturas meas aperirem ; ille , librorum magnus belluo , edixit mihi non perindè novas esse
atque

P R Æ F A T I O.

atque ipse reputaveram; quippe Cel.
Alphonsum Borellum (L. de Motu Ani-
malium) in Succo Nervoso Febrium
 Intermittentium sedem posuisse;
 quin etiam Doctiss. *Mundio* nostrati
 (in Βιοχημειολογία) ante *Borellum* idem
 subolevisse. Quos Authores mihi
 occupationibus practicis, & quidem
 ruri, implicato (ubi libri, istius
 præsertim generis, nuper editi, præ
 emptorum paucitate rarò veneunt)
 nequaquam legisse contigerat. Itaque
 his auditis, calamum abjicere, &
 adversaria flammis committere pri-
 mo statim impetu decrevi, ne cram-
 ben antè coctam quæ nauseam creare
 possit apponerem.

At verò, postquam sedatiore ani-
 mo perlegissem quicquid uterque su-
 per hâc re scriptis mandaverat, statim
 comperi, *Hunc* breviter tantùm &
 strictiùs rem attingere, *Illum* longè
 aliter atque ego conceperam expli-
 care; denique multò maximam Hy-
 potheseos meæ partem nunquam al-
 terutri

P R Æ F A T I O.

terutri in mentem venisse.

Et fanè *Mundius*, ipsâ rei evidentia, ut puto, adductus, videtur Hypotheseos nostræ notionem habuisse aliquam, eamque, ut *Cesalpinus* olim Circulationem Sanguinis, quodammodò per transennam conspexisse; quam si penitiùs introspexerat, totamque animo fuerat complexus, non paucis tantùm lineis breviter adumbratam, sed copiosius, atque (ut par erat) pro rei dignitate multò plenius explicatam traderet. Jam verò ille, *ὡς ἐν προόδῳ* (pag. libri sui 50.) Materiam Febrium Intermittentium, à sanguine licèt suppeditatam, in latice Cerebrum & Spinalem Medullam perlucens hospitari supponit, cum eodem fermentescere, membranas eorum vellicare atque contrahere, eâque contractione in Nervos adigi, unde rigor & tremor, læsâ scil. tum motus tum sensus facultate. Hâc porrò commotione è Nervis iterum excuti, inque massam Sanguineam

neam

P R Æ F A T I O.

neam per lymphæ ductus transferri statuit, ubi novos tumultus concitans Febrilem effervescentiam inducit, quæ post aliquot horas, exclusâ per poros materiâ Febrili, sedatur; Hinc apyrexiam succedere, donec satis novi fomitis in eundem focum denuò congeratur.

Quæ quidem opinio, quamvis eodem fundamento nitatur cum meâ quam in sequentibus profero, in hoc tamen ab eâ distat, quod contractum nimis & angustum, ut mihi videtur, focum assignaverit; quippe quem per totum ubique Fibrarum Systema, tam in Corporis habitu, quam in Cerebro & Spinali medullâ, latius esse diffusum statuimus. Quinimò de Typorum ratione nihil suggerit quod non antè multoties dictum, quodque animo, probabilitatis saltem, avido neutiquam satisfaciat.

Borelli autem multò longius à meis recedunt sensa (Par. 2. Propos. 227. & seqq.) utpote qui non in ipso

Cc-

P R Æ F A T I O.

Cerebro vel Systemate Nervoso in genere; sed in glandulis aliquibus obstructis mineram suam collocaverit; quâ causâ Nervulorum illic sitorum extremitates pari ratione & necessitate sic obstrui supponit, ut Succum suum effundere non valeant, eumque propterea sensim coacervatum hac morâ fermentescere, pravasque induere qualitates; usque adeo ut tandem noxâ, primò ad Cerebrum, deinde ad Cor & Sanguinem transmissâ, singula suo ordine emergant Symptomata.

Veruntamen, vix satis commodè, ut mihi videtur, exposuit quâ viâ, quibusve machinis, hæc materies ad Cerebrum, multò minùs ad reliquas partes, per Corpus universum ita convehatur, ut, ictu ferè oculi, prorumpant Paroxyfmi. Ut taceam Typorum, quam affert, solutionem (ex Authore petendam) analogiamque quâ nititur, quanquam forsan in li-

vix

P R Æ F A T I O.

vix tamen in Corpore nostro locum habere posse; in quo nempe & sat rapidè per omnes partes movetur Sanguis, & pluries in die diluitur; idque non rarò tam diversi generis liquoribus & quandoque medicatis; quos obstruentem materiam abstergere, atque à conceptaculis suis dimovere necesse est; cùm tamen Paroxysmi interim cursus suos nihilominus exactè repetant.

Quocircà ubi perpenderam doctorum horum virorum sensa meas non multùm anticipare cogitationes, nihilque in se habere quod me à præstitutâ semitâ cogat deflectere, imò eatenus saltem firmare, quòd & ipsa in Nervoso genere Februm Intermittentium mineram constituent, calamum quem deposueram (sed quem, arreptâ hâc ansâ, ad indagandas *nupera Apoplexiarum frequentie* causas amicissimus Mei, doctissimusque D. *Kimberly* à me ut resumerem impetraverat) ad intermissum diu

P R Æ F A T I O.

diu hoc pensum amicorum quorundam doctissimorum hortatu, agrè licèt, revocavi: & sic tandem ad umbilicum dissertatio hæc, qualis nunc prodit, perducta est.

Dum verò de eâdem edenda meditor, Clarissimi *Mortoni* circa eandem materiam doctissimus tractatus in lucem prodit; in quo haberi non pauca nostris consentanea seriò mihi gratulor; tum quòd plurimum Viri iudicio tribuam, tum præterè quòd ab illius exemplo fuerit defensio paratior, si fortè novitatis affectatæ arguar, ab iis scilicet quibus nisi quod excogitarunt Veteres nihil sapit. Sin verò me quandoque explanationes à suis placitis discrepantes attulisse compererit, non est quòd succenseat Vir Candidissimus, qui Philosophandi libertatem ipse profitetur, eâque, ut par est, reverè utitur; præsertim si perpenderit eas non contradicendi animo, sed diu ante evulgatum ejus librum à me

con-

P. R Æ F A T I O.

conceptas, imo & descriptas esse; cuius rei plures appellare possum testes fide dignissimos.

Postremo, si quicquam ab aliis antè prolatum hic illic sparsum Lector invenerit; sciat velim, me nullius sensa mihi arrogare: quin potius sibi quisque per me sua vindicet; dummodò id tantum, quod certè verissimum est, concesserit, invito mihi & proffus imprudenti excidisse. Cùm enim tantà librorum copiâ ad Artem Medicam spectantium hoc seculum abundaverit, mihiq̃ue Memoria ab ipsâ usque pueritiâ fuerit infirmior, neutrum spondere audeo; aut perlegisse me omnia quæ sunt nuper evulgata; aut quæ perlegerim omnia meminisse. Ipsam vero Hypothesin quod attinet, de illâ ausim profiteri, quantum ex propriâ & aliorum lectione, qui has chartas eolverunt, observari potuit, neminem hætenus eandem, aut planè consimi-

* *

lem

P R Æ F A T I O:

lem protulisse. Hanc tamen si improbaverit quispiam, aliamque in medium adduxerit quæ Morbi Phænomenis solvendis magis congruat, me certè gratissimum, non lectorem tantum, sed & discipulum ac sectatorem habiturus est.



*Ad Clarissimum, Humanissimumque Virum,
Medicum Exercitatissimum, Philosophum
Gravissimum, Dominum Doctorem
COLE in Norvam suam de Febre Hy-
pothesin ingeniosissimam.*

Jupiter.

Apollo.

Jup. **E**umenidum princeps, flammis armata
malignis,

Anguibus & sævis rutilos innexa capillos,
Febris anhela, necis, cædisque, Orcique mi-
nistra,

Debacchata diu, & latè grassata per orbem,
Prostravit mœstis populos malesuada ruinis.

Haurit vitales succos, & faucibus atris
(Heu tristes epulas!) horrentes pascitur artus.

Fluminibus totis sua proluit ora cruoris

Igniflua, & revomit geminatas ebria flammæ.

Horrendo squallore & fœdo pondere ventrem

Gestat distentum, nec dum satiata recedit

Quodque malum exauget, quodque illachry-
mabile regnum

Tantæ Pestis alit, non ullus, *Phæbe*, tuorum

Illius obscurum valet explorare cubile;

Aut certamen init, tanto par Viribus hosti.

Æmula at illa *Jovis*, nigrâ caligine tecta,

Ignotis humana ferit præcordia telis.

Liventes librat flammæ, atque inficit auras

Labe venenatâ, & nulli perysa tuorum

Densis elisos jaculatur nubibus Ignēs.
Labitur in venas vulnus, dolor ossibus ardet,
Perque imas errant incendia lenta medullas.
Tanti operis, molisque fuit mihi condere
Gentem
Humanam, ut tali repetitâ strage periret?
En, age, si qua meæ prolis te, liqua tuorum
Cura, ô *Phæbe*, tenet, si quid tua pocula possunt;
Nec jactas artem mendacem, & numen inane;
Desere sacratum collem, mollemque catervam
Pieridum, & positâ pharetrâ, citharâque sonorâ,
Terrarum populos propera fulcire ruentes:
Hoc opus ingenii est, Cœloque & *Apolline*
dignum.

Apollo.

Dictis mota tuis, hominum Pater, atque
Deorum,
In Genus humanum pietas præcordia flectit:
Porriget & certum miseris hæc dextra levamen.
Nobiliore luto, atque animis cœlestibus apto,
Ætheris excocti quod dat purissima vena,
Cribris divinis purgato, & luce, meisque
Diluto radiis, hominis præcordia fingam.
Intentique operi multum sudabimus, alti
Ictibus & vastis resonabit regia Cœli.
Arte laborarum multâ Cœleste metallum,
Atque indefessis opus haud Vulgare laertis
Nostris excusum, languens mirabitur orbis.
Sic tandem prodit *Collens*, amabile nomen
Ægris, qui sanâ mente, ingenioque beatus
Divino,

Divino, totoque afflatus numine *Phœbi*,
 Imbelles reddet sanos, Medicosque docebit
 Grassantis Febris rapidum cohibere furorem.
 Sedes obscuras, queis delituisse solebat,
 Inviſtum quondam monſtrum, reſerabit, opaca
 Clauſtraque Nervorum pandet, cæcæque
 Medullæ,
 Quas coluit Febris tot retro ſæcla, patebunt.
 Dicet, ut in Celfa ſedet ambitioſa Cerebri
 Arce, Luem, Pœnasque graves meditata, ne-
 cemque:
 Fingit ubi Peſtes, & miſcet lecta venena;
 Armaque Fatorum, tormenta infanda, cruceſque
 Fabricat innumeras, atque ignea tela reponit.
 Pabula ubi triſtis nondum matura doloris,
 Semina Morborumque, & mortis ſtamina
 condit.
 Inde venenatos ignes nunc torquet in artus,
 Luridaque in gelidas jaculatur ſpicula venas.
 Continuò immanis carpit calor omnia, circum
 Flagrantes latices fundunt præcordia, & uſta
 Ætneus ſubitò per viſcera depluit imber.
 Pectora nunc lento carpit maculoſa veneno,
 Atque moras neſcit, pigroque dolore trucidat.
 Nunc alterna juvant; & dum laſciva quietem
 Datque rapitque, æſtum accendens, ſedanſque
 viciffim,
 Diviſo imperio dominantur Vita, dolorque.
 Indorum creſcit plagis felicibus Arbor,
 Auro quod vendunt prætioſior; indè ſagittas,
 Indè ſalutiferos *Colles* fabricat arcus.
 Fretus & his armis, argutos cujus ocellos

Vix mens ipsa fugit, fugit at mens sola, pererrat
Anfractus curvos atque ardua cliva Cerebri:
Et loca Fibrarum nullis accessa, meatus
Intrat & angustos; monstrum figitque, latebris
Nervorum stabulans, errandi nescia dextra.
Nunc alios arcus gestat, diversa que tela,
Vincendi certus, fugientem torquet in hostem.
Morbo cuique suam *Collæus* porriget herbam;
Nostraque arte potens, & Viribus, *Herculis*
instar,
Innumeras Pestes, & monstra horrenda do-
mabit.

Jupiter.

Tantum conde virum, nec menti parciùs auras
Admisce æthereas, illasque infunde recentes,
Atque illibatam lucem, radiosque probatos.
Ingentem inspira virtutem, numinis & sis
Prodigus effusi, laudes ut carmine Vatum
Egrégiae dicantur, opusque feratur ad astra,
Consummatum *Phæbi*, atque admirabile Do-
num.

Sit faustus, felixque tuus *Collæus*, amandus
Omnibus, attingat placidam doctamque fene-
ctam:

Ut valeant reliqui mortales, ille valebit.

RICARDUS BLACKMORE M. D.

Regii Collegii Medic. Lond. Socius.

*Ad Virum Doctissimum, Experientissimum,
& Amicissimum, D. Doctorem COLB.*

TECTA diu ignotâ Febrilis Flamma favillâ,
Ignotosque focos habitans, hæc Vesta
Triformis

Invigilat nostris Custos malefida ruinis:

Tu referas secreta Deæ, monstrasque recessus
Queis struit insidias, in quos Victrice recedit,
Post pugnam rediens, Turmâ stipata Dolorum.
Insultu labefactus Homo, velut Arjete
quassus,

Non tulit ulteriùs. Sudore, Algore, Calore
Exhaustus, somno se victum dedit ultro:

Non morte, at verâ succumbit Imagine Mortis:

Illa quies rerum, sed Vincitum prodidit hosti,
Et reficit vires renovanda ad prælia Morbi:

„*Dum motus humorum, atque hæc certamina
tanta,*

„*Pulveris exigui jaëtu composita quiescunt,*

Hactenus hinc Medicos pariter lassavit, &
Ægros.

Muta Sibylla; tacet frustrâ consultus *Apollo,*

Atque Asclepiadum series longissima Vatum.

Nam referunt, *Colæ,* Tibi tot Numina munus,

Cujus mente Tripos, cui fixa in pectore Delos;

Teque jubent Nodosi ænigmata solvere Veri.

Ipse fidem absolvis; quanquam hâc sudavit
arenâ

Quondam *Jonesius, Britonum* Spes una salutis,

Et Medicis Senior clarus *Mortonus* in armis.

Tu doctus Varios olim fecernere Succos,

*** 4

Gna-

Gnarus & irriguos per Nervos ducere rivos ;
 Promisitque alios devicta Apoplexia campos.
 Sic ortu rerum Faber Ingens Materiæ
 Palantes Atomos cogit , Spargitque coactas
 Ad leges, *Colæ*, Tuas, artemque secutus
 Humanos proprio formavit vortice Cœlos.
 Exiguos monstras Primus quos Flamma meatus
 Intrat, ab introitu Tuque obice Corticis arces.
 Sic olim Sapiens, regio dum Peste laborat,
 Et Vapor Infernus certo inficit Aëra Letho :
 Ille specum inveniens per quem petit Æthera
 monstrum
 Obstruit, & proprio jussit requiescere Averno :
 Læta Salus sequitur, foelixque oblivio morbi.
 Sis Vatum Princeps, sis certus *Apollinis*
 Hæres:
 Sit *Phæbi*, mihi, vel *Jovis* Arbore, gratior Inda.
 Dum leni lambit Nervorum flumine Ripas
 Succus, dum Tyrios Cordis rotat Antlia fluctus.
 Nomen, opusque, Tuum per totum circule
 orbem:
 Perpetuo Venæ Sinuato tramite Gyro
 Te refluxum accipiant, prorsumque Arteria
 pulset.

STEPHANUS WELSTED,
Med. Lond.

ELEN.



E L E N C H U S

CAPITUM ET RERUM.

C A P. I.

Præcipuæ Authorum , de Febrium Intermit-
tentium Sede & Ratione formali , expen-
duntur Sententiæ. Pag. I

Duplex in genere Authorum circa locum materiæ Febrium
Intermittentium sententia , p. 2. Vel in loco aliquo pecu-
liari; Vel in Massâ Sanguineâ locantium. ibid. Veterum sen-
tentia; Humores in primis viis putrescere. ib. Recentiorum
Duplex. ib. Sylvii , in Pancreatis vasis recondi fermentum
febrificum statuentis. ib. Jonskii , in Habitu partium circa
Arteriarum extremitates. p. 3. Willisii , in Massâ Sangu-
ineâ. ib. Desiderata in opinione Willisii. p. 4. Rationes dis-
sensûs. ib. Prima. ib. Secunda. p. 5. Tertia. ib. Quarta.
ib. Quinta. p. 6. Sexta. ib. Ad interpolatum Morbum pro-
ducendum Fermentum per vices supplendum. p. 7. Fermentum
febrificum hujusmodi extra Sanguinis vias stabulari debere. ib.
Desiderata in Veterum opinione. ib. Nulla conceptacula à
vasis distincta pro reductione Fermenti febrifici in Sanguinem.
ib. In Ventriculo & Intestinis. p. 8. In Mesenterio. ib. In
Hepate & Liene. ib. Secreti Liquores vel exturbandi sunt.
ib. Vel immediatè Sanguini remandandi. ib. Noxa ab eorum
detentione. ib. Symptomatis Febrium Intermittentium produ-
cendis impares. ib. Desiderata in Hypothesi Sylvianâ. p. 9.
In Jonskianâ. p. 10.

C A P.

Gnarus & irriguos per Nervos ducere rivos ;
 Promisitque alios devicta Apoplexia campos.
 Sic ortu rerum Faber Ingens Materiæ
 Palantes Atomos cogit , Spargitque coactas
 Ad leges, *Colæ*, Tuas, artemque secutus
 Humanos proprio formavit vortice Cœlos.
 Exiguos monstras Primus quos Flamma meatus
 Intrat, ab introitu Tuque obice Corticis arces.
 Sic olim Sapiens, regio dum Peste laborat,
 Et Vapor Infernus certo inficit Aëra Letho :
 Ille specum inveniens per quem petit Æthera
 monstrum
 Obstruit, & proprio jussit requiescere Averno :
 Læta Salus sequitur, foelixque oblivio morbi.
 Sis Vatum Princeps , sis certus *Apollinis*
 Hæres :
 Sit *Phæbi*, mihi, vel *Jovis* Arbore, gratior Inda.
 Dum leni lambit Nervorum flumine Ripas
 Succus, dum Tyrios Cordis rotat Antlia fluctus.
 Nomen, opusque, Tuum per totum circulet
 orbem :
 Perpetuo Venæ Sinuato tramite Gyro
 Te refluxum accipiant , prorsumque Arteria
 pulset.

STEPHANUS WELSTED,
Med. Lond.

ELEN-

E L E N C H U S

CAPITUM ET RERUM.

C A P. I.

Præcipuæ Authorum , de Febrium Intermit-
tentium Sede & Ratione formali , expen-
duntur Sententiæ. Pag. I.

Duplex in genere Authorum circa focum materia Febrium
 Intermittentium sententia , p. 2. Vel in loco aliquo pecu-
 liari ; Vel in Massâ Sanguineâ locantium. ibid. Veterum sen-
 tentia ; Humores in primis viis putrescere. ib. Recentiorum
 Duplex. ib. Sylvii , in Pancreatis vasis recondi fermentum
 febrificum statuentis. ib. Jonesii , in Habitu partium circa
 Arteriarum extremitates. p. 3. Willisii , in Massâ Sangu-
 ineâ. ib. Desiderata in opinione Willisii. p. 4. Rationes dis-
 sensus. ib. Prima. ib. Secunda. p. 5. Tertia. ib. Quarta.
 ib. Quinta. p. 6. Sexta. ib. Ad interpolatum Morbum præ-
 ducendum Fermentum per vices supplendum. p. 7. Fermentum
 febrificum hujusmodi extra Sanguinis vias stabulari debere. ib.
 Desiderata in Veterum opinione. ib. Nulla conceptacula à
 vasis distincta pro reductione Fermenti febrifici in Sanguinem.
 ib. In Ventriculo & Intestinis. p. 8. In Mesenterio. ib. In
 Hepate & Liene. ib. Secreti Liquores vel exturbandi sunt.
 ib. Vel immediatè Sanguini remandandi. ib. Noxæ ab eorum
 detentione. ib. Symptomatis Febrium Intermittentium produ-
 cendis impares. ib. Desiderata in Hypothesi Sylvianâ. p. 9.
 In Jonesianâ. p. 10.

C A P.

C A P. II.

Conditiones Causæ Februm Intermittentium
Continents, ipsiusque Sedes & Materia in
Genere proponuntur. p. 12

Conditiones Cause continentis istarum Februm. p. 12. Prima Conditiō, Ut sit magna. ib. Secunda, Ut sit Universalis. ib. Tertia, Ut celeriter in actum erumpat ad Prima Symptomata producenda. p. 13. Quarta, Ut iis transactis parata sit ad Secundaria. ib. Quinta, Ut ad novissimam productionem Locus & Tempus concedantur. ib. Sexta, Ut Symptomatum omnibus ordine solvendis quadret. ib. Conditionum harum quarta, quinta, & sexta non quadrant Hypothesi Willisianæ. p. 14. Nec secunda, tertia, & sexta Veterum Hypothesi. ib. Ut nec Sylvianæ. ib. Nec tertia, & sexta Jonesianæ. ib. Propria sententia: Cerebrum & Systema Nervosum esse Sedem, & Succum Nervosum depravationem Materiam Februm Intermittentium. p. 15. Systema Nervosum complectitur omnes Corporis Fibras. ib. Medulla Cerebri, est Arboris Humana Radix; Nervi & Fibre Rami ramulique. ib. Existencia Succus Nervi astruitur. p. 16. An. solus Aer in Nervis contineatur, Spiritusque Animales ex hoc constant? ib. Succum Nervosum esse Succum Nutritivum. p. 18.

C A P. III.

Nutritionem Nervorum ministerio peragi,
Succumque Nervæum esse ipsam Nutricatus
Materiam astruitur. p. 18

Universa Corporis Stamina Nervosa esse originis adstruitur. p. 18. Non à Corde profluere. p. 19. Argumentum ab Irregularitate Pulsus in Febris Cerebrum afficientibus. ib. Historia. ib. Mensuram quidem Augmenti nostri à Cordis, quæ Musculi, robore determinari. p. 20. Ne ipsum verò à suo Sanguine nutriri. ib. Cunctarum partium vis

Et Rerum.

influentialis ad omnia munia , à Cerebro. p. 21. Nulla per Extra-positionem Nutritio. ib. Apparatus ad probandam Thefin. ib. Primò , Quid sit Nutritio. p. 22. Differentia inter Nutritionem & Augmentationem accidentalis tantum. ib. Secundò ; Nutritionis Requisita. p. 23. Primum ; ut Cavitates ita constituentur , ut debite suscipiant & transmittant alimentum congruum , & effato exituro saveant. ib. Secundum ; Ut apta sit materia apportanda ; id quod in molitie & exiguitate particularum potissimum consistit. ib. Tertium ; Ut partes Nutriendæ non nimis prompte suam dimittant materiam. p. 24. Quartum ; Ut proportio adsit inter materiam Nutritioni destinatam & Vasa advehentia. ib. Quintum ; Ut motus gradus in appellente materiâ sit lentus. p. 25. Sextum ; Ut juxta Mechanicas leges ad partes nutriendas dirigatur. ib. Hinc inferitur Nutritionem lentis gradibus peragere. p. 26. Tertiò ; Nutritionis Impedimenta. p. 27. Primum ; Cavitas nimis patula. ib. Secundum ; Nimia crassities , vel heterogeneitas materiæ. ib. Tertium ; Pororum in extremis nimia dilatatio. ib. Quartum ; Amplitudo nimia partium adferentium. p. 28. Quintum ; Motus materiæ nutritiæ nimis Celer. ib. Sextum ; Perplexa , & à rectâ nimium recedens vasorum advehentium posuio. ib. Quartò ; An Sanguis nutriat ? p. 29. Concessio. Sanguinem materiam nutritiam secum portare. ib. Non verò hinc evinci Immediatam suppeditare. ib. Considerationes circa Sanguinem. ib. Primò ; Massam ejus multiformem esse. ib. Secundò ; Multas continere particulas acres. p. 30. Tertiò ; Valde confusas esse ejus particulas. ib. Quartò ; Multas habere satis viscosas. ib. Quintò ; Motu lationis valde citato ferri. ib. Negatur Nutritio immediatè per Sanguinem , quia non respondet Requisitis. ib. Primò. ib. Secundò. p. 31. Tertiò. ib. Quartò. ib. Quinto. p. 32. Sexto. ib. Quinto ; Succo Nervoso competere Nutritionis pensum probatur à consideratione Requisite. ib. Primi. p. 33. Necesse est ut Fibræ sint tubulatae. ib. Secundi. ib. Mollissima & minutissima sunt Sacci Nervosi particulae. ib. Objectioni obviam itur. p. 34. Tertii ; ib. Mora variis de Causis nectitur Succo Nervoso in partibus nutriendis. ib. Quarti. p. 35. Sicut parçè admittenda est materia nutritia , sic vasa admissura sunt pertenuia. ib. Cur emaciati non cito ad pristinum habitum redeant. ib. Cur à Febribus convalescentes urinam parçè reddant. p. 36. Quinti. ib. Motus Succu Nervosi nequit non esse lentissimus. p. 37. Sexti. ib. Distributio Nervosarum partium quàm rectissime fieri potest habetur. ib. Arteriarum à concluso Sanguine suo nutriri nequeunt. p. 38. Sextò ; Proponitur Modus quo Nutritio peragi concipiatur. ib.

Elenchus Capitorum

ib. *Qui & Augmentationi Corporis competit.* p. 39. *Con-*
ciliatur Sensus & Motus ratio cum hac de Nutritione Hy-
pothesi. p. 40. *Obiectio.* *Qui pat ut in Paralyfi, deficienti-*
bus Motu & Sensu, Nutritio tamen peragatur. p. 41. *So-*
lutio. ib. *Obiectio.* *Quomodo tam pusilli Nervi grandibus*
Musculis aliisque partibus nutrimentum suppeditare possint?
p. 42. Solutio. ib. *Obiectio.* *Improbabile videri sinoviam*
puncturâ tendinis effluentem à Nervis profuere. p. 43. *Solu-*
tio. ib. *Modus Nutritionis à Cel. Entio assignatus proponitur.*
p. 44. De eo ambigitur. ib.

C A P. IV.

- **Conditiones allegatas Continentis Febrium In-**
- **termittentium Causæ Succo Systematique**
- Nervoso competere monstratur.** p. 45

Monstratur, *Conditiones supra recensitas Succo Nervoso*
quadrare. p. 45. *Primam.* ib. *Secundam.* p. 46. *Ter-*
tiam. ib. *Quartam.* ib. *Quintam.* p. 47. *Sextam.* p. 48.

C A P. V.

Hypothesis particulatim proponitur. p. 48

Hypothesis summa. p. 48. *Radices Nervorum in Corti-*
ce Cerebri laxari, vel propter poros ab Aere oclusos,
vel anomaliam in aliquo ex cæteris Non-naturalibus, ib. *Vel*
præ aliquâ aliâ subitâ occasione. ib. *Hinc Nervos admittere*
materiam incongruam. p. 49. *Qua morâ, quam hic trahit va-*
riis de causis, sensum exaltatur. ib. *Verum ad aliquot horas,*
forſan & dies, sine molestiâ per Nervos & Fibras progre-
ditur. ib. *Donec ad debitum plenitudinis & maturationis*
gradum evecta conceptacula lancinare incipiat. Unde *Rigor.*
p. 50. Universalis. ib. *Qui præ corrugatione extremorum non*
statim evanescit. ib. *Postea verò erumpente in Sanguinem hæc*
materia, Febrilem calorem accendi, p. 51. *Tandem sudore,*
&c. maturatam Criticè exclud. ib. *Atoniâ verò Cortica-*
lium Cerebri Glandularum persistente, iisdem gradibus usque
repetere Morbum. ib. *Donec cuncta in ordinem redacta fue-*
rint.

Et Rerum.

vint. ib. *Considerationes quædam ad Hypothesin confirmandam.* ib. 1. *Nervi lentè (comparatione ad Arterias habitâ) supplementa sua admittunt; lentius deponunt.* Atamen. ib. 2. *Proportio servari debet inter Nervorum & Arteriarum adimpletionem.* p. 52. 3. *Irritatio ad extrusionem nequit esse continua; sed diu protrahi debet.* p. 53. 4. *Succus Nervosus non omnibus horis æqualiter à Cerebro admittitur.* ib. *Partius interdum.* ib. *Copiosius nocturn.* p. 54. *A Somno in habitum partium protruditur.* ib. 5. *Ad magna Symptomata concilianda, vel Acrimoniam, vel Quantitatem, vel Motum peccare debet Materia.* ib. *Ephemera (nonnunquam causa.)* p. 55.

C A P. VI,

Symptomatum recensio, & solutiones. p. 56

Symptomata Febrilium Intermittentium trium sunt generum. p. 56. *Prelusoria.* ib. *Exhorrescentia.* ib. *Incalescentia.* ib. *Nec omnia omnibus, nec singulis æque violenta eveniunt.* p. 57. *Eorum Ratio.* ib. *Pandiculationis.* ib. *Oscitationis.* p. 58. *Partium contractionis.* ib. *Morum asperitatis, vel ingenii acuminis aucti.* ib. *Vertiginis.* p. 59. *Cephalalgia prelusoria.* ib. *Rigoris & Horroris.* p. 60. *Cur in Dorso rigores incipiant, & hic loci graviores sentiantur?* ib. *Frigoris.* p. 61. *Durationis Rigoris.* p. 62. *Pulsus debilitatis & tarditatis.* p. 63. *Anhelitus difficultatis.* p. 64. *Hypochondriorum contractionis.* ib. *Salivæ, Lachrymarum, Urinæ profusionis.* ib. *Vomitionis.* p. 65. *Proclivitatis ad alvum exonerandam.* ib. *Transactis Nervosis Symptomatis ingruunt Febrilia.* ib. *An dentur Sulphureæ in Sanguine particule.* p. 66. *Febrilium Symptomatum ratio.* p. 67. *Caloris.* ib. *Caloris & Frigoris alternationum.* p. 68. *Capitis doloris, Delirii, Vomitionis, Diarrhææ, &c. secundariorum.* ib. *Criseos in fine emergentis.* p. 69. *Apyrexia sequentis.* ib.

C A P. VII.

Typorum Ratio. p. 70.

Typi Quotidianarii, Tertianarii, Quartanarii sunt reliquorum norma. p. 70. *Prologomena ad horum rationem red-*

Elenchus Capiturum

reddendam. p. 71. Primum, Eadem in genere singulis speciebus Symptomata. ib. Secundum, singula sua [ut plurimum] observant anni tempora. ib. Exceptio. Historia Quartane Vernalis. ib. Tertium, Nihilominus quoad aliquas circumstantias discrepant. p. 72. Distributio Constitutionum Anni. ib. Scil. 1. In Vernalem. ib. In hac particula Nitroſa maxime ſcatent. p. 73. 2. Autumnalem. p. 74. In qua Acida. ib. 3. Hyemalem, ib. In qua Cruda. ib. Aſtiva conſtitutio Febribus Intermittentibus producendis minime apta. p. 75. In Conſtitutione Vernali & Autumnali Acrimonia in cauſa eſt. ib. Sed Vernalis diverſa. ib. Ab Autumnali. p. 76. In Hyemali Cruditas & Heterogeneitas in culpa ſunt. ib. Hinc ratio discriminis in genere inter alterutrius durationem. p. 77. Sed particularis certorum Typorum ulterius quarendae. ib. Soli Homines, ſerè, Febribus Intermittentibus proclives. p. 78. Obſervanda praeliminaria ad Typologiam noſtram conſtruendam. ib. Primum. ib. Secundum. ib. Tertium. ib. Quartum. ib. Deductiones ex primo Obſervando. p. 79. quæ regularem præterpropter ſorè reſuſcitum Paroxyſmi arguant. ib. Objectioni ab incautè viventibus, ib. Occurritur. ib. Deductiones à ſecundo Obſervando. p. 80. Quæ ad Nyctihæmeri ſaltem diſtantiã Paroxyſmos elongari debere ſuadent. ib. Deductiones à tertio Obſervando, quæ ſingulos Typos ab invicem diſcriminent. p. 81. Ad Conſtitutiones partium Anni quæ hoc determinant reſpiciendum. ib. Primò, Vernalem. ib. Cur Nitroſæ particule [dominium hac tempeſtate obtinentes] alternis tantummodo diebus ſe exerant. ib. Secundò, Autumnalem. p. 82. Particularum Acidarum figura. p. 83. Cur hæ nocendi vices non ante quartum [inclusive] diem obtineant? ib. Objectioni de coincidentia noſtræ Hypotheſeos cum Willifianâ, p. 84. Reſpondetur. ib. Tertio Hyemalem. p. 85. Deductiones à quarto Obſervando. ib. quæ anomalias determinant. p. 86. Objectioni, Sanguinem indies mutari alleganti, ib. Reſpondetur. ib. Anacephaloſis rationis Typorum. p. 87.

C A P. VIII.

Methodi Curationis in genere, Variarumque
ad eam spectantium Administrationum, Ra-
tio. p. 89.

Methodus medendi generalis cum singularum Administra-
tionum ratione. p. 89. Non prorsus eadem medendi Me-
thodus singulis Februm Intermittentium speciebus competit.
ib. Generales Indicationes tres. p. 90. Administrationes qua
prima debentur. ib. Quae secunda. ib. Quae tertia. ib. Phle-
botomia. ib. Quae eam prohibeant. ib. Aliis Evacuationibus
praemittenda. ib. Repetenda, si opus sit. p. 91. Vomitoria.
ib. Modò non adsint prohibentia. p. 92. Modus iuvandi. ib.
Cathartica. ib. Tempus exhibendi maxime opportunum, An-
te Paroxysmum. ib. Cur non semper proficiat. p. 93. Qualia
exhibenda sint. ib. Curationis solutio a Drastico. ib. Diapho-
retica. p. 94. Ratio agendi. ib. Hac administratio non sem-
per proficua est. ib. Diuretica. p. 95. Ratio agendi. ib. Al-
terantia. ib. Duplicia. ib. Primo Digestiva. ib. Ratio agen-
di. ib. Salinae sunt prosapia. ib. cuiuscunque sit generis. ib.
Objectioni ab Hypothesi de Typis. p. 97. Respondetur. ib.
Digestiva toto fere decursu Morbi usurpanda. p. 98. Secun-
dò, Specifica, p. 99. Agunt ratione Crasis & Textura, non
Principiorum Chymicorum. ib. Cortex Peruvianus instar om-
nium. ib. Opiata. ib. Pericarpia. p. 101. Ratio agendi,
modo effectum sortiri ceriò constiterit. ib.

C A P. IX.

Methodus Febres Intermittentes in specie cu-
randi. p. 103

Methodi medendi generalis ad varias Februm Intermit-
tentium Species adaptatio. p. 103. Primò, Ad Quo-
tidianas. ib. Secundò, Ad Tertianas. p. 104. Tertiò, Ad
Quartanas. p. 105.

C A P. X.

De Corticis Peruviani ; circa Febres Intermittentes sistendas, Facultate. p. 106.

Circa effectum Corticis Peruviani quinque perpendenda. p. 106. Primò, Noti ejus effectus. p. 107. Secundò, Textura modus & ratio. p. 108. Tertiò, Scena operationis. p. 109. Lustranda quatuor Corporis regiones quas pertransit. ib. 1. Quid agant ejus particula dum primam peragant. p. 110. 2. Quid dum Secundam. p. 111. 3. Quid dum Tertiã. ib. 4. De Quarta dubium an ulla subingrediantur. p. 112. Saltem annon, si admissa fuerint, nimis hic compingantur. ib. Respondetur. ib. Non (adequatè) vires exerit in Primam Regionem, ad Febrem tollendam. p. 113. Nec in Secundam ad hunc effectum. p. 115. Ut nec in Tertiã. ib. Sed in Quartam. p. 117. Considerationes praliminæ circa relativam Medicamentorum ætione. ib. Prima. ib. Secunda. ib. Tertia. p. 118. Quarta. ib. Quinta. ib. Illationes ad Corticis Peruviani effectum determinandum. p. 119. Prima. ib. Secunda. ib. Tertia. ib. Objectioni de perussilla quantitate Medicamenti quæ in Cerebrum deportatur. ib. Respondetur. p. 120. Quartò, Agendi modus. ib. Quintò, Phenomenon & Observatorum solutio juxta Hypothesin. p. 122. Cur Corticis Peruviani exhibitio præmatura vel non succedat, vel quandoque damnoſa sit. ib. Cur ab hoc Medicamento Morbus sine evacuatione dispareat. p. 123. Cur lecto affixi rarò levamen ab hoc Medicamento sentiant. p. 124. Cur Cathartica præproperè exhibita Paroxysmos quandoque reducant. p. 125. Cur Paroxysmi Cortice Peruviano sedati quandoque redeant. ib. Cur cum Acidus vel Amaris Cortex exhibitus efficacior deprehendatur. p. 126. Cur hoc Medicamento curatis, quàm aliis, celerius redeant pristina vires. ib. Considerationes practicae circa usum Corticis Peruviani. p. 127. Morbos plerosque Chronicos in Nervosa genere fundatos esse probabile videri. p. 129. Historia. ib. Historia rara. p. 130.